

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA 2002-2007



ANEXO II

SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



Libertad y Orden

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

**ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN
COLOMBIA, 2002-2007**


ANEXOS TOMO II

TOMO II

**ANEXOS CAPÍTULO I:
RELACIONES DE PAREJA**


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

GRÁFICOS



Fuente: Encuesta Nacional de Salud de Colombia, ENS-2007.


Gráfico 1.1. Porcentaje de la población colombiana mayor de 10 años que tienen relación de pareja según sexo y edad. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.


Gráfico 1.2. Prevalencia lápsica de relación de pareja en mujeres de 13-49 años. Colombia, 2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.


Gráfico 1.3. Distribución porcentual de mujeres con relación actual de pareja según edad. Colombia, 2005.



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.


Gráfico 1.4. Porcentaje de mujeres con relación de pareja según región. Colombia, 2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.


Gráfico 1.5. Porcentaje de mujeres con relación de pareja según departamento, Colombia, 2005.



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.


Grafico 1.6. Porcentaje de cohabitación con la pareja en las mujeres de Colombia, 2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.


Gráfico 1.7. Estabilidad en la historia de relación de pareja en función de la edad de inicio.



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.


Gráfico 1.8. Distribución porcentual del responsable de la toma de decisiones respecto al cuidado de la salud de la mujer según región. Colombia, 2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Gráfico 1.9. Distribución porcentual de la percepción de aprobación del compañero respecto al uso de métodos anticonceptivos. Colombia, 2005.



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Gráfico 1.10. Distribución porcentual del acuerdo en el numero de hijos en la pareja.
Colombia 2005

CUADROS

Cuadro 1.1. Distribución porcentual de la población que tiene una relación de pareja (casada o en unión libre) según región y sexo. Colombia 2007.

Región	Sexo					
	Hombre		Mujer		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	6.414	49,1	6.637	50,9	13.051	100
Oriental	5.523	49,5	5.624	50,5	11.148	100
Central	7.483	49,1	7.755	50,9	15.238	100
Pacífica	5.142	49,5	5.237	50,5	10.379	100
Bogotá	4.952	49,8	4.993	50,2	9.945	100
Orinoquía y Amazonía	416	49,4	426	50,6	841	100
Total	29.930	49,4	30.673	50,6	60.603	100

Fuente: Encuesta Nacional de Salud de Colombia, ENS- 2007.

Cuadro 1.2. Proporción de mujeres con relación de pareja según la participación en la toma de decisiones para realizar actividades. Colombia, 2007.

Actividad	Persona que decide			
	Sólo el padre u otro hombre del hogar u otra mujer del hogar	Sólo la madre es quién decide	La madre comparte la decisión con otra persona	Ningún hijo asiste
Llevar a un hijo al médico	5,0	58,6	36,4	N/A
Un hijo tiene que ir o no a estudiar	5,4	54,1	29,2	11,2
Hacer un gasto de ropa y zapatos para los hijos	15,1	45,6	39,3	N/A
Cuanto se gasta en la comida	17,6	47,6	34,8	N/A
Gasto extra para la casa	21,1	37,0	41,9	N/A

Fuente: Encuesta Nacional de Salud de Colombia, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 1.3. Distribución porcentual de las causas de separación según región. Colombia, 2005.

Causa de la separación	Región													
	Atlántica		Oriental		Central		Pacífica		Bogotá		Orinoquía y Amazonía		Total	
	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%	No	%
Enviudó	90	6,7	64	13,7	124	14,5	80	13,1	24	11,2	90	13,0	472	11,3
Violencia conyugal	277	20,7	104	22,3	170	19,9	111	18,2	56	26,2	142	20,5	860	20,6
Infidelidad de él	455	34,1	122	26,2	233	27,3	169	27,7	49	22,9	188	27,2	1.216	29,1
Infidelidad de ella	13	1,0	6	1,3	8	0,9	9	1,5	0	0,0	3	0,4	39	0,9
Incumplimiento deberes de esposo(a)/padre/madre	165	12,4	63	13,5	79	9,2	74	12,1	20	9,3	82	11,8	483	11,6
Embriaguez habitual	55	4,1	22	4,7	42	4,9	23	3,8	11	5,1	60	8,7	213	5,1
Drogadicción	12	0,9	4	0,9	21	2,5	9	1,5	1	0,5	4	0,6	51	1,2
Mutuo consentimiento	102	7,6	36	7,7	96	11,2	83	13,6	27	12,6	56	8,1	400	9,6
Incompatibilidad sexual	23	1,7	5	1,1	10	1,2	6	1,0	4	1,9	1	0,1	49	1,2
Otro	144	10,8	40	8,6	72	8,4	46	7,5	22	10,3	66	9,5	390	9,3
Total	1.336	100,0	466	100,0	855	100,0	610	100,0	214	100,0	692	100,0	4.173	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 1.4. Análisis de regresión logística sobre la “infidelidad de él” como causa de separación, según variables sociodemográficas. Colombia, 2005.

VARIABLES	Categorías	b ¹	OR ²	IC _{95%} ³	Valor-p ⁴
Edad	40-49				0,0
	13-19	-0,6	0,6	[0,4 - 0,8]	0,0
	20-29	-0,3	0,8	[0,7 - 0,9]	0,0
	30-39	-0,2	0,9	[0,8 - 0,9]	0,0
Nivel educativo	Posgrado				0,0
	Preescolar o ninguno	-0,3	0,7	[0,3 - 1,6]	0,4
	Primaria	-0,4	0,7	[0,4 - 1,1]	0,1
	Secundaria	-0,2	0,8	[0,5 - 1,3]	0,3
	Técnico /tecnólogo	0,0	1,0	[0,6 - 1,6]	0,9
	Profesional	-0,3	0,7	[0,5 - 1,2]	0,2
Región	Orinoquía y Amazonía				0,0
	Atlántica	0,2	1,2	[1,1 - 1,4]	0,0
	Oriental	0,0	1,0	[0,9 - 1,2]	0,8
	Central	0,0	1,0	[0,8 - 1,1]	0,6
	Pacífica	-0,1	0,9	[0,8 - 1,1]	0,5
	Bogotá	-0,3	0,8	[0,6 - 1,0]	0,0

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

3. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

4. **Valor p:** Significación estadística

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

TOMO II
ANEXOS CAPÍTULO II:
VIOLENCIA DE PAREJA

CUADROS.

Cuadro 2.1. Relación con la persona que agredió físicamente la última vez. Colombia, 2007.

Categorías	No.	%
Padre/padrastro	82.591	2,4
Madre/madrastra	50.812	1,5
Hermano(a)/hermanastro(a)	153.651	4,5
Esposo(a)/ Compañero(a)	621.016	18,1
Exesposo(a)/ex compañero(a) / ex novio(a)	224.861	6,5
Novio(a)	107.419	3,1
Hijo/hija	33.598	1,0
Pariente	182.914	5,3
Amigo	389.348	11,3
Persona conocida	693.329	20,2
Persona desconocida	860.568	25,0
No responde	40.181	1,2
Total	3.440.291	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Cuadro 2.2. Relación entre la persona agredida y la persona que lo(a) agredió físicamente la última vez, según sexo.

Sexo	Relación de la persona agredida con la persona que lo(a) agredió físicamente la última vez			Total
	Esposo(a)/ Compañero(a)	Exesposo(a)/ excompañero(a)/ex novio(a)	Novio(a)	
Hombre	67,7	13,1	19,2	100,0
	11,3	6,1	18,5	10,9
Mujer	64,8	24,9	10,3	100,0
	88,7	93,9	81,5	89,1
Total	65,1	23,6	11,3	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 2.3. Relación entre la persona agredida y la persona que lo(a) agredió físicamente la última vez, según la edad. Colombia, 2007.

Edad en quinquenios	Relación de la persona agredida con la persona que lo (a) agredió físicamente la última vez			Total
	Esposo(a)/ Compañer(a)	Exespos(a) excompañer(a)/ exnovi(a)	Novio(a)	
15-19	5,0	5,3	24,1	7,2
20-24	18,2	15,5	34,4	19,4
25-29	22,8	18,7	18,4	21,3
30-34	13,6	19,8	4,2	14,0
35-39	11,6	17,3	5,7	12,3
40-44	10,3	9,7	8,8	10,0
45-49	8,0	7,1	4,1	7,4
50-54	5,5	5,1	0,0	4,8
55-59	2,4	0,7	0,2	1,7
60-64	1,6	0,7	0,0	1,2
65-69	0,9	0,1	0,2	0,6
Total	65,1	23,6	11,3	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 2.4. Consumo de alcohol en la persona agresora en el momento de agresión en la relación de pareja. Colombia, 2007.

Consumo de alcohol en la persona agresora	Relación de la persona agredida con la persona que lo(a) agredió físicamente la última vez			
	Esposo(a)/ Compañero(a)	Exesposo(a)/ excompañero(a)/e xnovio(a)	Novio(a)	Total
Si	66,2	24,6	9,2	100,0
	41,7	42,8	33,3	41,0
No	65,0	22,0	13,0	100,0
	57,8	54,0	66,6	57,9
No sabe	32,1	67,2	0,7	100,0
	0,6	3,2	0,1	1,1
Total	65,1	23,6	11,3	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS- 2007.

Cuadro 2.5. Consumo de alcohol en la persona agredida en el momento de la agresión con relación a la persona agresora. Colombia 2007.

Consumo de alcohol en la persona agredida en el momento de agresión	Persona que lo(a) agredió físicamente la última vez			
	Esposo(a)/ Compañero(a)	exesposo(a)/ excompañero(a)/e xnovio(a)	Novio(a)	Total
Si	66,2	18,6	15,2	100,0
	10,0	7,7	13,3	9,8
No	65,0	24,1	10,9	100,0
	89,9	92,1	86,7	90,0
No sabe	60,0	40,0	0,0	100,0
	0,1	0,2	0,0	0,1
Total	65,1	23,6	11,3	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 2.6. Percepciones de la población relacionadas con la motivación de la agresión de la pareja por parte de la mujer, según sexo y edad. Colombia, 2007.

Variables	Cuando un hombre golpea a una mujer, muy seguramente es porque ella le dio motivos:								
	De acuerdo		Dudoso		En desacuerdo		Total		
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Sexo	Hombre	3.620.226	29,9	1.188.267	9,8	7.317.770	60,3	12.126.262	100
	Mujer	2.634.580	18,7	1.315.935	9,4	10.110.781	71,9	14.061.296	100
	Total	6.254.806	23,9	2.504.202	9,6	17.428.551	66,6	26.187.559	100
Grupos de edad	15 - 19	448.654	28,3	129.807	8,2	1.008.217	63,5	1.586.679	100
	20 - 24	975.228	26,3	277.931	7,5	2.452.204	66,2	3.705.362	100
	25 - 29	780.359	23,7	303.658	9,2	2.209.445	67,1	3.293.461	100
	30 - 34	676.736	23,1	283.240	9,7	1.974.027	67,3	2.934.002	100
	35 - 39	703.098	25,2	244.324	8,8	1.842.309	66,0	2.789.731	100
	40 - 44	659.965	22,9	261.678	9,1	1.960.971	68,0	2.882.614	100
	45 - 49	590.995	23,1	260.762	10,2	1.709.226	66,7	2.560.984	100
	50 - 54	445.864	20,5	253.713	11,6	1.478.479	67,9	2.178.056	100
	55 - 59	400.645	23,3	178.491	10,4	1.138.302	66,3	1.717.438	100
	60 - 64	290.354	21,7	144.697	10,8	904.428	67,5	1.339.479	100
	65 - 69	282.908	23,7	165.901	13,9	747.353	62,5	1.196.163	100
	Total	6.254.806	23,9	2.504.202	9,6	17.428.551	66,6	26.187.559	100

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 2.7. Percepciones de la población acerca de la justificación de la agresión del hombre a la mujer en la relación de pareja, según sexo y grupos de edad. Colombia, 2007.

Variables	Cuando un hombre golpea a una mujer, muy seguramente es porque ella le dio motivos:								
	De acuerdo		Dudoso		En desacuerdo		Total		
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Sexo	Hombre	3.620.226	29,9	1.188.267	9,8	7.317.770	60,3	12.126.262	100
	Mujer	2.634.580	18,7	1.315.935	9,4	10.110.781	71,9	14.061.296	100
	Total	6.254.806	23,9	2.504.202	9,6	17.428.551	66,6	26.187.559	100
Grupo de edad	15 -19	448.654	28,3	129.807	8,2	1.008.217	63,5	1.586.679	100
	20 - 24	975.228	26,3	277.931	7,5	2.452.204	66,2	3.705.362	100
	25 - 29	780.359	23,7	303.658	9,2	2.209.445	67,1	3.293.461	100
	30 - 34	676.736	23,1	283.240	9,7	1.974.027	67,3	2.934.002	100
	35 - 39	703.098	25,2	244.324	8,8	1.842.309	66,0	2.789.731	100
	40 - 44	659.965	22,9	261.678	9,1	1.960.971	68,0	2.882.614	100
	45 - 49	590.995	23,1	260.762	10,2	1.709.226	66,7	2.560.984	100
	50 - 54	445.864	20,5	253.713	11,6	1.478.479	67,9	2.178.056	100
	55 - 59	400.645	23,3	178.491	10,4	1.138.302	66,3	1.717.438	100
	60 - 64	290.354	21,7	144.697	10,8	904.428	67,5	1.339.479	100
	65 - 69	282.908	23,7	165.901	13,9	747.353	62,5	1.196.163	100
	Total	6.254.806	23,9	2.504.202	9,6	17.428.551	66,6	26.187.559	100

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS- 2007.

Cuadro 2.8. Antecedentes de agresión física en los padres según edad y aprobación de la agresión física por el cónyuge. Colombia, 2007.

Variables	¿Sus padres se agredían físicamente entre sí?								
	Sí		No		No responde		Total		
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Grupo edad	15 - 19	358.157	22,6	1.169.759	73,7	58.763	3,7	1.586.679	100,0
	20 - 24	842.563	22,7	2.768.275	74,7	94.525	2,6	3.705.362	100,0
	25 - 29	814.332	24,7	2.413.280	73,3	65.849	2,0	3.293.461	100,0
	30 - 34	717.680	24,5	2.136.434	72,8	79.888	2,7	2.934.002	100,0
	35 - 39	706.435	25,3	2.021.830	72,5	61.466	2,2	2.789.731	100,0
	40 - 44	731.739	25,4	2.078.181	72,0	75.070	2,6	2.884.990	100,0
	45 - 49	615.818	24,0	1.896.711	74,1	48.455	1,9	2.560.984	100,0
	50 - 54	507.854	23,3	1.604.231	73,7	65.972	3,0	2.178.056	100,0
	55 - 59	390.760	22,8	1.273.274	74,1	53.405	3,1	1.717.438	100,0
	60 - 64	282.992	21,1	1.018.936	76,1	37.551	2,8	1.339.479	100,0
	65 - 69	226.636	18,9	924.877	77,3	44.649	3,7	1.196.163	100,0
Total	6.194.966	23,7	19.309.376	73,7	685.592	2,6	26.189.934	100,0	
Hay situaciones en las cuales se justifica que un hombre le dé una cachetada a su esposa o compañera:	De acuerdo	1.248.462	34,3	2.326.984	63,9	68.910	1,9	3.644.356	100,0
	Dudoso	394.062	24,1	1.193.352	72,9	50.199	3,1	1.637.614	100,0
	Desacuerdo	4.552.442	21,8	15.789.040	75,5	566.482	2,7	20.907.965	100,0
	Total	6.194.966	23,7	19.309.376	73,7	685.592	2,6	26.189.934	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 2.9. Búsqueda de tratamiento médico a las lesiones causadas en la última agresión física, según la edad de la persona agredida. Colombia, 2007.

Edad en quinquenios	Búsqueda de tratamiento médico por las lesiones causadas en la última agresión física			Total
	Sí	No	No tuvo lesiones	
15-19	9,7	12,9	13,2	12,7
20-24	20,4	21,1	22,0	21,5
25-29	13,4	16,7	18,3	17,2
30-34	13,3	13,8	11,3	12,4
35-39	10,2	10,8	8,4	9,5
40-44	11,9	7,8	10,0	9,4
45-49	6,8	7,0	7,0	7,0
50-54	4,6	4,5	4,7	4,6
55-59	4,6	2,5	2,4	2,7
60-64	2,2	2,0	1,7	1,9
65-69	2,8	0,9	0,8	1,0
Total	10,7	36,4	52,9	100

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 2.10. Relación entre la edad y la denuncia ante alguna autoridad de la persona que la agredió físicamente.

Edad en quinquenios	Denuncia ante alguna autoridad de la persona que la agredió físicamente.		
	Sí	No	Desconocido
15-19	9,6	75,9	14,5
20-24	10,5	70,6	19,0
25-29	12,1	72,4	15,5
30-34	13,3	73,4	13,3
35-39	18,3	74,3	7,3
40-44	16,8	68,9	14,2
45-49	18,0	68,9	13,2
50-54	14,1	70,5	15,3
55-59	12,1	65,4	22,4
60-64	21,6	65,5	12,9
65-69	16,8	71,0	12,1
Total	13,4	71,8	14,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 2.11. Relación entre la denuncia a la persona agresora y la aceptación de la expresión “hay situaciones en las cuales se justifica que un hombre le dé una cachetada a su esposa o compañera”. Colombia, 2007.

Hay situaciones en las cuales se justifica que un hombre le dé una cachetada a su esposa o compañera:	Denuncia ante alguna autoridad de la persona que la agredió físicamente.		
	Sí	No	Desconocido
De acuerdo	11,0	75,8	13,1
Dudoso	8,5	73,5	18,0
En desacuerdo	14,5	70,4	15,1
Total	13,4	71,8	14,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

TOMO II
ANEXOS CAPÍTULO III:
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

METODOLOGÍA

En primer lugar se resumen las principales características de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005 (ENDS 2005), y posteriormente se explican los pasos metodológicos que dimos para llevar a cabo el análisis de la base de datos que de dicho estudio nos fue proporcionada.

Características de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 (ENDS 2005)

Tipo de estudio

La ENDS 2005 fue un estudio epidemiológico de carácter descriptivo y cualitativo que se inició el 7 de octubre de 2004 y finalizó el 30 de junio de 2005, con un receso comprendido del 16 de diciembre de 2004 al 13 de enero de 2005, por ser la época de vacaciones, lo que dificulta el contacto con muchas personas de los hogares.

Esta encuesta tuvo como objetivo general, identificar y describir los problemas, características y situaciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Colombia, sus regiones, subregiones y departamentos. Y tenía como objetivos específicos analizar las características de la población y de los hogares, estudiar las características y situación de las mujeres en edad fértil, establecer los niveles y tendencias de la fecundidad, determinar el nivel de conocimiento, la prevalencia y tendencias del uso de métodos anticonceptivos y su fuente de obtención, identificar las tendencias de nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo, definir las preferencias de fecundidad y planificación familiar, establecer los niveles y tendencias de la mortalidad infantil y en la niñez, analizar los niveles de conocimiento y uso de la citología vaginal y de la mamografía, determinar la situación, los niveles y tendencias del uso de los servicios de salud materno e infantil y algunos de los indicadores estado nutricional y prevalencias de infección respiratoria aguda (IRA) en menores de cinco años, identificar conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. En el

componente específico sobre violencia se propuso estimar los niveles de violencia contra la mujer y los niños.

Población de referencia

El estudio comprende el 98% de la población urbana y rural del país. El tamaño de la muestra se fijó en 37.211 hogares.

Población de estudio

Es un estudio de cobertura nacional, con representatividad urbana y rural, para 6 regiones, 16 subregiones y 32 de los 33 departamentos.

Unidades básicas de estudio

Las unidades básicas fueron los hogares, las mujeres en edad fértil entre los 13 a 49 años, mujeres con citología vaginal y mamografía entre los 18 a 69 años y para las medidas antropométricas se tuvieron en cuenta los miembros del hogar mayores de 64 años.

Muestra

Es una muestra probabilística, estratificada, por conglomerados y multietápica de la población civil, no institucional, del conjunto del país.

Tamaño de la muestra

La muestra de la ENDS 2005 es una ampliación de la Muestra Maestra de la Población Colombiana (MUMPRO), para la que se utilizó como marco muestral el Censo de Población y Vivienda de 1985. Esta muestra consta de 3,935 segmentos y aproximadamente 37.211 hogares. Los segmentos están distribuidos en 200 municipios. Se incluyeron las cabeceras municipales de los nuevos departamentos, lo que hace que el universo de la muestra

represente aproximadamente el 98% de la población nacional. El tamaño final de la muestra fueron 41.344 mujeres entre 13 a 49 años.

Precisión de las estimaciones

El error estándar relativo (ESrel) fue de 10% o menos para las estimaciones para las mujeres en edad fértil; para las mujeres que se encuentra actualmente unidas y para los niños menores de 5 años el ESrel fue 12% o menos.

Las estimaciones también pueden realizarse a nivel departamental, pero con menor precisión (ESrel mayor). Para San Andrés y Providencia, y para los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía, la muestra de la ENDS 2005 se fijó alrededor de 600 hogares, lo que significa la posibilidad de estimaciones independientes de aceptable precisión (ESrel del 12% o menos) sólo para indicadores de mayor frecuencia, o también, la posibilidad de estimaciones para parejas de departamentos, con precisión similar a la de los departamentos con muestra más grande.

A medida que se acumula la muestra por subregiones (14-16), regiones (6) y para el conjunto del país, no sólo aumenta progresivamente la precisión de las estimaciones, es decir, se encuentra error estándar relativo menor, sino que es factible la estimación de fenómenos de menor probabilidad de ocurrencia.

Muestreo

Se realizó muestreo probabilístico, estratificado, por conglomerados y multietápico de la población civil, no institucional, del conjunto del país.

Método de recolección

Se realizó encuesta domiciliaria con uso de microcomputadoras (sistema CAPI).

Metodología empleada en el presente análisis de la ENDS 2005

Magnitud y distribución por variables económicas y sociales.

Se ha presentado una publicación muy completa sobre la magnitud y distribución de los temas tratados por la ENDS 2005, entre ellos el de violencia a la mujer en la familia {Ojeda G, 2005 #152}, por lo que consideramos que tal análisis no debe ser repetido por nosotros.

- *Variables*

Las variables dependientes e independientes que se seleccionaron para llevar a cabo este análisis se aprecian y definen en los cuadros 1 y 2. Sus definiciones corresponden a aquellas empleadas en la mencionada Encuesta.

Cuadro 3.1. Variables dependientes.

Agrupación de las variables	Variable	Definición
Mujer víctima de violencia por la pareja	Víctima de situaciones de control en la vida y en el último año.	La mujer víctima de situaciones de control por parte de su pareja fue toda aquella mujer a la que su esposo o compañero sometió al menos a una de las siguientes acciones: la acusó de ser infiel, que el esposo o compañero le impidió encontrarse con sus amiga(o)s, trató de limitar sus contactos con su familia, insistió en saber dónde estaba todo el tiempo, vigiló la forma como gastaba el dinero y no le consultó las decisiones importantes para la familia.
	Víctima de amenaza con arma en la vida y en el último año.	La mujer víctima de amenaza con arma fue toda aquella mujer que su esposo o compañero la ha amenazado (amenazó) con un cuchillo, arma de fuego u otra arma.
	Víctima de agresión física en la vida y en el último año.	La mujer víctima de agresión física por la pareja fue toda aquella mujer que fue víctima de al menos una de las siguientes agresiones por su compañero o esposo: la empujó o zarandeó, la golpeó, la mordió, la pateó, la atacó con un cuchillo, arma de fuego u otra arma o trató de estrangularla o de quemarla
	Víctima de agresión sexual en la vida y en el último año.	La mujer víctima de agresión sexual por la pareja fue toda aquella mujer que fue forzada físicamente por su esposo o compañero a tener relaciones o actos sexuales cuando no quería
Mujer agresora de la pareja	Mujer que somete a su pareja a situaciones de control en la vida.	Se incluyó como una mujer que somete a su compañero a situaciones de control en la vida, a toda aquella mujer que sometió a situaciones de control a su compañero/esposo.
	Mujer que agrede verbalmente a su pareja en la vida.	Se incluyó como una mujer que agrede verbalmente a su compañero o esposo en la vida, a toda aquella mujer que agredió verbalmente a su compañero/esposo en momentos en los cuales su esposo/compañero no la estaba agrediendo.
	Mujer que agrede físicamente a su pareja, en la vida.	Se incluyó como mujer que agrede físicamente a su compañero o esposo en la vida, a toda aquella mujer que agredió físicamente a su compañero/esposo en momentos en los cuales su esposo/compañero no la estaba agrediendo.
Mujer agresora de los niños o niñas a su cuidado	Mujer que castiga físicamente a los niños o niñas bajo su cuidado, en la vida.	Se incluyó como una mujer que aplica el castigo físico a los niños y niñas bajo su cuidado, a toda aquella mujer que al menos refirió alguna de las siguientes conductas: empujó al niño o niña a su cuidado, le dio palmadas o lo golpeó con un objeto.
Consulta a los servicios de salud por la mujer	Mujer que requirió un servicio de salud debido a una agresión en el hogar.	Mujer que refirió haber consultado a un servicio de salud como consecuencia de la última agresión en el hogar.

Cuadro 3.2. Variables asociadas o independientes exploradas.

Variables	
Lugar de residencia	Departamento de residencia
	Región de residencia
	Subregión de residencia
	Zona de residencia
Variables económicas y sociales	Estrato social y económico del hogar
	Nivel del Sisben
	Nivel de pobreza
	Nivel educativo de la mujer
	Nivel educativo del cónyuge
Edad	Tipo de afiliación a la Sistema de Seguridad Social en Salud
	Edad de la mujer en años
Tipo de unión	Edad del cónyuge en años
	Tipo de unión: casados o unión libre
Variables de la familia	Tipo de familia
	Hacinamiento en el hogar
	Número de hijos e hijas nacidos vivos
	Número de hijos e hijas con quienes convive
Ocupación e ingresos del hogar	Ocupación del cónyuge
	La mujer tiene trabajo remunerado
	El cónyuge trabaja actualmente
	La mujer trabaja
	El cónyuge está haciendo algún trabajo y le pagan
	El cónyuge ha trabajado en el último año
	Meses trabajados en el último año por el cónyuge
	Persona que decide cómo gastar el dinero en el hogar
Aporte de la mujer a los gastos del hogar	

Plan de análisis

Depuración y recodificación

En primera instancia se realizó la recodificación de las variables y la depuración de la información. Se recodificaron en categorías de sí y no las variables dependientes víctima de situaciones de control, víctima de amenaza con arma, víctima de agresión física, víctima de agresión sexual, mujer que somete a su pareja a situaciones de control, mujer que agrede verbalmente a su pareja, mujer que agrede físicamente a su pareja, denuncia y consulta a los servicios de salud.

Análisis multivariado

Posteriormente se calcularon las regresiones logísticas binarias para cada una de las variables dependientes, se calculó la capacidad de predecir del modelo y los supuestos de colinealidad y bondad de ajuste. Se calcularon las razones de oportunidad (OR) con su respectivo intervalo de confianza del 95%.

Las variables dependientes analizadas fueron:

- Víctima de situaciones de control.
- Víctima de amenaza con arma.
- Víctima de agresión física.
- Víctima de agresión sexual.
- Mujer que somete a su pareja a situaciones de control.
- Mujer que agrede verbalmente a su pareja.
- Mujer que agrede físicamente a su pareja.
- Mujer que castiga físicamente a los menores bajo su cuidado.
- Personas que requirieron un servicio de salud debido a una agresión en el hogar.

Para realizar estos análisis se utilizó el programa SPSS 11.5.

- *Consideraciones éticas*

Este estudio consistió en un análisis de la base de datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. La encuesta que analizamos utilizó su propio formato de consentimiento informado y la forma de garantizar la confidencialidad de la información y anonimato de los participantes.

Para el uso de esta base de datos se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones éticas:

- Se limitó el número de copias de la base de datos al mínimo necesario para poder dar cumplimiento a la implementación de la mencionada investigación.
- Se mantuvieron las bases de datos bajo con las siguientes precauciones:
 - ✓ Las bases de datos se mantuvieron con clave de acceso si estaban instaladas en equipos que sean compartidos con otras personas,
 - ✓ En equipos de uso individual o personal, siempre y cuando ellos fueran seguros y estuvieran protegidos por clave de acceso y no se compartieran con ninguna persona,
 - ✓ El acceso a las bases de datos solo fue autorizado para el personal vinculado directamente al mencionado proyecto de investigación
- El equipo de investigación mantuvo el acceso restringido de cualquier tipo de material impreso de datos originales de las bases de datos solamente al personal vinculado directamente al mencionado proyecto de investigación.
- Al término de la investigación y de las publicaciones acordadas entre el investigador y coinvestigadores se borran todas las copias de las bases de datos y se destruye el material impreso con el todo o parte de sus datos originales.

RESULTADOS

VICTIMIZACIÓN DE LA MUJER POR SU PAREJA

AGRESIÓN DE LA MUJER A SU PAREJA

A continuación se presentan los modelos de regresión de factores asociados a que la mujer sea víctima de su pareja de situaciones de control, amenaza con arma, agresión física y agresión sexual y de sea agresora de su pareja sin haya mediado agresión inmediatamente antes por parte del cónyuge. Las OR de cada uno de los modelos siguientes se encuentran resumidas en los cuadros 3 y 4 del artículo.

CUADROS.

Cuadro 3.3. Factores asociados a que la mujer haya sido víctima de situaciones de control por la pareja. Colombia, 2005.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Región (Referencia: Atlántico)		0,0		
Oriental	0,0	0,7	1,0	[0,9-1,2]
Central	0,2	0,0	1,2	[1,0-1,4]
Pacífica	0,2	0,1	1,2	[1,0-1,4]
Bogotá	0,4	0,0	1,6	[1,2-2,0]
Orinoquía y Amazonía	0,3	0,0	1,3	[1,1-1,6]
La mujer ha trabajado en el último año	-0,2	0,0	0,8	[0,7-0,9]
Edad de la mujer	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
Nivel educativo del cónyuge	-0,1	0,0	0,9	[0,9-1,0]
Número de hijos con los que vive	0,1	0,0	1,1	[1,0-1,2]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Cuadro 3.4. Factores asociados a que la mujer haya sido víctima de situaciones de control en el último año. Colombia, 2005.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Región (Referencia: Atlántica)		0,0		
Oriental	-0,1	0,4	0,9	[0,8-1,1]
Central	0,1	0,2	1,1	[0,9-1,3]
Pacífica	0,1	0,2	1,1	[0,9-1,3]
Bogotá	0,4	0,0	1,4	[1,1-1,8]
Orinoquía y Amazonía	0,1	0,2	1,1	[0,9-1,4]
Ha trabajado en el último año	-0,2	0,0	0,8	[0,7-0,9]
Edad de la mujer	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
Edad del cónyuge	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
Nivel educativo del cónyuge	-0,1	0,0	0,9	[0,9-1,0]
Número de hijos con los que vive	0,1	0,0	1,1	[1,0-1,1]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Cuadro 3.5. Factores asociados a que la mujer haya sido víctima de amenaza con arma por la pareja. Colombia, 2005.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Cabecera municipal	0,3	0,0	1,3	[1,2-1,5]
Región (Referencia: Atlántica)		0,0		
Oriental	0,1	0,4	1,1	[0,9-1,2]
Central	0,0	0,6	1,0	[0,9-1,2]
Pacífica	0,0	0,7	1,0	[0,9-1,1]
Bogotá	0,3	0,0	1,3	[1,1-1,6]
Orinoquía y Amazonía	0,1	0,1	1,1	[1,0-1,3]
La mujer tiene trabajo remunerado	0,1	0,0	1,2	[1,1-1,3]
Persona decide cómo gastar el dinero				
Esposo/compañero decide	0,6	0,0	1,9	[1,3-2,6]
Ambos deciden	-0,3	0,0	0,7	[0,6-0,8]
Alguien decide	0,2	0,5	1,2	[0,8-1,9]
Conjuntamente con alguien más	0,1	0,7	1,2	[0,5-2,4]
Estrato económico y social de la mujer	-0,1	0,0	0,9	[0,9-1,0]
Edad de la mujer	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
Nivel educativo de la mujer	-0,1	0,0	0,9	[0,8-0,9]
Nivel educativo del cónyuge	-0,1	0,0	0,9	[0,9-1,0]
Aporte en los gastos por la mujer	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,1]
Número de hijos con los que vive	0,2	0,0	1,2	[1,2-1,3]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Cuadro 3.6. Factores asociados al hecho de que la mujer haya sido víctima de amenazas con arma en el último año por la pareja. Colombia, 2005.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Cabecera municipal	0,3	0,0	1,4	[1,2-1,5]
Región (Referencia: Atlántica)		0,0		
Oriental	0,0	0,9	1,0	[0,9-1,2]
Central	-0,1	0,1	0,9	[0,8-1,0]
Pacífica	0,0	0,6	1,0	[0,8-1,1]
Bogota	0,1	0,1	1,2	[1,0-1,4]
Orinoquía y Amazonía	-0,2	0,0	0,8	[0,7-1,0]
La mujer tiene trabajo remunerado	0,1	0,0	1,1	[1,0-1,3]
Persona decide cómo gastar el dinero				
Esposo/compañero decide	0,6	0,0	1,9	[1,3-2,7]
Ambos deciden	-0,5	0,0	0,6	[0,5-0,7]
Alguien decide	0,0	1,0	1,0	[0,6-1,7]
Conjuntamente con alguien más	0,2	0,6	1,3	[0,5-3,0]
Estrato económico y social de la mujer	-0,1	0,0	0,9	[0,9-1,0]
Edad de la mujer	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
Nivel educativo de la mujer	-0,2	0,0	0,8	[0,8-0,9]
Nivel educativo del cónyuge	-0,1	0,0	0,9	[0,9-1,0]
Aporte en los gastos por la mujer	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,1]
Número de hijos con los que vive	0,2	0,0	1,2	[1,1-1,2]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Cuadro 3.7. Factores asociados a que la mujer sea víctima de agresión física por su pareja. Colombia, 2005.

Factores asociados	b ¹	Valor P ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Región (Referencia: Atlántica)		0,0		
Oriental	0,4	0,0	1,5	[1,3-1,7]
Central	0,2	0,0	1,2	[1,1-1,3]
Pacífica	0,3	0,0	1,3	[1,1-1,5]
Bogotá	0,8	0,0	2,1	[1,8-2,5]
Orinoquía y Amazonía	0,5	0,0	1,6	[1,4-1,8]
Embarazo actual	-0,2	0,0	0,8	[0,7-1,0]
La mujer tiene trabajo remunerado	0,1	0,0	1,1	[1,1-1,2]
Persona decide cómo gastar el dinero				
Esposo/compañero decide	0,6	0,0	1,9	[1,4-2,7]
Ambos deciden	-0,2	0,0	0,8	[0,7-0,9]
Alguien decide	0,1	0,6	1,1	[0,7-1,7]
Conjuntamente con alguien más	0,2	0,7	1,2	[0,6-2,4]
Estrato económico y social de la mujer	-0,1	0,0	1,0	[0,9-1,0]
Nivel educativo de la mujer	-0,1	0,0	0,9	[0,9-1,0]
Edad del cónyuge	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
Nivel educativo del cónyuge	-0,1	0,0	0,9	[0,9-0,9]
Número de hijos con los que vive	0,1	0,0	1,2	[1,1-1,2]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Cuadro 3.8. Factores asociados a que la mujer haya sido víctima de agresión física en el último año por la pareja. Colombia, 2005.

Factores asociados	b ¹	Valor P ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Cabecera municipal	0,2	0,0	1,2	[1,1-1,4]
Región				
Oriental	0,1	0,2	1,1	[1,0-1,3]
Central	-0,1	0,1	0,9	[0,8-1,0]
Pacífica	0,1	0,5	1,1	[0,9-1,2]
Bogotá	0,5	0,0	1,6	[1,3-1,9]
Orinoquía y Amazonía	-0,1	0,1	0,9	[0,8-1,0]
La mujer tiene trabajo remunerado	0,1	0,0	1,1	[1,0-1,3]
Persona decide cómo gastar el dinero				
Esposo/compañero decide	0,8	0,0	2,2	[1,5-3,2]
Ambos deciden	-0,2	0,0	0,8	[0,7-0,9]
Alguien decide	-0,1	0,7	0,9	[0,5-1,6]
Conjuntamente con alguien más	0,4	0,4	1,5	[0,6-3,5]
Estrato económico y social de la mujer	-0,1	0,0	0,9	[0,9-1,0]
Edad de la mujer	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
Nivel educativo de la mujer	-0,1	0,0	0,9	[0,8-0,9]
Edad del cónyuge	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
Nivel educativo del cónyuge	-0,1	0,0	0,9	[0,8-0,9]
Número de hijos con los que vive	0,1	0,0	1,1	[1,1-1,2]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Cuadro 3.9. Factores asociados a que la mujer sea víctima de agresión sexual por parte de la pareja. Colombia, 2005.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Región		0,0		
Oriental	0,3	0,0	1,3	[1,1-1,6]
Central	0,3	0,0	1,3	[1,1-1,6]
Pacífica	0,3	0,0	1,4	[1,1-1,7]
Bogotá	0,3	0,1	1,3	[1,0-1,7]
Orinoquía y Amazonía	0,3	0,0	1,3	[1,1-1,6]
Tiene trabajo remunerado	0,3	0,0	1,3	[1,1-1,5]
Persona decide cómo gastar el dinero				
Esposo/compañero decide	0,3	0,3	1,3	[0,8-2,2]
Ambos deciden	-0,4	0,0	0,7	[0,5-0,8]
Alguien decide	0,2	0,6	1,2	[0,6-2,4]
Conjuntamente con alguien más	0,3	0,6	1,3	[0,5-3,9]
Nivel educativo de la mujer	-0,1	0,0	0,9	[0,8-1,0]
Edad del cónyuge	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
Nivel educativo del cónyuge	-0,2	0,0	0,8	[0,8-0,9]
Número de hijos con los que vive	0,2	0,0	1,2	[1,1-1,3]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Cuadro 3.10. Factores asociados a que la mujer sea agresora física de su pareja. Colombia, 2005.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Cabecera municipal	0,3	0,0	1,4	[1,1-1,7]
Región		0,0		
Oriental	-0,4	0,0	0,7	[0,6-0,9]
Central	-0,1	0,2	0,9	[0,7-1,1]
Pacífica	-0,1	0,3	0,9	[0,7-1,1]
Bogotá	-0,2	0,1	0,8	[0,6-1,6]
Orinoquía y Amazonía	0,3	0,0	1,3	[1,1-1,6]
Mujer víctima de situaciones de control por la pareja en la vida	0,4	0,0	1,5	[1,3-1,7]
Mujer víctima de amenaza por la pareja en la vida	0,5	0,0	1,7	[1,4-2,0]
Mujer víctima de amenaza por la pareja en el último año	-0,3	0,0	0,7	[0,6-0,9]
Mujer víctima de agresión física por la pareja en la vida	0,5	0,0	1,6	[1,4-1,9]
Estrato económico y social de la mujer	0,1	0,0	1,1	[1,0-1,2]
Edad de la mujer	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Cuadro 3.11. Factores asociados a que la mujer agrede verbalmente a su pareja. Colombia, 2005.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Cabecera municipal	0,2	0,0	1,2	[1,0-1,4]
Región (Referencia: Atlántica)		0,0		
Oriental	-0,5	0,0	0,6	[0,5-0,7]
Central	-0,5	0,0	0,6	[0,5-0,7]
Pacífica	-0,3	0,0	0,7	[0,6-0,9]
Bogotá	-0,4	0,0	0,7	[0,6-0,8]
Orinoquía y Amazonía	-0,1	0,1	0,9	[0,7-1,0]
Victima de situaciones de control por la pareja en la vida	0,4	0,0	1,5	[1,4-1,7]
Victima de amenaza por la pareja en la vida	0,3	0,0	1,4	[1,3-1,6]
Victima de agresión física por la pareja en la vida	0,8	0,0	2,3	[2,0-2,5]
Estrato económico y social de la mujer	0,1	0,0	1,1	[1,0-1,2]
Edad del cónyuge	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.

Cuadro 3.12. Factores asociados a que la mujer someta a su pareja a situaciones de control. Colombia, 2005.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Cabecera municipal	0,2	0,0	1,2	[1,1-1,4]
Región		0,0		
Oriental	-0,5	0,0	0,6	[0,5-0,7]
Central	-0,3	0,0	0,8	[0,7-0,9]
Pacífica	-0,2	0,0	0,8	[0,7-0,9]
Bogotá	-0,5	0,0	0,6	[0,5-0,7]
Orinoquía y Amazonía	-0,4	0,0	0,7	[0,6-0,8]
Víctima de situaciones de control por la pareja en la vida	0,5	0,0	1,6	[1,4-1,8]
Víctima de amenaza por la pareja en la vida	0,2	0,0	1,3	[1,1-1,4]
Víctima de agresión física por la pareja en la vida	0,4	0,0	1,5	[1,4-1,7]
Edad del cónyuge	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística


3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS-2005.


TOMO II
ANEXOS CAPÍTULO IV:
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

GRÁFICOS



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.1. Frecuencia de uso según sexo en la población que reportó hábito de consumir alguna vez en la vida, población 12-69 años, Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.2. Frecuencia de uso según grupo de edad en la población que reportó presencia de hábito de consumo alguna vez en la vida, población 12-69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.3. Frecuencia de uso según el estrato socioeconómico en la población que reportó hábito de consumo alguna vez en la vida, población 12-69 años, Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.4. Frecuencia de uso según el nivel educativo en la población que reportó hábito de consumo alguna vez en la vida, población 12-69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.5. Frecuencia de uso según tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, en la población que reportó hábito de consumo alguna vez en la vida, población 12-69 años, Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.6. Tipo de consumo de alcohol según la frecuencia de uso, población 12-69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Grafico 4.7. Intervalos de confianza para la media de edad de inicio del consumo según el nivel de riesgo a la dependencia alcohólica en la mujeres, población 12 a 69 años, Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Grafico 4.8. Intervalos de confianza para la media de edad de inicio del consumo según el nivel de riesgo a la dependencia alcohólica en los hombres, población 12 a 69 años, Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Grafico 4.9. Intensidad de uso actual y ex-consumo de cigarrillo, población 12-69 años, Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.10. Intensidad de uso actual de cigarrillo según sexo, población 12-69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.11. Intensidad del uso ex-consumidores de cigarrillo según sexo, población 12-69 años, Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.12. Intensidad del uso actual de cigarrillo según grupo de edad, población 12-69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.13. Intensidad de uso de los ex consumidores de cigarrillo, según grupo de edad, población 12-69 años, Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.14. Intensidad de uso en consumidores actuales de cigarrillo según nivel educativo, población 12-69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.15. Intensidad de uso en ex-consumidores de tabaco según nivel educativo, población 12-69 años, Colombia, 2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.16. Intensidad de uso en consumidores actuales de cigarrillo según estrato socioeconómico, población 12-69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.17. Intensidad de uso en ex-consumidores de cigarrillo según estrato socioeconómico, población 12-69 años, Colombia, 2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.18. Intensidad de uso en consumidores actuales de cigarrillo según régimen de afiliación al sistema de seguridad social en salud, población 12-69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.19. Intensidad de uso en ex consumidores de cigarrillo según régimen de afiliación al sistema de seguridad social en salud, población 12-69 años, Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.20. Intervalos de confianza para la cronicidad de uso según el nivel de intensidad del consumo cigarrillo en fumadores actuales, población 12-69 años, Colombia 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.21. Intervalos de confianza para la cronicidad de uso según el nivel de intensidad del consumo cigarrillo en ex consumidores, población 12-69 años, Colombia 2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.22. Intervalos de confianza para la cronicidad del consumo de cigarrillo en fumadores actuales según sexo, población 12-69 años, Colombia 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.23. Intervalos de confianza para la cronicidad del consumo cigarrillo en ex consumidores según sexo, población 12-69 años, Colombia 2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.24. Intervalos de confianza para la cronicidad del consumo de cigarrillo en fumadores actuales según grupos de edad, población 12-69 años, Colombia 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.25. Intervalos de confianza para la cronicidad del consumo cigarrillo en ex consumidores según grupos de edad, población 12-69 años, Colombia 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.26. Intervalos de confianza para la Cronicidad de uso en consumidores actuales de cigarrillo según estrato socioeconómico, población 12 a 69 años, Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.27. Intervalos de confianza para la Cronicidad de uso en ex consumidores de cigarrillo según estrato socioeconómico, población 12 a 69 años, Colombia, 2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.28. Intervalos de confianza para la Cronicidad de uso en consumidores actuales de cigarrillo según tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, población 12 a 69 años, Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.29. Intervalos de confianza para la Cronicidad de uso en ex consumidores de cigarrillo según tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, población 12 a 69 años, Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.30. Intervalos de confianza para la cronicidad del consumo de cigarrillo en fumadores actuales según nivel educativo, población 12-69 años, Colombia 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.31. Intervalos de confianza para la cronicidad del consumo cigarrillo en ex consumidores según nivel educativo, población 12-69 años, Colombia 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.32. Intervalos de confianza del número de días cigarrillos de marihuana según el número de días de consumo en el último mes, población 18-69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.33. Intensidad del número de días de consumo en el último mes según grupo de edad, población 18 a 69 años, Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.34. Intensidad del número de días de consumo en el último mes según nivel educativo, población 18 a 69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.35. Intensidad del número de días de consumo en el último mes según estrato socioeconómico, población 18 a 69 años, Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.36. Intensidad del número de días de consumo en el último mes según tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, población 18 a 69 años, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.37. Riesgo de dependencia al alcohol en Colombia, 1987-2008.

CUADROS

Cuadro 4.1. Prevalencia de consumo de alcohol en la vida, en los últimos 30 días, y consumo de alta intensidad según sexo, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Prevalencia de consumo de alcohol	Sexo					
	Hombre		Mujer		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Prevalencia de vida	22.064	82,5	24.308	74,0	46.372	77,8
Prevalencia de uso de los últimos 30 días	11.078	41,4	7.092	21,6	18.170	30,5
Consumo de alta intensidad en los últimos 15 días	7.480	28,0	3.804	11,6	11.284	18,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.2. Prevalencia de consumo de alcohol en la vida, en los últimos 30 días y consumo de alta intensidad en los últimos quince días según edad, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Grupos de edad	Prevalencia de vida		Prevalencia de uso de los últimos 30 días		Consumo de alta intensidad en los últimos 15 días	
	No.	%	No.	%	No.	%
12 - 14	4.311	45,6	829	8,8	317	3,3
15 - 19	8.330	75,5	3.488	31,6	2.048	18,6
20 - 24	4.440	89,0	2.389	47,9	1.588	31,8
25 - 29	4.467	89,6	2.156	43,2	1.434	28,8
30 - 34	3.914	87,2	1.802	40,1	1.175	26,2
35 - 39	3.999	86,4	1.643	35,5	1.034	22,4
40 - 44	4.128	86,7	1.763	37,1	1.139	23,9
45 - 49	3.597	87,1	1.370	33,2	857	20,8
50 - 54	3.037	84,1	1.118	31,0	691	19,2
55 - 59	2.489	83,9	723	24,4	446	15,0
60 - 64	2.017	83,7	534	22,2	339	14,1
65 - 69	1.643	77,4	354	16,7	215	10,1
Total	46.372	77,8	18.170	30,5	11.284	18,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.3. Prevalencia de consumo de alcohol en la vida, en los últimos 30 días y consumo de alta intensidad en los últimos quince días según estrato socioeconómico, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Estrato socioeconómico	Prevalencia de vida		Prevalencia de uso de los últimos 30 días		Consumo de alta intensidad en los últimos 15 días	
	No.	%	No.	%	No.	%
Sin estrato/Pirata	628	78,2	231	28,8	158	19,7
Uno	11.122	77,1	3.936	27,3	2.497	17,3
Dos	17.580	78,7	6.945	31,1	4.207	18,8
Tres	10.775	77,6	4.486	32,3	2.830	20,4
Cuatro	1.753	78,6	754	33,8	444	19,9
Cinco	514	69,0	183	24,6	123	16,5
Seis	167	84,6	85	43,3	41	20,6
Total	42.538	77,9	16.621	30,4	10.299	18,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.4. Prevalencia de consumo de alcohol en la vida, en los últimos 30 días, y consumo de alta intensidad en los últimos quince días según área, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Área	Prevalencia de vida		Prevalencia de uso de los últimos 30 días		Consumo de alta intensidad en los últimos 15 días	
	No.	%	No.	%	No.	%
Cabecera	36.236	78,8	14.667	31,9	9.154	19,9
Centro poblado	5.528	75,3	1.951	26,6	1.261	17,2
Rural disperso	4.608	73,7	1.552	24,8	869	13,9
Total	46.372	77,8	18.170	30,5	11.284	18,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.5. Prevalencia de consumo en los últimos 30 días y consumo de alta intensidad en los últimos quince días según departamento, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Departamento	Prevalencia de uso de los últimos 30 días		Consumo de alta intensidad en los últimos 15 días	
	No.	%	No.	%
Vaupés	8	40,5	6	28,1
Tolima	723	38,9	371	19,9
Guaviare	31	38,5	17	21,4
Bogotá	3.689	37,8	2.309	23,7
Meta	389	35,1	306	27,6
Bolívar	908	35,1	648	25,0
Chocó	233	34,1	160	23,4
San Andrés	34	33,9	25	24,3
Guainía	6	33,5	4	24,6
Boyacá	573	33,0	342	19,7
Cauca	589	32,7	393	21,8
Nariño	652	32,1	288	14,2
Risaralda	402	31,7	261	20,6
Atlántico	906	31,4	665	23,0
Caldas	405	30,6	225	17,0
Medellín y Área Metropolitana	1.555	30,6	832	16,3
Magdalena	434	30,0	342	23,6
Amazonas	11	29,8	8	21,8
Arauca	55	29,2	38	19,9
Cali y Yumbo	851	29,0	519	17,7
Huila	420	29,0	243	16,7
Cundinamarca	925	27,8	535	16,1
Córdoba	534	26,9	380	19,2
Cesar	330	26,4	242	19,3
Caquetá	154	25,9	86	14,5
Resto Valle del Cauca	745	25,6	897	30,8
Vichada	8	25,4	5	14,4
Resto de Antioquia	891	25,0	1.378	16,0
Putumayo	48	24,9	28	14,3
Santander	619	24,4	369	14,5
Casanare	72	23,3	48	15,6
Quindío	192	22,9	88	10,6
Sucre	261	22,9	185	16,3
La Guajira	187	22,3	104	12,4
Norte De Santander	328	19,7	202	12,1
Total	18.170	30,5	11.284	18,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.6. Tipo de consumo de alcohol según sexo, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Tipo de consumo	Sexo					
	Hombre		Mujer		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
No consumidor	4.675	17,5	8.536	26,0	13.211	22,2
Bebedor social	18.882	70,6	23.632	72,0	42.514	71,4
Consumo de riesgo	1.253	4,7	320	1,0	1.574	2,6
Consumo perjudicial	1.279	4,8	258	0,8	1.537	2,6
Dependencia alcohólica	648	2,4	98	0,3	746	1,3
Total	26.737	100	32.845	100	59.582	100

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.7. Tipo de consumo de alcohol según grupo de edad, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Grupos de edad	Tipo de consumo									
	No consumidor		Bebedor social		Consumo de riesgo		Consumo perjudicial		Dependencia alcohólica	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
12 a 14	5.152	54,4	4.284	45,3	17	0,2	10	0,1	0	0,0
15 a 19	2.700	24,5	8.001	72,5	200	1,8	97	0,9	31	0,3
20 a 24	549	11,0	3.990	80,0	204	4,1	175	3,5	71	1,4
25 a 29	519	10,4	4.041	81,0	175	3,5	177	3,5	74	1,5
30 a 34	575	12,8	3.507	78,1	157	3,5	155	3,5	95	2,1
35 a 39	628	13,6	3.618	78,2	141	3,0	159	3,4	81	1,7
40 a 44	631	13,3	3.626	76,2	194	4,1	200	4,2	108	2,3
45 a 49	533	12,9	3.185	77,1	150	3,6	182	4,4	79	1,9
50 a 54	572	15,9	2.682	74,3	126	3,5	154	4,3	75	2,1
55 a 59	479	16,1	2.277	76,7	70	2,4	87	2,9	55	1,8
60 a 64	393	16,3	1.803	74,8	80	3,3	84	3,5	50	2,1
65 a 69	479	22,6	1.499	70,6	59	2,8	57	2,7	29	1,3
Total	13.211	22,2	42.514	71,4	1574	2,6	1.537	2,6	746	1,3

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.8. Tipo de consumo de alcohol según estrato, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Estrato socioeconómico	Tipo de consumo											
	No consumidor		Bebedor social		Consumo de riesgo		Consumo perjudicial		Dependencia alcohólica		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Sin estrato/Pirata	175	21,8	557	69,3	23	2,9	37	4,6	12	1,5	803	100
Uno	3.305	22,9	10.230	70,9	375	2,6	347	2,4	168	1,2	14.426	100
Dos	4.750	21,3	16.071	72,0	615	2,8	593	2,7	300	1,3	22.330	100
Tres	3.103	22,4	9.911	71,4	338	2,4	364	2,6	162	1,2	13.878	100
Cuatro	477	21,4	1.639	73,5	50	2,2	44	2,0	20	0,9	2.229	100
Cinco	231	31,0	463	62,1	27	3,6	17	2,3	7	1,0	746	100
Seis	30	15,4	154	77,9	6	3,2	0	0,0	7	3,5	197	100
Total	12.072	22,1	39.025	71,5	1.434	2,6	1.403	2,6	676	1,2	54.609	100

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.8. Tipo de consumo de alcohol según nivel educativo, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Nivel educativo	Tipo de consumo											
	No consumidor		Bebedor social		Consumo de riesgo		Consumo perjudicial		Dependencia alcohólica		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Ninguno	894	31,0	1.798	61,9	84	3,0	71	3,0	60	2,1	2.907	100
Preescolar	32	44,0	37	51,7	0	0,0	1	1,0	2	3,4	72	100
Básica primaria	2.348	16,0	10.703	75,0	449	3,0	518	4,0	259	1,8	14.276	100
Básica secundaria y media	2.091	13,0	13.058	78,2	627	4,0	626	4,0	305	1,8	16.707	100
Técnico o tecnológico	236	8,5	2.305	83,3	89	3,0	99	4,0	37	1,3	2.767	100
Universitaria sin título	98	12,0	666	79,0	35	4,0	23	3,0	20	2,4	843	100
Universitaria con título	276	12,0	1.946	83,1	59	3,0	43	2,0	17	0,7	2.341	100
Postgrado sin título	4	13,0	23	84,3	0	0,0	1	2,0	0	0,0	27	100
Postgrado con título	32	7,6	360	86,5	10	2,0	10	2,0	5	1,2	416	100
Total	6.009	15	30.896	76,6	1.354	3,0	1.392	3,0	706	1,7	40.357	100

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.9. Tipo de consumo de alcohol según tipo de afiliación al sistema de seguridad social, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Tipo de afiliación	Tipo de consumo										Total	
	No consumidor		Bebedor social		Consumo de riesgo		Consumo perjudicial		Dependencia alcohólica			
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Contributivo.	4.640	21,2	15.937	72,8	594	2,7	508	2,3	215	1,0	21.894	100
Régimen especial	395	19,4	1.539	75,7	48	2,3	35	1,7	17	0,8	2.033	100
Subsidiado.	5.497	24,5	15.534	69,2	567	2,5	573	2,6	289	1,3	22.460	100
Vinculado.	2.296	20,2	8.174	72,0	312	2,7	370	3,3	199	1,8	11.351	100
Indeterminado	280	22,5	872	70,2	34	2,7	37	3,0	19	1,5	1.242	100
Ns/Nr.	103	17,1	458	76,0	20	3,4	14	2,3	7	1,2	602	100
Total	13.211	22,2	42.514	71,4	1.574	2,6	1.537	2,6	746	1,3	59.582	100

Ns/Nr: No sabe/ No responde.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.11. Tipo de consumo de alcohol según área, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Tipo de consumo	Área					
	Cabecera		Centro poblado		Rural disperso	
	No.	%	No.	%	No.	%
No consumidor	9.754	21,2	1.814	24,7	1.643	26,3
Bebedor social	33.184	72,2	5.059	68,9	4.271	68,3
Consumo de riesgo	1.275	2,8	189	2,6	110	1,8
Consumo perjudicial	1.194	2,6	201	2,7	142	2,3
Dependencia alcohólica	583	1,3	78	1,1	85	1,4
Total	45.990	100	7.341	100	6.251	100

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.10. Tipo de consumo de alcohol en ex consumidores, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Tipo de consumo	Ex-consumidor	
	No.	%
Bebedor social	935	68,6
Consumo de riesgo	162	11,9
Consumo perjudicial	148	10,9
Dependencia alcohólica	117	8,6
Total	1.362	100

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.11. Tipo de consumo de alcohol y edad de inicio según sexo, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Sexo	Tipo de consumo	Edad de inicio de consumo de alcohol				Desviación típica
		Media	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	
Hombre	Bebedor social	14,5	15	12	16	3,71
	Consumo de riesgo	14,4	15	12	16	4,04
	Consumo perjudicial	14,3	15	12	16	3,38
	Dependencia alcohólica	14	14	12	16	3,4
	Total	14,4	15	12	16	3,71
Mujer	Bebedor social	16,8	16	14	19	5,67
	Consumo de riesgo	16	15	13	18	5,77
	Consumo perjudicial	16,4	15	13	18	5,54
	Dependencia alcohólica	16	15	13	18	4,29
	Total	16,8	16	14	19	5,66

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.14. Consumo de riesgo, perjudicial y dependencia al alcohol según departamento, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Departamento	Tipo de consumo					
	Consumo de riesgo		Consumo perjudicial		Dependencia alcohólica	
	No	%	No	%	No	%
Caldas	28	2,1	35	2,7	42	3,1
Meta	28	2,5	42	3,8	30	2,7
Medellín y Área Metropolitana	174	3,4	167	3,3	113	2,2
Nariño	63	3,1	75	3,7	45	2,2
Chocó	32	4,7	20	3,0	13	1,9
Guaviare	2	2,4	3	3,1	2	1,9
Caquetá	13	2,2	15	2,5	11	1,8
Cauca	37	2,1	60	3,4	33	1,8
Tolima	51	2,7	53	2,8	27	1,5
Córdoba	31	1,5	31	1,6	30	1,5
Risaralda	32	2,6	33	2,6	16	1,3
Resto Valle Del Cauca	60	2,1	60	2,1	37	1,3
Magdalena	29	2,0	38	2,6	18	1,3
Bogotá	367	3,8	282	2,9	115	1,2
Putumayo	8	4,3	8	4,1	2	1,1
Vaupés	1	3,0	1	3,0	0	1,1
Cali Y Yumbo	79	2,7	60	2,1	32	1,1
Resto Antioquia	93	2,6	103	2,9	40	1,1
La Guajira	13	1,5	10	1,2	9	1,1
Vichada	0	1,2	1	2,9	0	1,1
Cesar	26	2,1	41	3,3	11	0,9
Santander	53	2,1	43	1,7	21	0,8
Cundinamarca	43	1,3	70	2,1	28	0,8
Amazonas	2	4,3	1	3,4	0	0,7
Bolívar	107	4,1	86	3,3	18	0,7
Boyacá	26	1,5	38	2,2	12	0,7
Guainía	0	0,8	0	1,1	0	0,6
Huila	10	0,7	39	2,7	9	0,6
San Andrés	4	3,7	4	4,3	1	0,5
Atlántico	83	2,9	57	2,0	16	0,5
Sucre	31	2,7	25	2,2	5	0,5
Quindío	18	2,2	19	2,3	4	0,5
Arauca	2	1,1	2	1,3	1	0,4
Norte De Santander	21	1,3	11	0,7	6	0,3
Casanare	6	1,9	3	1,1	1	0,2
Total	1.574	2,6	1.537	2,6	746	1,3

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.12. Condiciones socio económicas y ambientales y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Dimensión	Categorías	Riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica			
		Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Nivel educativo	No saber leer y escribir	0,1	-0,2	0,8	[0,7-1,0]
	Mayor nivel de formación académica	0,0	0	1,0	[0,9-1,0]
	Presentar ninguna formación académica o de preescolar	0,2	-0,1	0,9	[0,7-1,1]
Características socioeconómicas	Mayor nivel de estrato socioeconómico	0,0	-0,1	0,9	[0,9-1,0]
	No estar en el régimen contributivo o en régimen especial	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,4]
Características de la ocupación	No ocupa la mayor parte del tiempo trabajando	0,0	-0,3	0,7	[0,7-0,8]
	No tener un Ingreso fijo en la actualidad como empleador, obrero o empleado de empresa particular o del gobierno	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,3]
	La empresa donde trabaja no lo tiene afiliado a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP)	0,0	0,4	1,5	[1,3-1,8]
	Mayor número de horas de trabajo a la semana	0,1	0,0	1	[1,0-1,0]
	No vivir en una vivienda tipo casa o apartamento	0,0	0,5	1,7	[1,3-2,1]
Estresores sociales	En los últimos dos años la vivienda ha sido afectada por estar en una zona de riesgo	0,2	0,1	1,1	[1,0-1,4]
	No tener vivienda propia pagada	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,3]
	Percibir que la mayoría de las personas de esta cuadra/vereda no están dispuestas a ayudar cuando alguno de los vecinos tiene una emergencia	0,0	0,1	1,1	[1,1-1,2]
	Percibir que en los vecinos de esta cuadra/ vereda no se puede confiar	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,3]

5. **Valor p:** Significación estadística

6. **b:** Coeficiente de regresión

7. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

8. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.13. Morbilidad sentida en los últimos 30 días y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Morbilidad sentida en los últimos 30 días	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Alguna lesión, causada por accidente o violencia	0,0	0,5	1,7	[1,4-2,0]
Alguna , intoxicación o envenenamiento causado por accidente, intento de suicidio o por terceros	0,4	0,2	1,2	[0,7-2,0]
Algún problema mental, emocional o de los nervios	0,0	0,8	2,2	[1,9-2,5]
Algún problema de salud, dolor físico o malestar diferente a los mencionados	0,0	0,6	1,7	[1,6-1,9]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.14. Auto reporte de enfermedad crónica y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Autoreporte de enfermedad crónica	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
ha tenido dolor o molestia de espalda o cuello por más de quince días	0,0	0,5	1,6	[1,5-1,8]
Otro dolor por más de 15 días	0,0	0,6	1,9	[1,7-2,1]
ha tenido alergias diagnosticadas por un médico	0,0	0,2	1,3	[1,1-1,5]
ha tenido trombosis o derrames en el cerebro	0,0	0,4	1,5	[1,1-2,2]
ha tenido un ataque al corazón (infarto)	0,0	0,4	1,5	[1,1-2,1]
Le han diagnosticado alguna enfermedad del corazón	0,0	0,3	1,4	[1,1-1,8]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía presión arterial elevada	0,0	0,3	1,4	[1,2-1,6]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía asma	0,0	0,3	1,3	[1,0-1,6]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía tuberculosis	0,0	0,8	2,3	[1,4-4,0]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía cualquier otra enfermedad pulmonar de larga duración, como enfisema	0,0	0,6	1,8	[1,2-2,7]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía diabetes o azúcar elevada en la sangre	0,3	0,1	1,1	[0,9-1,4]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía una úlcera en su estómago o intestino	0,0	0,5	1,6	[1,4-1,8]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía colon irritable	0,0	0,4	1,4	[1,2-1,7]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tiene una infección por VIH o SIDA	0,3	0,8	2,2	[0,5-10,3]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía epilepsia o ataques	0,3	-0,3	0,8	[0,4-1,3]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía cáncer	0,7	-0,1	0,9	[0,5-1,7]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía alguna otra enfermedad de larga duración o que no se cura	0,4	-0,1	0,9	[0,7-1,2]
Le han diagnosticado con presión arterial elevada o hipertensión	0,0	0,3	1,4	[1,2-1,6]
Presencia del colesterol alto	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,4]
Presencia de los triglicéridos altos	0,0	0,2	1,2	[1,0-1,4]
Presencia de diabetes o azúcar elevada en la sangre	0,3	0,1	1,1	[0,9-1,4]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.15. Funcionamiento y discapacidad sentida en los últimos 30 días y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Funcionamiento y discapacidad sentida	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para mantenerse concentrado haciendo algo por diez minutos o más	0,0	0,7	1,9	[1,6-2,3]
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para aprender algo nuevo	0,0	0,3	1,3	[1,0-1,6]
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para relacionarse con personas que no conoce	0,0	0,4	1,5	[1,2-1,6]
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para realizar bien las actividades de la casa	0,0	0,4	1,4	[1,1-1,8]
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para realizar su trabajo, estudio o actividad diaria	0,0	0,4	1,5	[1,2-1,7]
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para participar, al mismo nivel que el resto de las personas, en actividades de la comunidad.	0,0	0,3	1,4	[1,1-1,8]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.16. Actividad física en los últimos 30 días y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Actividad física	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
No realizó en los últimos 30 días actividades físicas vigorosas, que lo hicieran sudar mucho y aumentan bastante su respiración o ritmo cardíaco	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,3]
No realizó en los últimos 30 días, actividades físicas ligeras que lo hicieran sudar un poco e incrementarían levemente su respiración o ritmo cardíaco	0,2	0,1	1,1	[1,0-1,2]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.17. Motivo de la última consulta y hospitalización y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Motivo de la última consulta y hospitalización	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
La última consulta fue por un problema mental, emocional, de los nervios o de comportamiento	0,1	0,4	1,5	[0,9-2,5]
La última consulta fue por problema o enfermedad de la boca o los dientes	0,1	0,3	1,3	[1,0-1,8]
La última consulta fue lesión por accidente o violencia	0,0	0,5	1,6	[1,3-2,1]
La última consulta fue disminución en capacidad para hacer cosas	0,6	0,2	1,2	[0,6-2,3]
Ha estado hospitalizado (a) en el último año una o más noches	0,0	0,2	1,3	[1,1-1,5]
La causa de la última hospitalización fue la enfermedad física No obstetricia	0,8	0,1	1,1	[0,7-1,6]
La causa de la última hospitalización fue un problema mental, emocional, de los nervios o de comportamiento	0,6	-0,4	0,7	[0,2-3,0]
La causa de la última hospitalización fue una lesión por accidente o violencia	0,2	0,3	1,3	[0,8-2,0]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.21. Victimización y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Dimensión	En el último año:	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
VICTIMIZACIÓN	Si lo han Empujado o zarandeado	0,0	1,0	2,7	[2,4-3,1]
	Si lo han agredido físicamente con objeto	0,0	1,0	2,7	[2,2-3,3]
	Si le han mordido	0,0	0,9	2,4	[1,6-3,6]
	Si le han Apuñeteado, pateado o arrastrado:	0,0	0,9	2,5	[2,0-3,0]
	Si le han amenazado con arma	0,0	0,8	2,2	[1,8-2,7]
	Si le han agredido físicamente con arma	0,0	0,7	2,0	[1,5-2,6]
	Si le han tratado de estrangular o quemar	0,0	1,3	3,5	[2,2-5,4]
	Si le han agredido sexualmente	0,0	1,5	4,5	[2,3-8,7]
	Varias veces ha sido agredido físicamente en cualquiera de sus formas	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
	La persona que le agredió la última vez, había consumido Alcohol	0,0	0,5	1,7	[1,3-2,1]
	La persona que le agredió la última vez, había consumido Drogas	0,1	0,3	1,3	[1,0-1,8]
	Usted había consumido alcohol cuando lo agredieron la última vez	0,0	1,1	3,1	[2,5-3,9]
	Usted había consumido alguna droga cuando lo agredieron la última vez	0,1	0,6	1,8	[1,0-3,2]
VIOLENCIA EN EL HOGAR	Antes de los 18 años lo castigaron físicamente en su hogar	0,0	0,5	1,7	[1,5-1,9]
	Sus padres se agredían entre si	0,0	0,5	1,7	[1,5-1,9]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.18. Accidentalidad y riesgo consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Accidentes de tránsito	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Algún accidente de tránsito en 2007	0,0	0,6	1,8	[1,5-2,2]
Algún accidente de tránsito en 2006	0,0	0,6	1,8	[1,5-2,2]
Algún accidente de tránsito en 2005	0,0	0,6	1,8	[1,4-2,2]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.19. Creencias legitimadoras de la violencia y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Dimensión	Estar en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
CREENCIAS LEGITIMADORAS DEL USO DE LA VIOLENCIA	Si otros niños insultan o le pegan a su hijo, usted le diría que los insulte o les pegue también, que no se deje	0,0	-0,1	0,9	[0,8-0,9]
	El castigo físico es a veces necesario para educar a los hijos	0,0	-0,1	0,9	[0,9-1,0]
	Cuando un hombre golpea a una mujer, muy seguramente es porque ella le dio motivos	0,0	-0,3	0,7	[0,7-0,8]
	La agresión física es necesaria para que lo respeten a uno	0,0	-0,2	0,8	[0,8-0,9]
	La agresión física a veces es necesaria para poner fin a un problema	0,0	-0,1	0,9	[0,8-1,0]
	Si uno no responde a una agresión física es un cobarde	0,0	-0,2	0,8	[0,8-0,9]
	La agresión física es cuestión de tragos:	0,0	-0,3	0,7	[0,7-0,8]
	El que agrede físicamente tiene más poder que los otros	0,0	-0,2	0,8	[0,7-0,9]
	Hay situaciones en las cuales se justifica que un hombre le dé una cachetada a su esposa o compañera	0,0	-0,2	0,8	[0,8-0,9]
	La agresión física entre miembros de la familia es un asunto privado	0,0	-0,3	0,8	[0,7-0,8]
	La agresión física debe ser delito sólo si se le pega a alguien que no es familiar	0,0	-0,1	0,9	[0,8-1,0]
	La agresión física sólo ocurre entre la población más pobre	0,0	-0,2	0,9	[0,8-0,9]
	El que agrede físicamente a otros está enfermo	0,0	-0,2	0,8	[0,8-0,9]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.20. Infección de transmisión sexual y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Infección de transmisión sexual y conductas de riesgo	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
La última vez que tuvo relaciones sexuales, no usó condón	0,8	0,0	1,0	[0,9-1,2]
La última vez que tuvo relaciones sexuales, consumió alguna bebida con alcohol como aguardiente, vino, ron, whisky o cerveza	0,0	0,9	2,5	[2,1-2,9]
La última vez que tuvo relaciones sexuales, consumió alguna droga o estimulante	0,0	1,0	2,7	[1,6-4,5]
mayor número de parejas sexuales en los últimos 6 meses	0,9	0,0	1,0	[1,0-1,0]
mayor número de parejas sexuales en los últimos 30 días	0,1	0,0	1,0	[1,0-1,1]
En el último año le han diagnosticado alguna infección de transmisión sexual	0,0	0,9	2,5	[1,5-4,3]
Un médico o profesional de la salud le ha dicho que estaba infectado con el virus de la Hepatitis B	0,2	-0,2	0,8	[0,5-1,2]
Percepción de alta probabilidad de estar infectado con el virus del VIH	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,2]
Al menos una conducta de alto riesgo para el contagio de VIH	0,0	0,8	2,2	[2,0-2,6]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.21. Percepción de daño a la salud por el consumo de sustancias psicoactivas y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Percepción de daño a la salud por el consumo de sustancias psicoactivas	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
El consumo de Marihuana es muy perjudicial	0,0	-0,4	0,7	[0,6-0,8]
El consumo de Bazuco o pitillo es muy perjudicial	0,8	0,1	1,1	[0,7-1,6]
El consumo de Cocaína es perjudicial	0,6	-0,1	0,9	[0,6-1,4]
El consumo de Heroína es perjudicial	0,4	-0,2	0,8	[0,5-1,3]
El consumo de Cigarrillo es perjudicial	0,1	-0,1	0,9	[0,8-1,0]
El consumo de Alcohol es perjudicial	0,0	-0,1	0,9	[0,7-1,0]
El consumo de Inhalantes (boxer, gasolina, esmaltes) es perjudicial	0,0	-0,3	0,7	[0,5-1,0]
El consumo de pastillas estimulantes (éxtasis, anfetaminas) es perjudicial	0,2	-0,2	0,8	[0,6-1,1]
El consumo de Pastillas tranquilizantes (ativan, rivotril, diazepam, entre otras) es perjudicial	0,6	-0,1	0,9	[0,8-1,2]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.22. Percepción de problemas en la familia por el consumo de sustancias psicoactivas y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007.

Percepción de problemas	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
El consumo de Marihuana causa problemas graves en la familia	0,4	-0,1	0,9	[0,8-1,1]
El consumo de Bazuco o pitillo causa problemas graves en la familia	0,5	0,1	1,1	[0,8-1,6]
El consumo de Cocaína causa problemas graves en la familia	0,6	0,1	1,1	[0,8-1,6]
El consumo de Heroína causa problemas graves en la familia	0,8	-0,1	0,9	[0,7-1,4]
El consumo de Cigarrillo causa problemas graves en la familia	0,0	-0,3	0,8	[0,7-0,9]
El consumo de Alcohol causa problemas graves en la familia	0,0	-0,2	0,8	[0,7-0,9]
El consumo de Inhalantes (boxer, gasolina, esmaltes, entre otras) causa problemas graves en la familia	0,1	-0,2	0,8	[0,7-0,9]
El consumo de Pastillas estimulantes (éxtasis, anfetaminas, entre otras) causa problemas graves en la familia	0,5	-0,1	0,9	[0,7-0,9]
El consumo de Pastillas tranquilizantes (ativan, rivotril, diazepam, entre otras) causa problemas graves en la familia	0,1	-0,2	0,8	[0,7-0,9]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.23. Prevalencia de uso en la vida, en los últimos 30 días y Prevalencia de consumo de 100 cigarrillos en la vida según sexo, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Prevalencia	Sexo					
	Hombre		Mujer		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Prevalencia de vida	10.648	45,8	7.509	25,9	18.157	35,2
Prevalencia de haber probado solo una vez.	3.344	13,1	3.219	10,1	6.563	11,5
Prevalencia de haber probado más de una vez	7.558	32,7	4.699	15,7	12.257	23,7
Prevalencia de consumo de 100 cigarrillos en la vida	5.941	26,1	3.272	11,0	9.213	18,1
Prevalencia de uso en los últimos 30 días	4.115	17,8	2.143	7,1	6.258	12,1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.24. Prevalencia de uso en la vida, en los últimos 30 días y Prevalencia de consumo de 100 cigarrillos en la vida según grupo de edad, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Grupos de edad	Prevalencia de vida		Prevalencia de consumo de 100 cigarrillos en la vida		Prevalencia de uso en los últimos 30 días	
	No.	%	No.	%	No.	%
12 a 14	598	6,4	10	0,1	32	0,3
15 a 19	2.455	24,2	506	5,7	631	6,6
20 a 24	1.906	38,3	772	15,6	716	14,3
25 a 29	1.692	34,5	678	14,7	585	12,6
30 a 34	1.430	32,6	604	14,0	484	10,9
35 a 39	1.418	29,3	698	14,2	555	11,6
40 a 44	1.880	39,6	1.065	23,0	729	15,6
45 a 49	1.990	48,3	1.280	31,1	799	19,0
50 a 54	1.716	47,4	1.158	32,0	652	17,7
55 a 59	1.488	51,0	951	32,6	488	16,9
60 a 64	1.183	50,2	804	34,2	361	14,9
65 a 69	1.064	51,6	687	34,1	227	10,7
Total	18.819	35,2	9.213	18,1	6.258	12,1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.29. Prevalencia de uso en la vida, en los últimos 30 días y Prevalencia de consumo de 100 cigarrillos en la vida según área de ubicación de la vivienda, población 12-69 años. Colombia, 2007.

Área	Prevalencia de vida		Prevalencia de consumo de 100 cigarrillos en la vida		Prevalencia de uso en los últimos 30 días	
	No.	%	No.	%	No.	%
Cabecera	14.913	35,9	7.280	18,5	4.898	12,2
Centro poblado	2.146	33,3	1.031	16,9	748	12,3
Rural disperso	1.760	32,1	902	16,9	612	11,2
Total	18.819	35,2	9.213	18,1	6.258	12,1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.25. Prevalencia de uso en la vida, en los últimos 30 días y Prevalencia de consumo de 100 cigarrillos en la vida según Departamento, población 12-69 años, Colombia, 2007.

Departamento	Prevalencia de vida		Prevalencia de consumo de 100 cigarrillos en la vida		Prevalencia de uso en los últimos 30 días	
	No.	%	No.	%	No.	%
Medellín y Área Metropolitana	1.888	37,1	1.007	19,6	755	14,8
Risaralda	502	39,7	287	22,7	186	14,7
Vaupés	7	35,7	3	15,9	3	14,5
Bogotá	3.702	37,9	1.856	19,0	1.357	13,9
Caldas	570	43,1	289	21,8	181	13,7
Resto Antioquia	1268	35,6	634	18,0	458	12,9
Tolima	732	37,9	409	21,2	241	12,5
Quindío	322	38,5	164	19,6	104	12,4
Nariño	792	39,0	337	16,6	247	12,2
Choco	177	25,9	109	15,9	79	11,6
Guainía	4	25,4	3	15,8	2	11,5
Cauca	475	26,3	245	13,6	199	11,1
Cali y Yumbo	1.086	37,0	474	16,2	270	9,19
Amazonas	9	24,0	4	10,4	3	9,0
Sucre	297	26,1	141	12,4	98	8,6
Resto Valle del Cauca	520	17,9	317	10,9	243	8,4
Guaviare	30	37,1	12	15,1	7	8,3
Cundinamarca	879	26,4	437	13,1	276	8,3
Bolívar	764	29,5	324	12,5	214	8,3
Huila	483	35,0	205	14,8	114	8,2
Casanare	69	22,3	35	11,2	25	8,1
Cesar	306	24,5	172	13,8	101	8,1
Córdoba	498	25,1	255	12,8	153	7,7
Norte de Santander	379	22,8	198	11,9	127	7,7
Santander	583	22,9	281	11,1	191	7,5
Meta	517	46,6	175	15,8	83	7,4
Magdalena	315	21,7	168	11,6	104	7,2
Vichada	8	25,1	4	13,3	2	7,1
San Andrés	26	25,3	12	11,8	7	7,0
Atlántico	724	25,1	305	10,6	198	6,9
Boyacá	448	25,8	178	10,2	118	6,8
Caquetá	205	34,5	67	11,2	38	6,4
La Guajira	144	17,2	71	8,5	53	6,3
Arauca	42	22,0	19	10,3	12	6,2
Putumayo	50	25,7	20	10,4	11	5,6
Total	18.819	35,2	9.213	18,1	6.258	12,1

Cuadro 4.26. Cronicidad e intensidad de uso en consumidores actuales y ex consumidores de cigarrillo, población 12 a 69 años, Colombia, 2007.

Intensidad de consumo de cigarrillos.	Cronicidad de uso cigarrillo en consumidores actuales							
	Mín.	Máx.	Media	I.C 95%	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv. E
Baja	1	56	7,8	[4,2-5,0]	4	1	10	9,4
Media	1	56	11,6	[8,1-9,0]	6	2	20	12
Alta	1	57	16,6	[16,7-14,9]	15	5	26	13,5
Total	1	57	12,4	[12,0-12,7]	7	2	20	12,4
Cronicidad de uso cigarrillo en ex consumidores								
Baja	1	48	4,6	[7,4-8,3]	2	1	5	6,6
Media	1	57	8,5	[11,1-12,0]	5	1	12	9,7
Alta	1	57	14,2	[16,0-17,1]	10	4	20	12
Total	1	57	9,5	[9,2-9,8]	5	1	15	10,6

Desv. E: Desviación estándar

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.27. Cronicidad de uso en consumidores actuales y ex consumidores de cigarrillo según sexo, población 12 a 69 años, Colombia, 2007.

Sexo	Cronicidad de uso cigarrillo en consumidores actuales							
	Mín.	Máx.	Media	I.C 95%	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv. E
Hombre	1	57	12,1	[11,7-12,4]	7	2	20	12,3
Mujer	1	56	12,9	[12,4-13,5]	8	2	20	12,1
Total	1	57	12,3	[12,0-12,7]	7	2	20	12,2
Cronicidad de uso cigarrillo en ex consumidores								
Hombre	1	53	10,2	[9,8-10,6]	6	2	15	11
Mujer	1	57	8,6	[8,1-9,0]	4	1	12	10
Total	1	57	9,5	[9,2-9,8]	5	1	15	11

Desv. E: Desviación estándar

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.28. Cronicidad de uso en consumidores actuales y ex consumidores de cigarrillo según grupo de edad, población 12 a 69 años, Colombia, 2007.

Grupos de edad	Cronicidad de uso cigarrillo en consumidores actuales							
	Mín.	Máx.	Media	I.C 95%	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv. E
dic-17	1	7	1,6	[1,5-1,7]	1	1	2	1,06
18-24	1	13	3,2	[3,0-3,3]	2	1	4	2,47
25-34	1	24	6,5	[6,1-6,8]	5	2	10	5,21
35-44	1	34	12,5	[12,0-13,0]	10	3	20	9,02
45-69	1	57	19,9	[19,3-20,4]	20	5	30	14,25
Total	1	57	12,4	[12,0-12,7]	7	2	20	12,44
Cronicidad de uso cigarrillo en ex consumidores								
dic-17	1	6	1,3	[1,2-1,4]	1	1	1	0,76
18-24	1	12	2,2	[2,0-2,4]	1	1	3	1,87
25-34	1	22	3,6	[3,3-3,9]	2	1	5	3,73
35-44	1	32	6,7	[6,2-7,2]	4	1	10	6,65
45-69	1	57	13,3	[12,8-13,7]	10	3	20	11,81
Total	1	57	9,5	[9,2-9,8]	5	1	15	10,6

Desv. E: Desviación estándar

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.29. Cronicidad de uso en consumidores actuales y ex consumidores de cigarrillo según estrato socioeconómico, población 12 a 69 años, Colombia, 2007

Estrato socioeconómico	Cronicidad de uso cigarrillo en consumidores actuales							
	Mín.	Máx.	Media	I.C 95%	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv. E
Sin estrato/pirata	1	52	15,5	[13,1-17,8]	10	3	25	14,03
Uno	1	57	13,9	[13,2-14,5]	10	2	21	13,19
Dos	1	57	11,6	[11,1-12,1]	6	2	20	11,92
Tres	1	52	11,1	[10,4-11,8]	5	2	20	11,81
Cuatro	1	50	12	[9,9-14,2]	8	2	20	12,47
Cinco	1	50	16,3	[11,6-21,1]	10	3	29	14,58
Seis	1	40	11,3	[4,7-17,9]	4	1	27	13,68
Total	1	57	12,4	[12,0-12,7]	7	2	20	12,47
Cronicidad de uso cigarrillo en ex consumidores								
Sin estrato/pirata	1	50	11,6	[8,1-13,0]	6	1	15	14
Uno	1	57	10,1	[9,1-10,3]	5	1	15	11
Dos	1	57	9,7	[9,2-10,2]	5	1	15	11
Tres	1	54	9,1	[8,5-9,7]	5	1	15	10
Cuatro	1	41	7,9	[7,5-10,5]	4	1	10	9
Cinco	1	50	12,5	[9,2-18,7]	6	4	20	12
Seis	1	27	10,3	[6,2-16,4]	6	1	20	10
Total	1	57	9,7	[9,3-9,9]	5	1	15	11

Desv. E: Desviación estándar

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.30. Cronicidad de uso en consumidores actuales y ex consumidores de cigarrillo según tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, población 12 a 69 años, Colombia, 2007.

Tipo de afiliación.	Cronicidad de uso cigarrillo en consumidores actuales							
	Mín.	Máx.	Media	I.C 95%	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv. E
Contributivo.	1	57	11,6	[11,3-12,5]	7	2	20	11,78
Régimen especial	1	52	10	[9,2-12,7]	6	2	15	10,34
Subsidiado.	1	56	13,4	[12,9-13,9]	10	2	20	12,9
Vinculado.	1	57	11,1	[10,7-12,0]	6	2	19	11,87
Indeterminado	1	50	11,2	[9,5-12,7]	8	2	16	11,24
Ns/Nr.*	1	40	10,5	[8,7-13,7]	5	2	19	10,84
Total	1	57	12,4	[12,0-12,7]	7	2	20	12,44
Cronicidad de uso cigarrillo en ex consumidores								
Contributivo.	1	52	9,5	[9,1-10,0]	5	1	15	10
Régimen especial	1	50	9,3	[7,9-10,6]	6	2	15	10
Subsidiado.	1	57	10,9	[9,9-10,9]	5	1	17	12
Vinculado.	1	50	7,9	[7,5-8,7]	4	1	10	9
Indeterminado	1	37	7,2	[6,0-8,8]	3	1	10	8
Ns/Nr.	1	22	7,7	[3,8-8,1]	4	1	18	8
Total	1	57	9,6	[9,2-9,8]	5	1	15	11

*Ns/Nr. No sabe/ No responde

Desv. E: Desviación estándar

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.31. Cronicidad de uso en consumidores actuales y ex consumidores de cigarrillo según nivel educativo, población 12 a 69 años, Colombia, 2007.

Nivel educativo	Cronicidad de uso cigarrillo en consumidores actuales							
	Mín.	Máx.	Media	I.C 95%	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv. E
Básica primaria o menos	1	57	16,4	[15,9-16,9]	15	4	25	13,65
Básica secundaria y media	1	50	10,2	[9,7-10,6]	5	2	15	10,81
Técnico o tecnológico	1	44	8,9	[7,7-10,1]	5	2	12	9,55
Universitaria sin título	1	40	10,8	[8,8-12,7]	7	3	16	10,33
Universitaria con título	1	45	10,9	[9,4-12,3]	8	3	17	10,11
Postgrado con o sin título	1	36	11,3	[8,4-14,2]	9	2	20	10,18
Total	1	57	13,2	[12,9-13,6]	10	2	20	12,62
Nivel educativo	Cronicidad de uso cigarrillo en ex consumidores							
	Mín.	Máx.	Media	I.C 95%	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv. E
Básica primaria o menos	1	57	12,5	[12,0-13,0]	10	2	20	12,08
Básica secundaria y media	1	50	7,7	[7,3-8,1]	4	1	10	8,61
Técnico o tecnológico	1	41	7,1	[6,1-8,2]	3	1	10	8,78
Universitaria sin título	1	35	6,1	[4,7-7,5]	4	1	10	6,84
Universitaria con título	1	32	7,5	[6,5-8,6]	5	1	11	7,82
Postgrado con o sin título	1	37	7,8	[6,0-9,7]	5	2	10	8,47
Total	1	57	10,1	[9,8-10,4]	5	2	15	10,78

Desv. E: Desviación estándar

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.32. Condiciones socio económicas y ambientales y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007.

Dimensión	Variable	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
NIVEL EDUCATIVO	No saber leer y escribir	0,0	0,4	1,5	[1,3-1,6]
	Mayor nivel de formación académica	0,0	-0,1	0,9	[0,9-0,9]
	Presentar ninguna formación académica o de preescolar	0,0	0,3	1,3	[1,2-1,5]
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS	Mayor nivel de estrato socioeconómico	0,0	0,0	1,0	[0,9-1,0]
	No estar en el régimen contributivo o en régimen especial	0,0	0,4	1,5	[1,4-0-1,6]
CARACTERÍSTICAS DE LA OCUPACIÓN	No ocupa la mayor parte del tiempo trabajando	0,0	-0,1	0,9	[0,8-1,0]
	No tiene un Ingreso fijo en la actualidad como empleador, obrero o empleado de empresa particular o del gobierno	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,4]
	La empresa donde trabaja no lo tiene afiliado a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP)	0,0	0,4	1,6	[1,4-1,7]
	Mayor número de horas de trabajo a la semana	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
	Vivienda tipo casa o apartamento	0,0	0,5	1,6	[1,3-1,9]
	En los últimos dos años la vivienda ha sido afectada por estar en una zona de riesgo	0,0	0,2	1,3	[1,1-1,4]
	No tener vivienda propia pagada	0,0	0,2	1,2	[1,2-1,3]
ESTRESORES SOCIALES	Percibir que la mayoría de las personas de esta cuadra/vereda no están dispuestas a ayudar cuando alguno de los vecinos tiene una emergencia	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,2]
	Percibir que en los vecinos de esta cuadra/ vereda, no se puede confiar	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,2]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.33. Morbilidad sentida en los últimos 30 días y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007

Morbilidad sentida en los últimos 30 días	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Alguna lesión, causada por accidente o violencia	0,0	0,3	1,3	[1,1-1,6]
Alguna intoxicación o envenenamiento causado por accidente, intento de suicidio o por terceros	0,1	0,3	1,4	[0,9-2,0]
Algún problema mental, emocional o de los nervios	0,0	0,4	1,5	[1,3-1,6]
Algún problema de salud, dolor físico o malestar diferente a los mencionados	0,0	0,3	1,3	[1,2-1,4]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.34. Auto reporte de enfermedad crónica y riesgo de dependencia nicotínica en la población. Colombiana, 2007

Autoreporte de enfermedad crónica	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Ha tenido dolor o molestia de espalda o cuello por más de quince días	0,0	0,3	1,3	[1,2-1,4]
Otro dolor por más de 15 días	0,0	0,2	1,3	[1,2-1,4]
Ha tenido alergias diagnosticadas por un médico	0,6	0,0	1,0	[0,9-1,1]
Ha tenido trombosis o derrames en el cerebro	0,3	-0,2	0,8	[0,6-1,2]
Ha tenido un ataque al corazón (infarto)	0,4	0,1	1,1	[0,9-1,5]
Le han diagnosticado alguna enfermedad del corazón	0,2	0,1	1,1	[0,9-1,4]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía presión arterial elevada	0,0	-0,3	0,7	[0,7-0,8]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía asma	0,9	0,0	1,0	[0,8-1,2]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía tuberculosis	0,0	0,7	1,9	[1,2-3,1]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía cualquier otra enfermedad pulmonar de larga duración, como enfisema	0,4	0,2	1,2	[0,8-1,7]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía diabetes o azúcar elevada en la sangre	0,0	-0,3	0,7	[0,6-0,9]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía una úlcera en su estómago o intestino	0,0	0,4	1,5	[1,3-1,6]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía colon irritable	0,3	0,1	1,1	[0,9-1,2]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tiene una infección por VIH o SIDA	0,8	-0,2	0,8	[0,2-3,7]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía epilepsia o ataques	0,6	-0,1	0,9	[0,6-1,3]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía cáncer	0,1	0,3	1,4	[1,0-1,9]
Un profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía alguna otra enfermedad de larga duración o que no se cura	0,5	0,1	1,1	[0,9-1,2]
diagnosticado con presión arterial elevada o hipertensión	0,0	-0,3	0,7	[0,7-0,8]
Presencia del colesterol alto	0,0	-0,2	0,8	[0,8-0,9]
Presencia de los triglicéridos altos	0,0	-0,2	0,8	[0,8-0,9]
Presencia de diabetes o azúcar elevada en la sangre	0,0	-0,3	0,7	[0,6-0,9]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.35. Funcionamiento y discapacidad sentida en los últimos 30 días y riesgo de consumo perjudicial y dependencia alcohólica en la población colombiana, 2007

Funcionamiento y discapacidad sentida	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para mantenerse concentrado haciendo algo por diez minutos o más	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,4]
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para aprender algo nuevo	1,0	0,0	1,0	[0,8-1,2]
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para relacionarse con personas que no conoce	0,5	0,1	1,1	[0,9-1,3]
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para realizar bien las actividades de la casa	0,1	0,2	1,2	[1,0-1,4]
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para realizar su trabajo, estudio o actividad diaria	0,3	0,1	1,1	[0,9-1,2]
En los últimos 30 días, si ha tenido dificultad para participar, al mismo nivel que el resto de las personas, en actividades de la comunidad.	0,4	0,1	1,1	[0,9-1,4]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.36. Actividad física en los últimos 30 días y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007.

Actividad física	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
No realizó en los últimos 30 días actividades físicas vigorosas, que lo hicieran sudar mucho y aumentan bastante su respiración o ritmo cardíaco	0,0	0,2	1,2	[1,1-1,3]
No realizó en los últimos 30 días, actividades físicas ligeras que lo hicieran sudar un poco e incrementarían levemente su respiración o ritmo cardíaco	0,0	0,1	1,2	[1,1-1,3]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.42. Motivo de la última consulta y hospitalización y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007.

Motivo de la última consulta y hospitalización	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
La última consulta fue por un problema mental, emocional, de los nervios o de comportamiento	0,2	0,3	1,3	[0,9-2,0]
La última consulta fue por problema o enfermedad de la boca o los dientes	0,0	0,5	1,6	[1,3-2,1]
La última consulta fue lesión por accidente o violencia	0,0	0,5	1,6	[1,3-2,0]
La última consulta fue disminución en capacidad para hacer cosas	0,8	-0,1	0,9	[0,5-1,6]
Hospitalizado (a) en el último año una o más noches	0,1	-0,1	0,9	[0,8-1,0]
La causa de la última hospitalización fue la enfermedad física No obstetricia	0,0	0,4	1,5	[1,1-2,1]
La causa de la última hospitalización fue un problema mental, emocional, de los nervios o de comportamiento	0,2	0,6	1,9	[0,8-4,4]
La causa de la última hospitalización fue una lesión por accidente o violencia	1,0	0,0	1,0	[0,7-1,5]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.37. Victimización y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007.

Dimensión	En el último año:	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
VICTIMIZACIÓN	Si lo han Empujado o zarandeado	0,0	0,7	2,0	[1,8-2,3]
	Si lo han agredido físicamente con objeto	0,0	0,6	1,9	[1,6-2,3]
	Si le han mordido	0,0	0,8	2,2	[1,5-3,0]
	Si le han Apuñeteado, pateado o arrastrado	0,0	0,8	2,2	[1,9-2,6]
	Si le han amenazado con arma	0,0	0,8	2,3	[1,9-2,7]
	Si le han agredido físicamente con arma	0,0	0,8	2,2	[1,8-2,8]
	Si le han tratado de estrangular o quemar	0,0	0,7	2,0	[1,3-2,9]
	Si le han agredido sexualmente	0,0	0,9	2,5	[1,5-4,1]
	Varias veces ha sido agredido físicamente en cualquiera de sus formas	0,0	0,0	1,0	[1,0-1,0]
	La persona que le agredió la última vez, había consumido Alcohol	0,0	0,4	1,5	[1,2-1,8]
	La persona que le agredió la última vez, había consumido Drogas	0,0	0,6	1,9	[1,4-2,5]
	Usted había consumido alcohol cuando lo agredieron la última vez	0,0	0,7	2,0	[1,6-2,4]
	Usted había consumido alguna droga cuando lo agredieron la última vez	0,0	1,3	3,6	[2,2-6,1]
	VIOLENCIA EN EL HOGAR	Antes de los 18 años si lo castigaron físicamente en su hogar	0,0	0,3	1,3
Sus padres se agredían entre si		0,0	0,2	1,2	[1,1-1,3]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.38. Accidentalidad y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007

Accidentes de transito	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
En lo que va corrido del 2007, ¿Tuvo usted algún accidente de tránsito?	0,0	0,2	1,3	[1,1-1,5]
En el 2006, ¿Tuvo usted algún accidente de tránsito?	0,0	0,5	1,6	[1,3-1,9]
En el 2005, ¿Tuvo usted algún accidente de tránsito?	0,0	0,3	1,3	[1,1-1,6]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.39. Creencias legitimadoras de la violencia y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007.

DIMENSION	Estar en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
CREENCIAS LEGITIMADORAS DEL USO DE LA VIOLENCIA	Si otros niños insultan o le pegan a su hijo, usted le diría que los insulte o les pegue también, que no se deje	0,2	0,0	1,0	[0,9-1,0]
	El castigo físico es a veces necesario para educar a los hijos	0,3	0,0	1,0	[0,9-1,0]
	Cuando un hombre golpea a una mujer, muy seguramente es porque ella le dio motivos	0,0	-0,1	0,9	[0,8-0,9]
	La agresión física es necesaria para que lo respeten a uno	0,0	-0,2	0,8	[0,8-0,9]
	La agresión física a veces es necesaria para poner fin a un problema	0,0	-0,2	0,8	[0,8-0,8]
	Si uno no responde a una agresión física es un cobarde	0,0	-0,2	0,8	[0,8-0,9]
	La agresión física es cuestión de tragos:	0,0	-0,2	0,9	[0,8-0,9]
	El que agrede físicamente tiene más poder que los otros	0,0	-0,1	0,9	[0,9-1,0]
	Hay situaciones en las cuales se justifica que un hombre le dé una cachetada a su esposa o compañera	0,0	-0,1	0,9	[0,9-1,0]
	La agresión física entre miembros de la familia es un asunto privado	0,0	-0,2	0,8	[0,8-0,9]
	La agresión física debe ser delito sólo si se le pega a alguien que no es familiar	0,0	-0,1	0,9	[0,8-0,9]
	La agresión física sólo ocurre entre la población más pobre	0,0	-0,1	0,9	[0,8-0,9]
El que agrede físicamente a otros está enfermo	0,0	-0,1	0,9	[0,9-0,9]	

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.40. Infección de transmisión sexual y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007.

Riesgo de infección de transmisión sexual y conductas de riesgo	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
La última vez que tuvo relaciones sexuales, no usó condón	0,0	-0,1	0,9	[0,8-1,0]
La última vez que tuvo relaciones sexuales, consumió alguna bebida con alcohol como aguardiente, vino, ron, whisky o cerveza	0,0	0,8	2,2	[1,9-2,5]
La última vez que tuvo relaciones sexuales, consumió alguna droga o estimulante	0,0	0,8	2,2	[1,3-3,6]
Mayor número de parejas sexuales en los últimos 6 meses	0,7	0,0	1,0	[1,0-1,0]
Mayor número de parejas sexuales en los últimos 30 días	0,3	0,0	1,0	[1,0-1,1]
En el último año le han diagnosticado alguna infección de transmisión sexual	0,2	0,3	1,4	[0,9-2,2]
Un médico o profesional de la salud le ha dicho que estaba infectado con el virus de la Hepatitis B	0,9	0,0	1,0	[0,8-1,3]
Percepción de alta probabilidad de estar infectado con el virus del VIH	0,0	0,1	1,1	[1,1-1,1]
Al menos una conducta de alto riesgo para el contagio de VIH	0,0	0,5	1,6	[1,4-1,8]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.41. Percepción de acceso a las sustancias psicoactivas y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007

Variable	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Es muy difícil conseguir Marihuana	0,2	0,0	1,0	[0,9-1,0]
Es muy difícil conseguir Bazuco o pitillo	0,9	0,0	1,0	[0,9-1,1]
Es muy difícil conseguir Cocaína	0,6	0,0	1,0	[1,0-1,1]
Es muy difícil conseguir Heroína	0,2	0,0	1,0	[1,0-1,1]
Es muy difícil conseguir Hongos alucinógenos	0,4	0,0	1,0	[1,0-1,1]
Es muy difícil conseguir Inhalantes (boxer, gasolina, esmaltes)	0,2	0,0	1,0	[0,9-1,0]
Es muy difícil conseguir Pastillas estimulantes (éxtasis, anfetaminas)	0,9	0,0	1,0	[1,0-1,1]
Es muy difícil conseguir Pastillas tranquilizantes (ativan, rivotril, diazepam)	0,7	0,0	1,0	[1,0-1,1]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.42. Percepción de daño a la salud por el consumo de sustancias psicoactivas y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007.

Percepción de daño a la salud	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
El consumo de Marihuana es muy perjudicial	0,0	-0,5	0,6	[0,6-0,7]
El consumo de Bazuco o pitillo es muy perjudicial	0,2	-0,2	0,8	[0,6-1,1]
El consumo de Cocaína es perjudicial	0,4	-0,2	0,9	[0,6-1,2]
El consumo de Heroína es perjudicial	0,8	0,1	1,1	[0,7-1,6]
El consumo de Cigarrillo es perjudicial	0,0	-0,5	0,6	[0,5-0,7]
El consumo de Alcohol es perjudicial	0,0	-0,3	0,8	[0,7-0,9]
El consumo de Inhalantes (boxer, gasolina, esmaltes) es perjudicial	0,9	0,0	1,0	[0,8-1,3]
El consumo de pastillas estimulantes (éxtasis, anfetaminas) es perjudicial	0,3	-0,1	0,9	[0,7-1,1]
El consumo de Pastillas tranquilizantes (ativan, rivotril, diazepam, entre otras) es perjudicial	0,8	0,0	1,0	[0,9-1,2]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.43. Percepción de problemas en la familia por el consumo de sustancias psicoactivas y riesgo de dependencia nicotínica en la población colombiana, 2007

Percepción de problemas en la familia	Valor p ¹	b ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
El consumo de Marihuana causa problemas graves en la familia	0,0	-0,4	0,7	[0,6-0,8]
El consumo de Bazuco o pitillo causa problemas graves en la familia	0,1	-0,2	0,8	[0,6-1,0]
El consumo de Cocaína causa problemas graves en la familia	0,0	-0,3	0,7	[0,6-0,9]
El consumo de Heroína causa problemas graves en la familia	0,1	-0,2	0,8	[0,6-1,0]
El consumo de Cigarrillo causa problemas graves en la familia	0,0	-0,6	0,6	[0,5-0,6]
El consumo de Alcohol causa problemas graves en la familia	0,0	-0,4	0,6	[0,6-0,7]
El consumo de Inhalantes (boxer, gasolina, esmaltes, entre otras) causa problemas graves en la familia	0,2	-0,1	0,9	[0,7-1,1]
El consumo de Pastillas estimulantes (éxtasis, anfetaminas, entre otras) causa problemas graves en la familia	0,1	-0,2	0,8	[0,7-1,0]
El consumo de Pastillas tranquilizantes (ativan, rivotril, diazepam, entre otras) causa problemas graves en la familia	0,0	-0,2	0,8	[0,7-0,9]

1. **Valor p:** Significación estadística

2. **b:** Coeficiente de regresión

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.44. Prevalencia de consumo de marihuana en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según sexo, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Sexo	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
Hombre	1.650	12	328	2,4	148	1,1
Mujer	393	2,5	91	0,6	31	0,2
Total	2.043	6,9	419	1,4	179	0,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.45. Edad de inicio del primer consumo de marihuana, población 18-69 años, Colombia, 2007.

	Mín.	Máx.	Media	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv. Est.
Edad al primer consumo de marihuana	5	58	17,7	17	15	19	4,65

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.46. Prevalencia de consumo de marihuana en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según grupo de edad, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Grupos de edad	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
18-24	545	9,1	234	3,9	66	1,1
25-29	300	8,0	65	1,7	42	1,1
30-34	218	6,6	33	1,0	24	0,7
35-39	170	5,4	22	0,7	10	0,3
40-44	226	6,9	29	0,9	13	0,4
45-49	203	7,0	15	0,5	7	0,2
50-54	183	7,4	15	0,6	14	0,6
55-59	117	6,0	5	0,3	3	0,1
60-64	45	2,9	1	0,1	0	0,0
65-69	36	2,6	0	0,0	0	0,0
Total	2.043	6,9	419	1,4	179	0,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.47. Prevalencia de consumo de marihuana en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según estrato socioeconómico, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Estrato socioeconómico	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
Sin estrato/pirata	20	5,6	6	1,8	0	0,0
Uno	369	5,3	53	0,8	20	0,3
Dos	788	7,1	164	1,5	77	0,7
Tres	551	8,0	119	1,7	55	0,8
Cuatro	105	8,8	17	1,4	3	0,2
Cinco	29	6,6	12	2,9	3	0,8
Seis	5	4,8	0	0,0	0	0,0
Total	1.865	6,9	372	1,4	158	0,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.48. Prevalencia de consumo de marihuana en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según nivel educativo, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Nivel educativo	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
Básica primaria o menos	629	5,6	88	0,8	60	0,5
Básica secundaria y media	878	8,0	167	1,5	81	0,7
Técnico o tecnológico	168	8,3	25	1,2	4	0,2
Universitaria sin título	35	6,2	4	0,7	4	0,8
Universitaria con título	80	4,7	12	0,7	4	0,2
Postgrado con o sin título	17	6,2	1	0,5	0	0,2
Total	1.810	6,7	335	1,2	153	0,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.49. Prevalencia de consumo de marihuana en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Tipo de afiliación	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
Contributivo.	805	7,1	97	0,9	24	0,2
Régimen especial	51	4,7	17	1,6	0	0,0
Subsidiado.	665	6,1	145	1,3	77	0,7
Vinculado.	465	8,4	151	2,7	76	1,4
Indeterminado	33	5,5	2	0,3	0	0,0
Ns/Nr.	24	6,9	9	2,5	3	0,8
Total	2043	6,9	419	1,4	179	0,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.50. Prevalencia de consumo de marihuana en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según área, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Área	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
Cabecera	1.728	7,6	340	1,5	162	0,7
Centro poblado	185	5,0	18	0,5	7	0,2
Rural disperso	125	3,9	19	0,6	9	0,3
Total	2.039	6,9	377	1,3	179	0,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.51. Prevalencia de consumo de marihuana en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según departamento, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Departamento	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
Cali y Yumbo	176	10,9	43	2,6	32	2,0
San Andrés	5	10,5	1	3,2	1	1,8
Medellín y Área Metropolitana	340	13,9	87	3,6	42	1,7
Risaralda	96	14,6	22	3,4	10	1,5
Tolima	61	6,6	11	1,2	7	0,8
Guainía	0	5,0	0	1,2	0	0,8
Valle Del Cauca	91	6,6	21	1,6	10	0,7
Bogotá	412	8,0	77	1,5	36	0,7
Vaupés	1	6,0	0	1,5	0	0,7
Chocó	17	5,8	4	1,4	2	0,6
Amazonas	1	6,3	0	1,2	0	0,6
Vichada	0	3,3	0	0,9	0	0,6
Quindío	20	5,2	6	1,5	2	0,6
Antioquia	166	10,4	26	1,6	9	0,6
Sucre	16	3,2	3	0,6	3	0,5
Cundinamarca	56	3,5	3	0,2	7	0,5
Magdalena	20	2,8	4	0,5	2	0,3
Putumayo	15	16,6	2	2,4	0	0,3
Córdoba	32	3,3	4	0,4	3	0,3
Huila	31	4,7	2	0,3	2	0,2
Atlántico	70	4,5	13	0,8	3	0,2
Bolívar	55	4,3	10	0,7	2	0,2
Caldas	60	8,7	6	0,9	1	0,2
Guaviare	3	9,1	1	1,6	0	0,1
Casanare	8	5,4	1	0,7	0	0,1
Santander	67	5,0	10	0,8	2	0,1
Nariño	59	5,4	8	0,8	1	0,1
La Guajira	12	3,0	2	0,4	0	0,1
Arauca	2	2,7	0	0,0	0	0,0
Boyacá	13	1,6	1	0,2	0	0,0
Caquetá	26	10,1	3	1,3	0	0,0
Cauca	52	6,7	1	0,1	0	0,0
Cesar	16	2,7	0	0,1	0	0,0
Meta	27	4,8	2	0,4	0	0,0
Norte de Santander	9	1,1	0	0,0	0	0,0
Total	2.039	6,9	377	1,3	179	0,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.52. Intensidad del consumo de marihuana en número de días del último mes según sexo, población 18 a 69 años, Colombia, 2007.

Días de consumo en el último mes	Sexo					
	Hombre		Mujer		Total	
	No	%	No	%	No	%
8 o menos	80	53,8	13	43,0	93	52,0
9 a 29	34	22,8	3	11,1	37	20,8
30 días	35	23,4	14	45,9	49	27,2
Total	148	100,0	31	100,0	179	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.53. Intensidad del número cigarrillos de marihuana por el número de días de consumo en el último mes según sexo, población 18 a 69 años, Colombia, 2007.

Sexo	Días de consumo en el último mes	Numero de cigarrillos de marihuana						
		Mín.	Máx.	Media	Mediana	Perc. 25	Perc.75	Desv. E
Hombres	8 o menos	1	30	4,6	2	1	5	5,6
	De 9 a 29	1	60	18,0	15	6	30	14,3
	30+	1	210	47,4	30	4	60	54,0
	Total	1	210	22,8	6	2	30	38,1
Mujeres	8 o menos	1	3	1,6	1	1	2	0,9
	De 9 a 29	20	50	35,0	35	20	50	21,2
	30+	5	60	28,0	30	15	30	20,8
	Total	1	60	18,2	10	2	30	20,5
Total	8 o menos	1	30	4,2	2	1	5	5,3
	De 9 a 29	1	60	19,7	15	8	30	15,3
	30+	1	210	44,7	30	5	60	50,9
	Total	1	210	22,3	6	2	30	36,4

Desv. E: Desviación estándar

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.54. Edad de inicio del consumo de marihuana según la intensidad en número de días de consumo en el último mes.

Días de consumo en el último mes	Edad de inicio del consumo de marihuana aunque fuera solo una vez.						
	Mín.	Máx.	Media	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv.
8 o menos	9	42	16,8	16	14	18	4,7
De 9 a 29	12	29	17,0	16	14	19	4,1
30	6	39	15,1	14	13	17	5,4
Total	6	42	16,3	15	14	18	4,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.55. Consumo de otras sustancias psicoactivas en fumadores de marihuana en el último mes, población 18 a 69 años, Colombia, 2007.

Dimensión	Categorías	Prevalencia del último mes marihuana							
		No		Si		Nunca usadores ¹		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Intensidad de consumo de cigarrillos en fumadores actuales.	Baja	68	14,3	19	17,1	801	22,3	888	21,2
	Media	134	28,2	53	48,2	1.664	46,3	1.852	44,3
	Alta	273	57,5	39	34,7	1.129	31,4	1.441	34,5
	Total	475	100,0	111	100,0	3.595	100,0	4.180	100,0
Intensidad de consumo de cigarrillos en ex-consumidores.	Baja	96	19,1	7	42,9	616	21,6	719	21,4
	Media	209	41,7	9	50,7	1.329	46,7	1.547	46,0
	Alta	197	39,2	1	6,5	902	31,7	1.100	32,7
	Total	501	100,0	17	100,0	2.847	100,0	3.366	100,0
Prevalencia del último mes cocaína	Perdido	1.445	99,5	150	86,7	28.000	100,0	29.595	99,9
	Si	8	0,5	23	13,3	5	0,0	35	0,1
	No	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1.453	100,0	173	100,0	28.005	100,0	29.630	100,0	
Riesgo de dependencia al alcohol	Riesgo bajo	1.058	72,6	116	67,5	25.933	92,6	27.108	91,5
	Riesgo medio	123	8,4	16	9,3	862	3,1	1.002	3,4
	Riesgo Alto	276	18,9	40	23,2	1210	4,3	1.526	5,1
	Total	1.456	100,0	173	100,0	28.006	100,0	29.635	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

¹Usadores de otras sustancias que nunca han usado marihuana o menores de 17 años, para el caso del consumo de alcohol y tabaco.

Cuadro 4.56. Prevalencia de consumo de cocaína en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según sexo, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Sexo	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
Hombre	460	3,4	137	1,0	28	0,2
Mujer	77	0,5	18	0,1	7	0,0
Total	536	1,8	155	0,5	35	0,1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.57. Edad de inicio de la oportunidad de uso y edad del primer consumo de cocaína, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Edad	Mín.	Máx.	Media	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv.
Edad en la que se le presento la oportunidad	11	50	21,4	20	17	25	6,8
Edad de inicio del primer consumo	11	50	21,4	20	17	25	6,8

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.58. Prevalencia de consumo de cocaína en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según grupo de edad, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Grupos de edad	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
18 - 24	136	2,3	73	1,2	3	0,1
25 - 29	81	2,2	28	0,7	5	0,1
30 - 34	82	2,5	14	0,4	8	0,2
35 - 39	44	1,4	11	0,3	1	0,0
40 - 44	63	1,9	16	0,5	11	0,3
45 - 49	51	1,8	3	0,1	2	0,1
50 - 54	47	1,9	8	0,3	5	0,2
55 - 59	16	0,8	0	0,0	0	0,0
60 - 64	6	0,4	0	0,0	0	0,0
65 - 69	9	0,7	1	0,1	0	0,0
Total	536	1,8	155	0,5	35	0,1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.59. Prevalencia de consumo de cocaína en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según grupo estrato socioeconómico, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Estrato socioeconómico	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
Sin estrato/pirata	3	0,8	0	0,0	0	0,0
Uno	99	1,4	28	0,4	7	0,1
Dos	177	1,6	41	0,4	15	0,1
Tres	182	2,6	60	0,9	9	0,1
Cuatro	25	2,1	4	0,4	0	0,0
Cinco	3	0,8	3	0,8	0	0,0
Seis	3	2,3	0	0,0	0	0,0
Total	492	1,8	137	,5	31	0,1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.60. Prevalencia de consumo de cocaína en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según grupo nivel educativo, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Nivel educativo	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No.	%	No.	%	No.	%
Básica primaria o menos	125	1,1	35	0,3	18	0,2
Básica secundaria y media	238	2,2	74	0,7	14	0,1
Técnico o tecnológico	64	3,1	14	0,7	0	0,0
Universitaria sin título	19	3,4	2	0,4	0	0,0
Universitaria con título	28	1,6	7	0,4	0	0,0
Postgrado con o sin título	7	2,6	0	0,0	0	0,0
Total	480	1,8	132	0,5	33	0,1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.61. Prevalencia de consumo de cocaína en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según tipo de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Tipo de afiliación.	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No	%	No	%	No	%
Contributivo.	210	1,9	50	0,4	7	0,1
Régimen especial	12	1,1	3	0,2	0	0,0
Subsidiado.	137	1,3	41	0,4	11	0,1
Vinculado.	158	2,9	58	1,1	16	0,3
Indeterminado	12	2,1	2	0,3	0	0,0
Ns/Nr.*	7	1,9	2	0,5	0	0,0
Total	536	1,8	155	0,5	35	0,1

*Ns/Nr: No sabe No responde.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.62. Prevalencia de consumo de Cocaína en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según área, población 18-69 años, Colombia, 2007

Área	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No	%	No	%	No	%
Cabecera	480	2,1	145	0,6	34	0,2
Centro poblado	38	1,0	7	0,2	1	0,0
Rural disperso	18	0,6	3	0,1	0	0,0
Total	536	1,8	155	0,5	35	0,1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 4.63. Prevalencia de consumo de marihuana en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días según Departamento, población 18-69 años, Colombia, 2007.

Departamento	Prevalencia de vida		Prevalencia del último año		Prevalencia del último mes	
	No	%	No	%	No	%
San Andrés	2	3,8	1	1,3	0	1,0
Cali y Yumbo	83	5,1	6	0,4	11	0,7
Amazonas	0	2,9	0	0,0	0	0,0
Resto Valle del Cauca	24	1,7	27	1,9	5,8	0,4
Putumayo	6	6,5	1	0,8	0	0,0
Medellín y Área Metropolitana	70	2,9	32	1,3	6	0,2
Magdalena	10	1,4	3	0,4	1	0,2
Chocó	8	2,6	1	0,5	0	0,0
Bogotá	108	2,1	38	0,7	7	0,1
Bolívar	16	1,3	4	0,3	2	0,1
Atlántico	23	1,5	6	0,4	1	0,1
Resto De Antioquia	30	1,9	3	0,2	0	0,0
Arauca	0	0,1	0	0,0	0	0,0
Boyacá	2	0,2	0	0,0	0	0,0
Caldas	9	1,3	3	0,4	0	0,0
Caquetá	14	5,3	1	0,2	0	0,0
Casanare	3	1,8	0	0,0	0	0,0
Cauca	14	1,8	1	0,1	0	0,0
Cesar	3	0,5	0	0,0	0	0,0
Córdoba	8	0,8	1	0,1	0	0,0
Cundinamarca	11	0,7	6	0,4	0	0,0
Guainía	0	1,9	0	0,0	0	0,0
Guaviare	1	2,6	0	0,0	0	0,0
Huila	9	1,3	2	0,3	0	0,0
La Guajira	4	1,0	1	0,2	0	0,0
Meta	9	1,6	0	0,0	0	0,0
Nariño	7	0,7	2	0,2	0	0,0
Norte De Santander	4	0,4	0	0,0	0	0,0
Quindío	8	2,0	2	0,4	0	0,0
Risaralda	29	4,4	10	1,6	0	0,0
Santander	8	0,6	0	0,0	0	0,0
Sucre	1	0,2	0	0,0	0	0,0
Tolima	14	1,5	4	0,5	0	0,0
Vaupés	0	3,3	0	0,0	0	0,0
Vichada	0	0,7	0	0,0	0	0,0
Total	536	1,8	155	0,5	35	0,1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.64. Tiempo transcurrido desde el último de consumo de Cocaína según sexo, población 18 a 69 años, Colombia 2007.

Sexo	Tiempo de último consumo de cocaína en años							
	Mín.	Máx.	Media	IC 95%	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv.
Hombre	0	50	13,9	[12,8-14,9]	12	3	23	11,4
Mujer	0	32	11,5	[9,0-14,1]	8	2	20	10,2
Total	0	50	13,6	[12,6-14,6]	12	3	23	11,3

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.65. Tiempo transcurrido desde el último consumo de Cocaína según el grupo de edad, población 18 a 69 años, Colombia, 2007.

Grupos de edad	Tiempo de ultimo consumo de cocaína en años							
	Mín.	Máx.	Media	I.C 95%	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv.
18-24	0	17	2,9	[2,2-3,5]	2	0	4	3,2
25-34	0	27	7,5	[6,4-8,6]	7	2	12	6,3
35-44	0	29	14,4	[12,6-16,2]	17	7	21	9,0
45-65	0	50	23,2	[21,8-24,6]	25	20	30	9,4
66-69	1	50	26,3	[15,4-37,2]	26	19	35	15,3
Total	0	50	13,6	[12,6-14,6]	12	3	23	11,3

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.66. Tiempo transcurrido desde el ultimo de consumo de Cocaína según el nivel educativo, población 18 a 69 años, Colombia, 2007.

Nivel educativo	Tiempo de ultimo consumo de cocaína en años							
	Mín.	Máx.	Media	IC 95%	Mediana	Perc. 25	Perc. 75	Desv.
Básica primaria o menos	0	50	16,3	[14,4-18,2]	17	5	26	12,0
Básica secundaria y media	0	50	12,2	[10,7-13,7]	10	3	20	10,8
Técnico o tecnológico	0	35	12,3	[9,4-15,2]	11	4	20	9,9
Universitaria sin título	0	32	16,7	[11,5-22,0]	20	4	25	10,9
Universitaria con título	0	40	17,7	[13,3-22,1]	18	10	29	11,9
Postgrado con o sin título	5	36	20,1	[12,3-27,9]	20	10	25	10,2
Total	0	50	14,3	[13,2-15,3]	14	3	24	11,4

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

TOMO II
ANEXOS CAPÍTULO V:
PLANIFICACIÓN FAMILIAR

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

CUADROS.

Cuadro 5.1. Distribución de las mujeres según nivel educativo, estado civil, afiliación al SGSSS y edad. Colombia, 2005.

Variable	Categoría	Mujeres encuestadas	
		No.	%
Grupo de edad	13 - 14	3.321	7,9
	15 - 19	7.247	17,2
	20 - 24	6.539	15,5
	25 - 29	5.755	13,7
	30 - 34	5.291	12,6
	35 - 39	5.207	12,4
	40 - 44	4.649	11,0
	45 - 49	4.147	9,8
	Total		42.156
Nivel educativo más alto	Ninguno	123	0,3
	Preescolar	10	0,0
	Primaria	11.807	28,8
	Secundaria	22.137	54,0
	Técnico/tecnológico	2.690	6,6
	Universidad	3.886	9,5
	Postgrado	337	0,8
	Sin respuesta	1.166	2,8
Total		42.156	100
Estado civil	Casado	7.798	18,5
	Unión libre	12.712	30,2
	Separado	4.760	11,3
	Viudo	810	1,9
	Soltero	16.067	38,1
	No responde	9	0,0
Total		42.156	100
Afiliación a la seguridad social	ISS	1.896	4,5
	EPS	10.724	25,4
	ARS	14.590	34,6
	Empresa solidaria	202	0,5
	Fuerzas militares/ policía nacional	552	1,3
	Ecopetrol	16	0,0
	Magisterio	724	1,7
	Foncolpuertos	13	0,0
	No está afiliado(a)	13.251	31,4
	No sabe	188	0,4
Total		42.156	100

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud-2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.2. Distribución del conocimiento y uso de métodos de planificación familiar. Colombia, 2005.

Métodos anticonceptivos		Personas encuestadas			
		Conoce		Ha usado	
		No.	%	No.	%
Esterilización femenina	Si	40.071	95,1	8.101	19,0
	No	2.085	4,9	31.970	76,0
	No aplica	0,0	0,0	2.085	5,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Esterilización masculina	Si	32.675	77,5	406	01,0
	No	9.481	22,5	32.269	77,0
	No aplica	0,0	0,0	9.481	22,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Píldora	Si	40.914	97,1	17.606	42,0
	No	1.242	2,9	23.308	55,0
	No aplica	0,0	0,0	1.242	3,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
DIU	Si	37.762	89,6	8.885	21,0
	No	4.394	10,4	28.877	69,0
	No aplica	0,0	0,0	4.394	10,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Inyección	Si	40.219	95,4	11.357	27,0
	No	1.937	4,6	28.862	68,0
	No aplica	0,0	0,0	1.937	5,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Implantes	Si	28.178	66,8	405	1,0
	No	13.978	33,2	27.773	66,0
	No aplica	0,0	0,0	13.978	33,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Condón	Si	41.341	98,1	17.234	41,0
	No	815	1,9	24.107	57,0
	No aplica	0,0	0,0	815	2,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Vaginales	Si	29.865	70,8	4.822	11,0
	No	12.291	29,2	25.043	59,0
	No aplica	0,0	0,0	12.291	29,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Amenorrea por lactancia Materna.	Si	22.322	53,0	2.987	7,0
	No	19.834	47,0	19.335	46,0
	No aplica	0,0	0,0	19.834	47,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Ritmo	Si	32.297	76,6	8.187	19,0
	No	9.859	23,4	24.110	57,0
	No aplica	0,0	0,0	9.859	23,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Retiro	Si	32.473	77,0	13.326	32,0
	No	9.683	23,0	19.147	45,0
	No aplica	0,0	0,0	9.683	23,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Emergencia	Si	15.009	35,6	1.038	2,0
	No	27.147	64,4	13.971	33,0
	No aplica	0,0	0,0	27.147	64,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0
Otro	Si	4.359	10,3	1.249	3,0
	No	37.797	89,7	3.110	7,0
	No aplica	0,0	0,0	37.797	90,0
	Total	42.156	100,0	42.156	100,0

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Cuadro 5.3. Lugar en el cual las encuestadas se practicaron la esterilización. Colombia, 2005.

Lugar de la esterilización	Personas encuestadas	
	No.	%
Hospital o clínica	5.573	66,5
Centro o puesto de salud del gobierno	133	1,6
Centro de EPS/ARS	370	4,4
Consultorio médico particular	34	0,4
PROFAMILIA	2.236	26,7
Otro	4	0,0
No sabe	27	0,3
Total	8.377	100,0

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Cuadro 5.4. Características del pago por la esterilización y entidad que lo cubrió. Colombia, 2005.

Características del pago	Categorías	Personas encuestadas	
		No.	%
Pagaron por la esterilización	Si, pago total	514	14,0
	Si, pago parcial	552	15,1
	No pagó nada	2.504	68,3
	No sabe	96	2,6
	Total	3.666	100
Cubrimiento de los costos de la esterilización	Entidad de seguridad social a la cual está afiliado	2.245	73,5
	Seguro médico, medicina prepagada, plan complementario	16	0,5
	Secretaría de salud, alcaldía	577	18,9
	PROFAMILIA	71	2,3
	Recursos parciales propios o de familiares	19	0,6
	Otro	101	3,3
	No sabe	27	0,9
Total	3.056	100	

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.5. Porcentaje de conocimiento sobre la irreversibilidad de la esterilización, el arrepentimiento por habérsela practicado y razones de dicho arrepentimiento. Colombia, 2005.

Pregunta	Categorías	Personas encuestadas	
		No	%
Sabía que la esterilización es irreversible	Si	7.118	85,0
	No	1.234	14,7
	No sabe	25	0,3
	Total	8.377	100,0
Arrepentimiento de la esterilización	Si	1.029	12,7
	No	7.072	87,3
	Total	8.101	100,0
Razón de arrepentimiento de la esterilización	Desea otro hijo	718	69,8
	Compañero desea otro hijo	147	14,3
	Efectos colaterales	94	9,1
	Niño murió	11	1,1
	Otra razón	59	5,7
Total	1.029	100,0	

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005

Cuadro 5.6. Distribución del conocimiento de la irreversibilidad de la esterilización según el nivel educativo de las encuestadas. Colombia, 2005.

Nivel educativo	Conocimiento de la irreversibilidad de la esterilización							
	Si		No		No sabe		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Ninguno	39	83,0	8	17,0	0	0,0	47	100
Preescolar	3	100,0	0	0,0	0	0,0	3	100
Primaria	2.873	83,8	546	15,9	9	0,3	3.428	100
Secundaria	3.066	86,2	476	13,4	13	0,4	3.555	100
Técnico/tecnológico	339	85,6	55	13,9	2	0,5	396	100
Universidad	434	87,9	59	11,9	1	0,2	494	100
Postgrado	78	90,7	8	9,3	0	0,0	86	100
Total	6.832	85,3	1.152	14,4	25	0,3	8.009	100

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Cuadro 5.7. Distribución del conocimiento sobre la irreversibilidad de la esterilización por grupos de edad. Colombia, 2005.

Grupos de edad	Conocimiento sobre la irreversibilidad de la esterilización							
	Si		No		Sin información		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
15-19	9	75,0	3	25,0	0	0,0	12	100
20-24	224	86,5	31	12,0	4	1,5	259	100
25-29	741	86,8	110	12,9	3	0,4	854	100
30-34	1.240	83,6	238	16,0	5	0,3	1.483	100
35-39	1.689	85,3	286	14,5	4	0,2	1.979	100
40-44	1.666	84,9	293	14,9	4	0,2	1.963	100
45-49	1.548	84,8	273	15,0	5	0,3	1.826	100
Total	7.117	85,0	1.234	14,7	25	0,3	8.376	100

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Cuadro 5.8. Distribución del conocimiento sobre la irreversibilidad de la esterilización según el estado civil actual. Colombia, 2005.

Estado civil actual	Sabía que la esterilización es irreversible							
	Si		No		No sabe		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Casada	2.633	86,7	400	13,2	3	0,1	3.036	100
En unión libre	2.930	84	551	15,8	9	0,3	3.490	100
Sin pareja	1.555	84	283	15,3	13	0,7	1.851	100
Total	7.118	85	1.234	14,7	25	0,3	8.377	100

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.9. Distribución del conocimiento de métodos de planificación familiar según el nivel educativo de las encuestadas. Colombia, 2005.

Método	Nivel educativo															
	Ninguno		Preescolar		Primaria		Secundaria		Técnico/tecnológico		Universidad		Postgrado		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Esterilización femenina	107	87,0	6	60,0	10.971	92,9	21.112	95,4	2.661	98,9	3.855	99,2	337	100,0	39.049	95,3
Esterilización masculina	66	53,7	2	20,0	7.830	66,3	17.549	79,3	2.564	95,3	3.790	97,5	335	99,4	32.136	78,4
Pildora	111	90,2	8	80,0	11.188	94,8	21.680	97,9	2.682	99,7	3.880	99,8	337	100,0	39.886	97,3
Diu	94	76,4	7	70,0	10.318	87,4	19.667	88,8	2.636	98,0	3.822	98,4	336	99,7	36.880	90,0
Inyección	107	87,0	9	90,0	11.043	93,5	21.198	95,8	2.668	99,2	3.856	99,2	337	100,0	39.218	95,7
Implantes	53	43,1	3	30,0	7.054	59,7	14.561	65,8	2.282	84,8	3.380	87,0	315	93,5	27.648	67,5
Condón	104	84,6	9	90,0	11.366	96,3	21.978	99,3	2.685	99,8	3.874	99,7	337	100,0	40.353	98,4
Vaginales	54	43,9	4	40,0	7.404	62,7	15.651	70,7	2.334	86,8	3.468	89,2	328	97,3	29.243	71,3
Mela	53	43,1	5	50,0	6.152	52,1	10.999	49,7	1.817	67,5	2.443	62,9	277	82,2	21.746	53,1
Ritmo	46	37,4	3	30,0	7.578	64,2	17.437	78,8	2.556	95,0	3.779	97,2	333	98,8	31.732	77,4
Retiro	70	56,9	5	50,0	8.093	68,5	17.124	77,4	2.507	93,2	3.702	95,3	332	98,5	31.833	77,7
Emergencia	20	16,3	2	20,0	2.438	20,6	8.035	36,3	1.479	55,0	2.604	67,0	229	68,0	14.807	36,1
Otro	16	13,0	1	10,0	1.275	10,8	2.068	9,3	319	11,9	423	10,9	57	16,9	4159	10,1

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.10. Distribución del deseo de hijos por el estado civil actual, grupos de edad y nivel educativo. Colombia, 2005.

Variable	Categorías	Deseo de hijos							
		Tener un/otro hijo		No más/ninguno		Otra		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Estado civil actual	Casada	1.627	34,0	2.778	58,1	380	7,9	4.785	100
	Unión libre	3.799	40,8	5.048	54,3	455	4,9	9.302	100
	Sin unión	13.200	67,0	5.508	28,0	984	5	19.692	100
	Total	18.626	55,1	13.334	39,5	1.819	5,4	33.779	100
Grupos de edad	Menor de 14	2.823	85,0	329	9,9	169	5,1	3.321	100
	15-19	5.983	82,7	1.068	14,8	184	2,5	7.235	100
	20-24	4.298	68,4	1.821	29,0	161	2,6	6.280	100
	25-29	2.643	53,9	2.056	42,0	202	4,1	4.901	100
	30-34	1.472	38,7	2.128	55,9	208	5,5	3.808	100
	35-39	836	25,9	2.182	67,6	210	6,5	3.228	100
	40-44	403	15,0	2.058	76,6	225	8,4	2.686	100
	45-49	168	7,2	1.692	72,9	460	19,8	2.320	100
	Total	18.626	55,1	13.334	39,5	1.819	5,4	33.779	100
Nivel educativo	Ninguno	24	31,6	44	57,9	8	10,5	76	100
	Preescolar	3	42,9	4	57,1	0	0,0	7	100
	Primaria	3.027	36,1	4.800	57,3	552	6,6	8.379	100
	Secundaria	11.475	61,8	6.266	33,7	841	4,5	18.582	100
	Técnico/tecnológico	1.488	64,9	683	29,8	123	5,4	2.294	100
	Universidad	2.318	68,3	884	26,1	190	5,6	3.392	100
	Postgrado	109	43,4	111	44,2	31	12,4	251	100
	Total	18.444	55,9	12.792	38,8	1.745	5,3	32.981	100

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.11. Distribución de la presentación de un embarazo como un problema según el estado conyugal, grupos de edad y nivel educativo de las encuestadas.

Variable	Categorías	Si ocurriera embarazo sería un problema										Total	
		Gran problema		Pequeño problema		No sería problema		Me pondría feliz		No puede quedar embarazada/no tiene relaciones sexuales			
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Estado conyugal actual	Casada	241	15,8	106	7,0	489	32,1	391	25,7	295	19,4	1522	100
	Unión libre	642	22,7	202	7,1	979	34,6	667	23,6	342	12,1	2832	100
	Sin unión	6.931	44,3	1179	7,5	2539	16,2	526	3,4	4478	28,6	15653	100
	Total	7.814	39,1	1487	7,4	4007	20,0	1584	7,9	5115	25,6	20007	100
Grupos de edad	Menor de 14	1.759	54,2	120	3,7	135	4,2	14	0,4	1215	37,5	3243	100
	15-19	2.764	50,7	454	8,3	682	12,5	106	1,9	1448	26,5	5454	100
	20-24	1.068	37,4	341	12,0	762	26,7	222	7,8	459	16,1	2852	100
	25-29	526	26,5	211	10,6	651	32,8	311	15,7	288	14,5	1987	100
	30-34	425	25,9	127	7,7	531	32,4	307	18,7	251	15,3	1641	100
	35-39	393	24,8	99	6,3	502	31,7	276	17,4	314	19,8	1584	100
	40-44	445	28,5	84	5,4	392	25,1	210	13,5	429	27,5	1560	100
45-49	434	25,7	51	3,0	352	20,9	138	8,2	711	42,2	1686	100	
Total	7.814	39,1	1487	7,4	4007	20,0	1584	7,9	5115	25,6	20007	100	
Nivel educativo	Ninguno	22	37,9	2	3,4	14	24,1	5	8,6	15	25,9	58	100
	Preescolar	1	25,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	2	50,0	4	100
	Primaria	1.690	37,1	249	5,5	997	21,9	402	8,8	1218	26,7	4556	100
	Secundaria	5.060	43,6	851	7,3	1930	16,6	741	6,4	3033	26,1	11615	100
	Técnico/tecnológico	303	24,6	131	10,7	382	31,1	164	13,3	250	20,3	1230	100
	Universidad	525	27,7	214	11,3	512	27,0	216	11,4	426	22,5	1893	100
Postgrado	23	15,4	12	8,1	44	29,5	20	13,4	50	33,6	149	100	
Total	7.624	39,1	1459	7,5	3880	19,9	1548	7,9	4994	25,6	19505	100	

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.12. Distribución del uso del método de planificación familiar por edad. Colombia, 2005.

Grupos de edad	Método de planificación usado																			
	Esterilización femenina		Esterilización masculina		Píldora		DIU		Inyección		Implantes		Condón		Vaginales		No usa		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
> 14	0	0,0	0	0,0	14	0,4	1	0,0	4	0,1	0	0,0	30	0,9	0	0,0	3272	98,5	3321	100
15-19	10	0,1	0	0,0	237	3,3	151	2,1	301	4,2	4	0,1	431	5,9	5	0,1	6.108	84,3	7.247	100
20-24	242	3,7	0	0,0	656	10,0	548	8,4	691	10,6	28	0,4	576	8,8	5	0,1	3.793	58,0	6.539	100
25-29	819	14,2	0	0,0	635	11,0	610	10,6	543	9,4	26	0,5	460	8,0	15	0,3	2.647	46,0	5.755	100
30-34	1.414	26,7	0	0,0	502	9,5	524	9,9	325	6,1	21	0,4	337	6,4	19	0,4	2.149	40,6	5.291	100
35-39	1.909	36,7	0	0,0	367	7,0	384	7,4	196	3,8	9	0,2	294	5,6	22	0,4	2.026	38,9	5.207	100
40-44	1.908	41,0	0	0,0	227	4,9	262	5,6	83	1,8	3	0,1	260	5,6	11	0,2	1.895	40,8	4.649	100
45-49	1.798	43,4	0	0,0	86	2,1	132	3,2	37	0,9	2	0,0	113	2,7	13	0,3	1.965	47,4	4.146	100
Total	8.100	19,2	0	0,0	2.724	6,5	2.612	6,2	2.180	5,2	93	0,2	2.501	5,9	90	0,2	23.855	56,6	42.155	100

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Cuadro 5.13. Distribución del uso del método de planificación familiar por nivel educativo. Colombia, 2005.

Método	Nivel educativo																	
	Ninguno		Preescolar		Primaria		Secundaria		Técnico/tecnológico		Universidad		Postgrado		No sabe		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Esterilización femenina	73	39,0	1	4,2	3300	34,9	3027	26,8	244	24,4	576	24,7	87	33,6	126	25,6	7434	29,7
Esterilización masculina	3	2,3	1	5,0	95	1,3	161	1,6	22	2,3	64	2,9	7	2,7	5	1,5	358	1,7
Píldora	104	56,2	11	45,8	5838	61,2	6692	58,7	562	55,9	1326	56,8	160	61,3	293	58,5	14986	59,3
DIU	52	28,7	10	43,5	2998	32,4	3665	32,8	332	33,5	838	36,2	118	45,6	115	25,1	8128	33,0
Inyección	52	28,4	12	52,2	3178	33,4	4594	40,3	408	40,8	918	39,3	81	31,0	157	31,7	9400	37,3
Implantes	3	2,4	0	0	102	1,5	164	1,8	24	2,7	58	2,8	8	3,2	7	2,1	366	1,9
Condón	56	29,6	10	41,7	3604	37,8	6224	54,6	654	64,9	1517	64,9	171	65,5	200	39,7	12436	49,2
Vaginales	24	18,3	5	26,3	1411	20,0	1886	20,5	171	19,7	463	22,4	62	24,5	73	20,2	4095	20,5
Mela	25	22,3	2	18,2	1148	19,3	1180	15,5	85	11,2	211	12,2	26	12,0	43	16,5	2720	16,4
Ritmo	24	20,0	3	15,0	1693	23,1	3058	30,4	406	42,0	965	43,1	129	50,4	75	21,7	6353	29,8
Retiro	68	46,9	6	31,6	3468	44,8	4879	47,8	467	49,4	996	45,0	106	41,9	159	43,6	10149	46,4
Emergencia	1	2,3	0	0	101	4,2	262	6,3	47	8,8	139	11,0	12	7,3	9	6,6	571	6,6
Otro	18	60,0	0	0	464	39,6	440	31,1	26	18,7	51	18,1	5	13,9	23	43,4	1027	32,9
Al menos un MPF	178	93,2	22	91,7	9146	94,2	10998	95,9	967	95,7	2268	96,8	257	98,5	467	90,5	24303	95,2

Fuente: PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Cuadro 5.14. Distribución de usuarias encuestada según nivel educativo, estado civil y afiliación al SGSSS. Colombia, 2007.

Dimensión	Categorías	No.	%	
Nivel educativo más alto alcanzado	Ninguno	32	1,6	
	Preescolar	1	0,0	
	Básica primaria	490	24,1	
	Básica secundaria y media	1122	55,2	
	Técnico o tecnológico	161	7,9	
	Universitaria sin título	134	6,6	
	Universitaria con título	81	4,0	
	Postgrado sin título	4	0,2	
	Postgrado con título	8	0,4	
	Total		2033	100,0
Estado Civil	Casado (a)	337	16,6	
	Unión libre	1107	54,5	
	Separado (a)	68	3,3	
	Viudo (a)	13	0,6	
	Soltero (a)	508	25,0	
	Total		2033	100,0
	Afiliación a al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Seguro Social ISS	40	2,0
Fuerzas militares, policía nacional		13	0,6	
ECOPETROL		0	0,0	
Magisterio		22	1,1	
Entidad promotora de salud (EPS), diferente al ISS.		642	31,6	
Administradora del régimen subsidiado (ARS).		994	48,9	
Otra entidad		41	2,0	
Carta de desplazado o desmovilizado		39	1,9	
Ninguno		242	11,9	
Total			2033	100,0

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.15. Total de consultas de planificación familiar por regiones y tipo de consulta. Colombia, 2007.

Región	Tipo de consulta de planificación familiar					
	Consulta de primera vez		Consulta de control		Consulta adicional a las programadas	
	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	133	37,9	213	60,7	5	1,4
Oriental	102	35,4	177	61,5	9	3,1
Central	215	34,7	395	63,7	10	1,6
Pacífica	86	30,4	182	64,3	15	5,3
Bogotá	166	41,8	218	54,9	13	3,3
Orinoquia y Amazonía	24	25,5	69	73,4	1	1,1
Total	726	35,7	1.254	61,7	53	2,6

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 5.16. Tipo de método de planificación familiar preferido y utilizado. Colombia, 2007.

Método	Tipo de método	No.	%
Hormonales	Píldora	554	27,3
	Inyección	610	30,0
	Implantes subdérmicos	60	3,0
	Subtotal	1.224	60,3
De barrera	DIU	389	19,1
	Óvulos anticonceptivos, espuma o jalea	4	0,2
	Condón	74	3,6
	Subtotal	467	22,9
Quirúrgicos	Ligadura de trompas o esterilización	221	10,9
	Vasectomía o esterilización masculina	33	1,6
	Subtotal	254	12,5
Otros métodos	Aún no ha decidido	22	1,1
	Ninguno	46	2,3
	Total	2.033	100,0

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.17. Libertad de elección del método de planificación familiar según región. Colombia, 2007.

Región	Libertad de elección			
	Sí		No	
	No.	%	No.	%
Atlántica	295	87,8	41	12,2
Oriental	258	94,2	16	5,8
Central	583	96,4	22	3,6
Pacífica	262	94,2	16	5,8
Bogotá	357	93,9	23	6,1
Orinoquía y Amazonía	87	94,6	5	5,4
Total	1842	93,7	123	6,3

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 5.18. Rol de la persona que toma la decisión del método de planificación a utilizar, según región. Colombia, 2007

Región	Decisión del método de planificación a utilizar															
	Fue el médico el que definió		Enfermera u otro personal de salud		Espos(a) o compañer(a)		Padre, madre, madrastra, padrastro		Otro familiar		Novio(a), amante o amigovio(a)		Amigo, vecino o conocido		No responde	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	34	82,9	5	12,2	0	0,0	0	0,0	2	4,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Oriental	12	75,0	2	12,5	0	0,0	1	6,3	0	0,0	0	0,0	1	6,3	0	0,0
Central	20	90,9	0	0,0	1	4,5	1	4,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Pacífica	9	56,3	5	31,3	1	6,3	0	0,0	1	6,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Bogotá	15	65,2	3	13,0	2	8,7	0	0,0	1	4,3	1	4,3	0	0,0	1	4,3
Orinoquía y Amazonía	5	100	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	95	77,2	15	12,2	4	3,3	2	1,6	4	3,3	1	0,8	1	0,8	1	0,8

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 5.19. Método de planificación familiar elegido mientras esperan la inserción del DIU. Colombia, 2007

Tipo de método	No.	%
Condón	25	30,5
Píldora	6	7,3
Inyección	4	4,9
Amenorrea por lactancia	1	1,2
Abstinencia periódica, ritmo, calendario	1	1,2
Otros métodos	1	1,2
Ninguno	32	39,0
No ha decidido	12	14,6
Total	82	100,0

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 5.20. Porcentaje de mujeres con inserción del DIU según región y afiliación a la seguridad social en salud. Colombia, 2007.

Variables	Categorías	Inserción del DIU			
		Sí		No	
		No.	%	No.	%
Región	Atlántica	41	82	9	18,0
	Oriental	56	81,2	13	18,8
	Central	98	83,1	20	16,9
	Pacífica	33	64,7	18	35,3
	Bogotá	63	75,9	20	24,1
	Orinoquía y Amazonía	16	88,9	2	11,1
	Total	307	78,9	82	21,1
Afiliación a la seguridad social en salud	Seguro Social ISS	8	66,7	4	33,3
	Fuerzas militares, policía nacional	4	80,0	1	20,0
	ECOPELROL	0	0,0	0	0,0
	Magisterio	2	66,7	1	33,3
	Entidad promotora de salud (EPS), diferente al ISS.	99	81,1	23	18,9
	Administradora del régimen subsidiado (ARS).	130	77,4	38	22,6
	Otra entidad	8	88,9	1	11,1
	Carta de desplazado o desmovilizado	10	76,9	3	23,1
	Ninguno	46	80,7	11	19,3
	Total	307	78,9	82	21,1

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 5.21. Método de Planificación Familiar elegido mientras le hacen la ligadura de trompas. Colombia, 2007.

Tipo de método	No.	%
Condón	29	17,8
Píldora	15	9,2
DIU	9	5,5
Inyección	25	15,3
Óvulos anticonceptivos, espuma o jalea	1	0,6
Amenorrea por lactancia	3	1,8
Abstinencia periódica, ritmo, calendario	6	3,7
Ninguno	75	46,0
Total	163	100,0

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 5.22. Tipo de método de planificación elegido mientras se realiza la ligadura de trompas, según grupo de edad. Colombia, 2007.

Edad	Método que va a utilizar mientras le hacen la ligadura							
	Condón	Píldora	DIU	Inyección	Óvulos anticonceptivos, espuma o jalea	Amenorrea por lactancia	Abstinencia periódica, ritmo, calendario	Ninguno
	%	%	%	%	%	%	%	%
15-19	25,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	25,0
20-24	19,4	2,8	8,3	13,9	0,0	0,0	0,0	55,6
25-29	8,5	14,9	4,3	14,9	0,0	4,3	4,3	48,9
30-34	17,8	8,9	4,4	17,8	2,2	2,2	2,2	44,4
35-39	27,8	5,6	5,6	11,1	0,0	0,0	0,0	50,0
40-44	36,4	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	27,3	9,1
45-49	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Total	17,8	9,2	5,5	15,3	0,6	1,8	3,7	46,0

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.23. Porcentaje de personas que entienden cómo usar el método de planificación familiar elegido, según región. Colombia, 2007.

Región	¿Entendió como usar correctamente su método de planificación familiar?			
	Sí		No	
	No.	%	No.	%
Atlántica	205	99,0	2	1,0
Oriental	165	98,2	3	1,8
Central	389	99,5	2	0,5
Pacífica	170	99,4	1	0,6
Bogotá	218	100,0	0	0,0
Orinoquía y Amazonía	59	100,0	0	0,0
Total	1.206	99,3	8	0,7

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 5.24. Porcentaje de personas que recibieron información sobre donde acceder al método de planificación, según región y afiliación al SGSSS. Colombia, 2007.

Variable	Categoría	¿Le dieron información sobre dónde puede conseguirlo?			
		Sí		No	
		No.	%	No.	%
Región	Atlántica	46	73,0	17	27,0
	Oriental	40	80,0	10	20,0
	Central	75	78,1	21	21,9
	Pacífica	39	81,3	9	18,8
	Bogotá	124	87,3	18	12,7
	Orinoquía y Amazonía	3	50,0	3	50,0
	Total	327	80,7	78	19,3
Afiliación a la seguridad social en salud	Seguro Social ISS	11	91,7	1	8,3
	Fuerzas militares, policía nacional	4	100	0	0,0
	ECOPETROL	0	0,0	0	0,0
	Magisterio	3	60,0	2	40
	Entidad promotora de salud (EPS), diferente al ISS.	156	82,1	34	17,9
	Administradora del régimen subsidiado (ARS).	99	78,6	27	21,4
	Otra entidad	4	100	0	0,0
	Carta de desplazado o desmovilizado	2	66,7	1	33,3
	Ninguno	48	78,7	13	21,3
	Total	327	80,7	78	19,3

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

TOMO II
ANEXOS CAPÍTULO VII:
CÁNCER DE CUELLO UTERINO

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

CUADROS.

Cuadro 7.1. Distribución de las mujeres colombianas mayores de 12 años por región y grupo étnico. Colombia, 2007.

Región	Grupo étnico													
	Indígena		Gitano		Raizal del archipiélago		Palenquero		Afrodescolombiana		Ninguno de los anteriores		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	530	7,0	14	0,2	28	0,4	16	0,2	845	11,2	6.120	81,0	7.552	100
Oriental	46	0,7	0	0,0	0	0,0	2	0,0	79	1,2	6.347	98,0	6.475	100
Central	449	4,7	2	0,0	0	0,0	7	0,1	422	4,4	8.694	90,8	9.575	100
Pacífica	601	9,5	6	0,1	23	0,4	10	0,2	1.744	27,4	3.971	62,5	6.354	100
Bogotá	123	1,9	7	0,1	0	0,0	1	0,0	147	2,3	6.058	95,6	6.335	100
Orinoquía y Amazonía	39	7,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	14	2,8	464	89,7	518	100
Total	1.787	4,9	29	0,1	51	0,1	36	0,1	3.251	8,8	31.654	86,0	36.808	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.2. Edad de las mujeres colombianas mayores de 12 años según región. Colombia, 2007.

Grupos de edad	Región													
	Atlántica		Oriental		Central		Pacífica		Bogotá		Orinoquía y Amazonía		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%								
12 - 17	1.298	17,2	1.110	17,1	1.462	15,3	1.021	16,1	871	13,8	95	18,3	5.857	15,9
18 - 24	1.306	17,3	1.000	15,5	1.538	16,1	1.026	16,2	1.131	17,8	93	17,9	6.095	16,6
25 - 34	1.529	20,2	1.252	19,3	1.837	19,2	1.256	19,8	1.267	20	107	20,7	7.248	19,7
35 - 44	1.453	19,2	1.241	19,2	1.860	19,4	1.190	18,7	1.234	19,5	95	18,4	7.073	19,2
45 - 54	1.027	13,6	1.003	15,5	1.475	15,4	933	14,7	1.004	15,9	72	13,9	5.514	15,0
55 - 69	939	12,4	868	13,4	1.403	14,7	927	14,6	828	13,1	56	10,8	5.021	13,6
Total	7.552	100	6.475	100	9.575	100	6.354	100	6.335	100	518	100	36.808	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 7.3. Distribución de las mujeres colombianas mayores de 12 años asalariadas y no asalariadas según región. Colombia, 2007.

Región	Asalariados					
	Si		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	1.267	49,6	1.288	50,4	2.555	100
Oriental	1.336	54,6	1.111	45,4	2.446	100
Central	2.147	61,5	1.345	38,5	3.492	100
Pacífica	1.379	49,3	1.418	50,7	2.797	100
Bogotá	1.933	62,4	1.165	37,6	3.097	100
Orinoquía y Amazonía	118	49,3	122	50,7	240	100
Total	8.180	55,9	6.448	44,1	14.628	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.4. Distribución por régimen de seguridad social de las mujeres colombianas mayores de 12 años por región. Colombia, 2007.

Región	Seguridad Social									
	Régimen Contributivo		Régimen Subsidiado		Régimen especial		No afiliado		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	2.263	25,9	3.606	41,3	305	3,5	2.564	29,3	8.737	100
Oriental	2.649	35,7	3.403	45,9	310	4,2	1.056	14,2	7.419	100
Central	4.533	41,4	4.273	39,0	324	3,0	1.826	16,7	10.955	100
Pacífica	2.321	32,0	2.812	38,7	205	2,8	1.922	26,5	7.259	100
Bogotá	3.987	56,0	1.762	24,8	225	3,2	1.140	16,0	7.114	100
Orinoquía y Amazonía	179	29,4	281	46,1	31	5,1	118	19,4	610	100
Total	15.933	37,8	16.136	38,3	1.399	3,3	8.626	20,5	42.094	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.5. Razón de aseguramiento de las mujeres colombianas mayores de 12 años. Colombia, 2007.

Aseguramiento	Resultado
Razón de afiliadas / no afiliadas	3,9 mujeres se encuentran afiliadas por 1 mujer sin afiliación (33468/8626)=3,87
Razón de afiliación al SGSSS-S/afiliación a otro régimen (especiales)	22 mujeres afiliadas al SGSSS-S por 1 mujer afiliada a un régimen especial
Razón de afiliación al Régimen Contributivo / afiliación al régimen subsidiado	1,3 mujeres afiliada al régimen contributivo, por 1 mujer afiliada al régimen subsidiado

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 7.6. Nivel de alfabetismo en mujeres de 12-69 años. Colombia, 2007.

Región	¿Sabe leer y escribir?					
	Si		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	6.898	91,3	654	8,7	7.552	100
Oriental	6.177	95,4	297	4,6	6.475	100
Central	9.070	94,7	505	5,3	9.575	100
Pacífica	5.936	93,4	419	6,6	6.354	100
Bogotá	6.189	97,7	146	2,3	6.335	100
Orinoquía y Amazonía	497	95,9	21	4,1	518	100
Total	34.767	94,5	2.042	5,5	36.808	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 7.7. Nivel educativo de las mujeres según grupo étnico, Colombia, 2007.

Variable	Categoría	Grupo étnico											
		Indígena		Gitano		Raizal del archipiélago		Palenquero		Afro colombiana		Ninguno de los anteriores	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Leer y escribir	Si	1.571	87,9	28	96,5	50	98,4	32	89,5	3.000	92,3	30.085	95,0
	No	216	12,1	1	3,5	1	1,6	4	10,5	252	7,7	1.569	5,0
	Ninguno	171	12,1	2	9,6	1	2,0	8	25,2	207	8,4	1.505	6,1
Nivel educativo	Preescolar	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	0,3	30	0,1
	Básica primaria	555	39,3	9	35,8	3	7,7	12	38,7	773	31,4	8.386	33,7
	Básica secundaria	489	34,6	8	34,3	22	54,8	10	31,4	986	40,0	10.592	42,6
	Técnico	89	6,3	3	11,2	3	7,1	1	4,1	214	8,7	1.975	7,9
	Universitaria	67	4,8	2	9,2	11	27,9	0	0,6	204	8,3	1.580	6,4
	Postgrado	17	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	28	1,1	233	0,9

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 7.8. Percepción de Cáncer de Cuello por región en mujeres de 18 a 69 años según variables sociodemográficas. Colombia, 2007.

Variables	Categoría	¿Un doctor u otro profesional de la salud, alguna vez le dijo que tenía cáncer de cuello uterino?					
		Sí		No		Total	
		No.	%	No.	%	No.	%
	Ninguno	4	0,2	1.869	99,8	1.873	100
	Primaria o menos	0	0,0	36	100,0	36	100
Nivel educativo	Básica secundaria y media	17	0,2	9.627	99,8	9.644	100
	Técnico o superior	25	0,1	17.105	99,9	17.130	100
	Total	46	0,2	28.636	99,8	28.683	100
Trabajo	No	30	0,1	22.201	99,9	22.230	100
	Sí	17	0,1	11.547	99,9	11.564	100
	Total	46	0,1	33.748	99,9	33.795	100
Tipo de trabajo	Obrero o empleado de empresa o persona particular	8	0,1	5.540	99,9	5.548	100
	Trabajador independiente o por cuenta propia	15	0,3	5.189	99,7	5.204	100
	Otros	0	0,0	3.713	100,0	3.713	100
	Total	23	0,2	14.443	99,8	14.466	100
Etnia	Indígena	4	0,3	1.634	99,7	1.639	100
	Gitano	0	0,0	27	100,0	27	100
	Raizal del archipiélago	0	0,0	47	100,0	47	100
	Palenquero	0	0,0	34	100,0	34	100
	Afrocolombiana	2	0,1	2.983	99,9	2.986	100
	Ninguno de los anteriores	39	0,1	29.022	99,9	29.062	100
	Total	46	0,1	33.748	99,9	33.795	100
Seguridad Social	Régimen Contributivo	24	0,2	13.321	99,8	13.344	100
	Régimen Subsidiado	16	0,1	12.591	99,9	12.607	100
	Régimen especial	1	0,1	1.153	99,9	1.154	100
	No afiliado	6	0,1	6.683	99,9	6.688	100
	Total	46	0,1	33.748	99,9	33.795	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.9. Lesiones cervicales según el grupo de edad en mujeres mayores de 12 años. Colombia, 2007.

Tipo de lesión	Grupos de edad													
	12 a 19		20 a 29		30 a 39		40 a 49		50 a 59		60 y más		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Tumor maligno del Endocérvix	13	21,3	73	13,3	300	25,1	502	29,8	568	41,7	722	47,2	2.178	34,1
Tumor maligno del Exocérvix	7	11,5	101	18,4	308	25,8	428	25,4	347	25,5	372	24,3	1.563	24,5
Lesión de sitios contiguos del cuello del útero	6	9,8	46	8,4	68	5,7	56	3,3	28	2,1	15	1,0	219	3,4
Carcinoma in situ del Endocérvix	15	24,6	124	22,6	218	18,2	352	20,9	200	14,7	216	14,1	1.125	17,6
Carcinoma in situ de otras partes especificadas del cuello del útero	1	1,6	33	6,0	57	4,8	73	4,3	57	4,2	54	3,5	275	4,3
Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada	19	31,1	172	31,3	244	20,4	275	16,3	162	11,9	150	9,8	1.022	16,0
Total	61	100	549	100	1.195	100	1.686	100	1.362	100	1.529	100	6.382	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, RIPS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 7.10. Distribución de neoplasias intraepiteliales cervicales según departamento en mujeres colombianas mayores de 12 años. Colombia, 2007.

Departamento	NIC I		NIC II		NIC III		Displasia no especificada		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	1.260	57,9	237	10,9	392	18,0	287	13,2	2.176	100
Atlántico	432	73,8	58	9,9	38	6,5	57	9,7	585	100
Bogotá	3.248	60,5	330	6,1	566	10,5	1.225	22,8	5.369	100
Bolívar	440	81,3	30	5,5	40	7,4	31	5,7	541	100
Boyacá	872	67,4	97	7,5	155	12,0	169	13,1	1.293	100
Caldas	775	81,2	84	8,8	60	6,3	36	3,8	955	100
Caquetá	86	61,4	23	16,4	23	16,4	8	5,7	140	100
Cauca	21	58,3	1	2,8	1	2,8	13	36,1	36	100
Cauca	745	66,8	207	18,6	105	9,4	58	5,2	1.115	100
Córdoba	80	64,0	9	7,2	21	16,8	15	12,0	125	100
Cundinamarca	285	63,2	38	8,4	63	14,0	65	14,4	451	100
Chocó	2	66,7	0	0,0	0	0,0	1	33,3	3	100
Huila	198	55,0	44	12,2	25	6,9	93	25,8	360	100
La guajira	15	60,0	4	16,0	2	8,0	4	16,0	25	100
Magdalena	94	70,1	24	17,9	7	5,2	9	6,7	134	100
Meta	29	40,8	10	14,1	12	16,9	20	28,2	71	100
Nariño	69	30,7	13	5,8	10	4,4	133	59,1	225	100
Norte de Santander	176	61,8	39	13,7	26	9,1	44	15,4	285	100
Quindío	8	42,1	6	31,6	1	5,3	4	21,1	19	100
Risaralda	383	72,0	77	14,5	46	8,6	26	4,9	532	100
Santander	795	60,5	92	7,0	98	7,5	329	25,0	1.314	100
Sucre	9	64,3	2	14,3	0	0,0	3	21,4	14	100
Tolima	369	59,3	101	16,2	65	10,5	87	14,0	622	100
Valle del cauca	503	50,8	140	14,1	137	13,8	211	21,3	991	100
Arauca	198	59,8	55	16,6	18	5,4	60	18,1	331	100
Casanare	37	32,5	6	5,3	15	13,2	56	49,1	114	100
Putumayo	12	40,0	3	10,0	3	10,0	12	40,0	30	100
San Andrés	3	75,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0	4	100
Amazonas	1	50,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	2	100
Guainía	2	100	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	100
Guaviare	8	42,1	5	26,3	3	15,8	3	15,8	19	100
Vaupés	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Vichada	1	100	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100
Total	11.156	62,4	1.735	9,7	1932	10,8	3.061	17,1	17.884	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, RIPS 2007.

Cuadro 7.11. Lesiones cervicales según el régimen de aseguramiento en mujeres Colombianas mayores de 12 años, 2007

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, RIPS 2007.

Tipo de lesión	Tipo de usuario											
	Contributivo		Subsidiado		Vinculado		Particular		Otro		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Tumor maligno del Endocérvix	263	23,8	1.771	38,5	77	19,0	42	23,6	25	28,4	2.178	34,1
Tumor maligno del Exocérvix	312	28,2	1.086	23,6	113	27,8	26	14,6	26	29,5	1.563	24,5
Lesión de sitios contiguos del cuello del útero	76	6,9	94	2,0	31	7,6	10	5,6	8	9,1	219	3,4
Carcinoma in situ del Endocérvix	202	18,3	812	17,6	48	11,8	56	31,5	7	8,0	1.125	17,6
Carcinoma in situ de otras partes especificadas del cuello del útero	54	4,9	189	4,1	21	5,2	6	3,4	5	5,7	275	4,3
Carcinoma In situ del cuello del útero, parte no especificada	199	18,0	652	14,2	116	28,6	38	21,3	17	19,3	1.022	16,0
Total	1.106	100	4.604	100,0	406	100,0	178	100	88	100	6.382	100,0

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, RIPS 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 7.12. Lesiones cervicales por departamento en mujeres colombianas mayores de 12 años, 2007.

Departamento	Cáncer de cuello uterino													
	Tumor maligno del Endocérvix		Lesión de sitios contiguos del cuello del útero		Carcinoma in situ del Endocérvix		Carcinoma in situ de otras partes especificadas del cuello del útero		Carcinoma In situ del cuello del útero, parte no especificada		Tumor maligno del Exocérvix		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Antioquia	229	25,7	52	5,8	133	14,9	25	2,8	176	19,8	275	30,9	890	100
Atlántico	12	11,9	3	3,0	8	7,9	11	10,9	53	52,5	14	13,9	101	100
Bogotá	189	20,8	76	8,4	119	13,1	98	10,8	212	23,3	214	23,6	908	100
Bolívar	31	20,0	1	0,6	16	10,3	3	1,9	11	7,1	93	60,0	155	100
Boyacá	20	13,4	1	0,7	17	11,4	3	2,0	38	25,5	70	47,0	149	100
Caldas	4	6,3	2	3,1	13	20,3	1	1,6	14	21,9	30	46,9	64	100
Caquetá	7	6,6	1	0,9	17	16,0	0	0,0	26	24,5	55	51,9	106	100
cauca	20	34,5	1	1,7	5	8,6	2	3,4	15	25,9	15	25,9	58	100
Cauca	16	12,7	5	4,0	28	22,2	4	3,2	16	12,7	57	45,2	126	100
Córdoba	92	43,8	2	1,0	65	31,0	5	2,4	7	3,3	39	18,6	210	100
Cundinamarca	35	18,6	9	4,8	43	22,9	9	4,8	32	17,0	60	31,9	188	100
Chocó	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	100	3	100
Huila	5	1,7	9	3,0	163	53,8	17	5,6	31	10,2	78	25,7	303	100
La guajira	1	14,3	0	0,0	2	28,6	0	0,0	3	42,9	1	14,3	7	100
Magdalena	7	28,0	2	8,0	14	56,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	25	100
Meta	15	22,7	0	0,0	30	45,5	2	3,0	11	16,7	8	12,1	66	100
Nariño	1.046	82,3	4	0,3	118	9,3	10	0,8	77	6,1	16	1,3	1.271	100
Norte de Santander	13	10,8	3	2,5	26	21,7	14	11,7	19	15,8	45	37,5	120	100
Quindío	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	42,9	4	57,1	7	100
Risaralda	15	38,5	2	5,1	4	10,3	0	0,0	12	30,8	6	15,4	39	100
Santander	106	42,2	21	8,4	37	14,7	7	2,8	47	18,7	33	13,1	251	100
Sucre	2	2,5	1	1,3	40	50,0	2	2,5	1	1,3	34	42,5	80	100
Tolima	32	14,3	8	3,6	17	7,6	10	4,5	18	8,1	138	61,9	223	100
Valle del cauca	240	27,8	13	1,5	192	22,2	40	4,6	170	19,7	209	24,2	864	100
Arauca	4	15,4	1	3,8	1	3,8,0	4	15,4	7	26,9	9	34,6	26	100
Casanare	21	19,8	2	1,9	15	14,2	8	7,5	14	13,2	46	43,4	106	100
Putumayo	16	80,0	0	0,0	1	5,0	0	0,0	3	15,0	0	0,0	20	100
San Andrés	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Amazonas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100	1	100
Guainía	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Guaviare	0	0,0	0	0,0	0	7,1	0	0,0	5	35,7	8	57,1	14	100
Vaupés	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100	1	100
Vichada	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Total	2.178	34,1	219	3,4	1.125	17,6	275	4,3	1.022	16,0	1.563	24,5	6.382	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, RIPS 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 7.13. Comportamiento de la Educación, nivel educativo, tipo de trabajo, seguridad social y etnia en las mujeres que demandaron citología de cuello uterino. Colombia, 2007.

Variable	Categoría	No.	%
Nivel educativo más alto alcanzado	Ninguno	10	2,1
	Primaria o menos	0	0,0
	Básica secundaria y media	156	33,2
	Técnico o superior	304	64,6
	Total	471	100,0
Trabajo la semana pasada	No	349	67,4
	Si	169	32,6
	Total	518	100
Tipo de trabajo	Obrero o empleado de empresa o persona particular	85	33,8
	Obrero o empleado del gobierno	5	2,1
	Jornalero o peón	11	4,4
	Empleado doméstico	17	6,6
	Profesional independiente	4	1,7
	Trabajador independiente o por cuenta propia	104	41,4
	Patrón o empleador	0	0,0
	Trabajador de su propia finca o de finca en arriendo o aparc	11	4,4
	Trabajador familiar sin remuneración	14	5,4
	Ayudante sin remuneración (hijo o familiar de empleados domé	1	0,2
	Total	252	100
Etnia	Indígena	48	9,3
	Gitano	0	0,0
	Raizal del archipiélago	0	0,0
	Palenquero	0	0,0
	Afrocolombiana	32	6,1
	Ninguno de los anteriores	438	84,5
Total	518	100	
Seguridad social	Régimen Contributivo	188	36,3
	Régimen Subsidiado	209	40,4
	Régimen especial	12	2,3
	No afiliado	109	21,1
	Total	518	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.14. Distribución de las mujeres de 12-69 años que demandaron citología según asalariadas y no asalariadas por grupo étnico, 2007.

Grupo étnico	Asalariados					
	Si		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Indígena	14	5,5	14	5,6	28	11,1
Gitano	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Raizal del archipiélago	0	0,0	0	0,0	0	0,1
Palenquero	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Afrocolombiana	5	2,1	10	4,0	15	6,1
Ninguno de los anteriores	99	39,1	110	43,7	209	82,8
Total	118	46,8	134	53,2	252	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.15. Distribución de las mujeres de 12-69 años que demandaron citología según asalariadas y no asalariadas por región. Colombia, 2007.

Región	Asalariados					
	Si		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	21	8,4	21	8,2	42	16,6
Oriental	18	7,3	14	5,5	32	12,7
Central	29	11,4	19	7,6	48	19,0
Pacífica	22	8,5	42	16,7	64	25,2
Bogotá	27	10,6	37	14,5	63	25,1
Orinoquía y Amazonía	1	0,6	2	0,8	3	1,4,0
Total	118	46,8	134	53,2	252	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 7.16a. Acceso de primera vez y orientaciones para la realización de la citología de cuello uterino según región. Colombia, 2007.

Región	¿Es esta la primera vez que se hace una citología de cuello uterino?						¿Le explicaron en qué consistía el examen?					
	Sí		No		Total		Sí		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	3.310	10,8	27.351	89,2	30.661	100	19.925	65,0	10.736	35,0	30.661	100
Oriental	6.294	13,7	39.493	86,3	45.787	100	36.072	78,8	9.715	21,2	45.787	100
Central	5.796	11,0	46.957	89,0	52.753	100	37.410	70,9	15.342	29,1	52.753	100
Pacífica	4.494	12,5	31.366	87,5	35.860	100	31.653	88,3	4.207	11,7	35.860	100
Bogotá	7.895	12,7	54.411	87,3	62.306	100	53.301	85,5	9.004	14,5	62.306	100
Orinoquía y Amazonía	1.232	24,1	3.886	75,9	5.118	100	3.688	72,1	1.430	27,9	5.118	100
Total	29.021	12,5	203.464	87,5	232.485	100	182.051	78,3	50.434	21,7	232.485	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.16b. Comportamiento de la importancia y autorización para la realización de la citología de cuello uterino según región. Colombia, 2007.

Región	¿Le explicaron la importancia del examen?						¿Le pidieron su autorización antes de hacerle esta citología?					
	Sí		No		Total		Sí		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	23.501	76,6	7.161	23,4	30.661	100	20.199	65,9	10.462	34,1	30.661	100
Oriental	40.883	89,3	4.904	10,7	45.787	100	32.864	71,8	12.923	28,2	45.787	100
Central	39.891	75,6	12.861	24,4	52.753	100	37.997	72,0	14.756	28,0	52.753	100
Pacífica	31.865	88,9	3.995	11,1	35.860	100	25.615	71,4	10.245	28,6	35.860	100
Bogotá	52.629	84,5	9.677	15,5	62.306	100	42.689	68,5	19.617	31,5	62.306	100
Orinoquía y Amazonía	3.614	70,6	1.504	29,4	5.118	100	3.454	67,5	1.664	32,5	5.118	100
Total	192.383	82,8	401.02	17,2	232.485	100	162.818	70,0	69.667	30,0	232.485	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.16c. Comportamiento del gasto de bolsillo y entrega oportuna de resultados de la citología de cuello uterino según región. Colombia, 2007.

Región	¿Tuvo que comprar algún material para que le realizaran la citología?						¿Ya le entregaron los resultados de la citología?					
	Sí		No		Total		Sí		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	5.120	16,7	25.542	83,3	30.661	100	12.120	39,5	18.541	60,5	30.661	100
Oriental	2.622	5,7	43.165	94,3	45.787	100	21.281	46,5	24.506	53,5	45.787	100
Central	2.875	5,4	49.878	94,6	52.753	100	13.818	26,2	38.935	73,8	52.753	100
Pacífica	5.749	16,0	30.111	84,0	35.860	100	15.391	42,9	20.469	57,1	35.860	100
Bogotá	4.426	7,1	57.879	92,9	62.306	100	17.440	28,0	44.866	72,0	62.306	100
Orinoquía y Amazonía	312	6,1	4.806	93,9	5.118	100	1.774	34,7	3.344	65,3	5.118	100
Total	21.103	9,1	211.382	90,9	232.485	100	81.824	35,2	150.661	64,8	232.485	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.16d. Comportamiento de la devolución y explicación del resultado de citología de cuello uterino según región. Colombia, 2007.

Región	¿Le dijeron que debía volver a consulta para conocer el resultado de la citología?						¿Le explicaron el resultado de la citología?					
	Sí		No		Total		Sí		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	16.977	91,6	1.564	8,4	18.541	100	11.240	92,7	880	7,3	12.120	100
Oriental	24.092	98,3	414	1,7	24.506	100	20.737	97,4	544	2,6	21.281	100
Central	32.751	84,1	6.184	15,9	38.935	100	13.447	97,3	371	2,7	13.818	100
Pacífica	19.341	94,5	1.128	5,5	20.469	100	14.702	95,5	689	4,5	15.391	100
Bogotá	39.565	88,2	5.301	11,8	44.866	100	16.208	92,9	1.232	7,1	17.440	100
Orinoquía y Amazonía	3.029	90,6	315	9,4	3.344	100	1.704	96	70	4	1.774	100
Total	135.755	90,1	14.905	9,9	150.661	100	78.037	95,4	3.787	4,6	81.824	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.16e. Comprensión y resultado de la citología de cuello uterino según región. Colombia, 2007.

Región	¿Entendió lo que le explicaron?				¿El resultado de la citología fue normal o anormal?					
	Sí		No		Total		Normal		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	9.925	99,7	34	0,3	9.958	100	9.958	100	9.958	100
Oriental	17.175	98,9	188	1,1	17.363	100	17.363	100	17.363	100
Central	10.079	100	0	0,0	10.079	100	10.079	100	10.079	100
Pacífica	8.036	99,9	12	0,1	8.048	100	8.048	100	8.048	100
Bogotá	10.195	99,2	82	0,8	10.277	100	10.277	100	10.277	100
Orinoquia y Amazonía	1.102	100	0	0,0	1.102	100	1.102	100	1.102	100
Total	56.513	99,4	316	0,6	56.828	100	56.828	100	56.828	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.16f. Comportamiento del seguimiento de la citología de cuello uterino y otros exámenes de apoyo diagnóstico según región. Colombia, 2007.

Región	¿Le dijeron que en el futuro debe volver a hacerse la citología?						¿Le ordenaron otro examen para confirmar el resultado de la citología?					
	Sí		No		Total		Sí		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	7.025	56,3	5.455	43,7	12.480	100	546	45,3	658	54,7	1.204	100
Oriental	16.933	91,2	1.629	8,8	18.563	100	1.843	58,8	1.289	41,2	3.132	100
Central	12.998	78,0	3.674	22,0	16.671	100	1.858	55,8	1.472	44,2	3.331	100
Pacífica	8.329	83,9	1.597	16,1	9.926	100	2.445	37,1	4.149	62,9	6.593	100
Bogotá	13.829	81,7	3.093	18,3	16.922	100	4.175	71,8	1.643	28,2	5.819	100
Orinoquia y Amazonía	1.408	85,2	244	14,8	1.652	100	313	71,6	124	28,4	437	100
Total	60.521	79,4	15.692	20,6	76.213	100	11.181	54,5	9.336	45,5	20.517	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 7.16g. Comportamiento de otros exámenes de diagnóstico para el Cáncer Cuello Uterino según región. Colombia, 2007.

Región	¿Cuál es el nombre del examen?							
	Colposcopia		Biopsia		Otro		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	210	38,5	166	30,4	170	31,1	546	100
Oriental	1.081	58,7	118	6,4	644	34,9	1.843	100
Central	513	27,6	369	19,8	976	52,5	1.858	100
Pacífica	644	26,3	214	8,8	1.586	64,9	2.445	100
Bogotá	2.049	49,1	2.041	48,9	85	2,0	4.175	100
Orinoquía y Amazonía	50	15,9	17	5,3	247	78,8	313	100
Total	4.548	40,7	2.925	26,2	3.708	33,2	11.181	100

Fuente. Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.



ASIS
Análisis de Situación en Salud



Libertad y Orden
Ministerio de la Protección Social
República de Colombia



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**
1803
Facultad Nacional de Salud Pública
"Héctor Abad Gómez"