

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA 2002-2007



ASIS
Análisis de Situación en Salud

ANEXO V

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD



Libertad y Orden

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002-2007

ANEXOS TOMO V

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

TOMO V

ANEXOS CAPÍTULO I:

GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1.1 Actividades realizadas para reducir el riesgo de transmisión de malaria, según región y categoría municipal. Colombia, 2007

Gráfico 1.2. Actividades para el control de focos de anopheles según región y categoría municipal. Colombia, 2007

Gráfico 1.3. Actividades para mejorar el desempeño de la población para el reconocimiento de síntomas y búsqueda de tratamiento oportuno según región y categoría municipal. Colombia, 2007

Gráfico 1.4. Actividades para mejorar la red de microscopía y tratamiento de malaria en la zona rural, según región y categoría municipal. Colombia, 2007

Gráfico 1.5. Actividades para mejorar el desempeño de las IPS en el diagnóstico y tratamiento de la malaria, según región y categoría municipal. Colombia, 2007

Gráfico 1.6. Actividades de vigilancia entomológica de *Aedes aegypti* en el municipio, según región y categoría municipal. Colombia, 2007

Gráfico 1.7. Actividades para reducir la infestación del *Aedes* en el municipio, según región y categoría municipal. Colombia, 2007

Gráfico 1.8. Actividades para mejorar el desempeño de la población en la prevención y control de dengue, según región y categoría municipal. Colombia, 2007

Gráfico 1.9. Actividades para mejorar el desempeño de las IPS en el diagnóstico y tratamiento del dengue, según región y categoría municipal. Colombia, 2007

Gráfico 1.10. Hogares visitados por funcionarios de salud para revisar la existencia de criaderos de mosquitos, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.11. Distribución de hogares que recibieron instrucciones sobre la manera de evitar la reproducción de mosquitos, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.12. Hogares intervenidos con aspersión de insecticida para la eliminación de mosquitos, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.13. Hogares con presencia de sitios potenciales de criaderos de mosquitos a menos de 100 metros de la vivienda según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.14. Hogares que realizaron limpieza de caños, desyerbado y eliminación de desechos, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.15. Hogares que cuentan con al menos un toldillo y que usan para dormir, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.16. Hogares que usaron el toldillo la noche anterior a la encuesta, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.17. Porcentaje de protección con toldillo de todos los miembros del hogar, en los cuales disponen de él, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.18. Toldillos impregnados con insecticida para matar mosquitos en hogares encuestados según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.19. Porcentaje de albercas o tanques en los hogares encuestados según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.20. Distribución porcentual del lavado adecuado de la alberca restregando el fondo y todas las paredes según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.21. Distribución porcentual de la tenencia de tanques adicionales para el almacenamiento de agua según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.22. Distribución porcentual del lavado del tanque adicional en los últimos 7 días según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.23. Distribución porcentual del lavado adecuado de la alberca adicional restregando el fondo y todas las paredes según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.24. Distribución porcentual con relación al tapado del tanque adicional que se encuentra en el hogar según categoría, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.25. Realización de campañas para la recolección de inservibles por parte de funcionarios de salud según categoría, área y región. Colombia, 2007

Gráfico 1.26. Porcentaje de participación en las campañas de recolección de inservibles en el barrio o el hogar según categoría, área y región. Colombia, 2007

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1.1. Número promedio de los colegios públicos y privados según categoría del municipio. Colombia, 2007

Cuadro 1.2. Número promedio de guarderías y hogares de bienestar según categoría del municipio. Colombia, 2007

Cuadro 1.3. Presencia de programas especiales de salud pública según categoría del municipio. Colombia, 2007


Cuadro 1.4. Presencia de programas, proyectos y acciones de salud pública según categoría del municipio. Colombia, 2007

Cuadro 1.5. Número de muestras de agua tomadas para la vigilancia de la calidad del agua. Colombia, 2006

Cuadro 1.6. Distribución porcentual de municipios según número de muestras tomadas para la vigilancia de la calidad sanitaria de los alimentos. Colombia, 2006


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

GRÁFICOS



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.1 Actividades realizadas para reducir el riesgo de transmisión de malaria, según región y categoría municipal. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.2. Actividades para el control de focos de anopheles según región y categoría municipal. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.3. Actividades para mejorar el desempeño de la población para el reconocimiento de síntomas y búsqueda de tratamiento oportuno según región y categoría municipal. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.4. Actividades para mejorar la red de microscopía y tratamiento de malaria en la zona rural, según región y categoría municipal. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.5. Actividades para mejorar el desempeño de las IPS en el diagnóstico y tratamiento de la malaria, según región y categoría municipal. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.6. Actividades de vigilancia entomológica de *Aedes aegypti* en el municipio, según región y categoría municipal. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.7. Actividades para reducir la infestación del Aedes en el municipio, según región y categoría municipal. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.8. Actividades para mejorar el desempeño de la población en la prevención y control de dengue, según región y categoría municipal. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.9. Actividades para mejorar el desempeño de las IPS en el diagnóstico y tratamiento del dengue, según región y categoría municipal. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.10. Hogares visitados por funcionarios de salud para revisar la existencia de criaderos de mosquitos, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.11. Distribución de hogares que recibieron instrucciones sobre la manera de evitar la reproducción de mosquitos, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.12. Hogares intervenidos con aspersión de insecticida para la eliminación de mosquitos, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.13. Hogares con presencia de sitios potenciales de criaderos de mosquitos a menos de 100 metros de la vivienda según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.14. Hogares que realizaron limpieza de caños, desyerbado y eliminación de desechos, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.15. Hogares que cuentan con al menos un toldillo y que usan para dormir, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.16. Hogares que usaron el toldillo la noche anterior a la encuesta, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.17. Porcentaje de protección con toldillo de todos los miembros del hogar, en los cuales disponen de él, según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.18. Toldillos impregnados con insecticida para matar mosquitos en hogares encuestados según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.19. Porcentaje de albercas o tanques en los hogares encuestados según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.20. Distribución porcentual del lavado adecuado de la alberca restregando el fondo y todas las paredes según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.21. Distribución porcentual de la tenencia de tanques adicionales para el almacenamiento de agua según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.22. Distribución porcentual del lavado del tanque adicional en los últimos 7 días según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.23. Distribución porcentual del lavado adecuado de la alberca adicional restregando el fondo y todas las paredes según categoría municipal, área y región. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 1.24. Distribución porcentual con relación al tapado del tanque adicional que se encuentra en el hogar según categoría, área y región. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 1.25. Realización de campañas para la recolección de inservibles por parte de funcionarios de salud según categoría, área y región. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 1.26. Porcentaje de participación en las campañas de recolección de inservibles en el barrio o el hogar según categoría, área y región. Colombia, 2007.

CUADROS

Cuadro 1.1. Número promedio de los colegios públicos y privados según categoría del municipio. Colombia, 2007.

Colegios Públicos y Privados	Categoría municipal según DNP							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
Colegios o escuelas urbanos de carácter privado	112,4	92,8	43,0	21,8	11,3	2,1	871,4	38,8
Colegios o escuelas urbanos de carácter público Departamentales	30,6	13,0	8,5	8,5	11,5	3,4	58,4	8,1
Colegios o escuelas urbanos de carácter público Municipales	38,1	31,9	26,5	17,2	5,1	6,9	157,8	15,5
Colegios o escuelas rurales de carácter privado	2,1	0,7	10,1	0,7	1,9	0,8	7,0	1,5
Colegios o escuelas rurales de carácter público Departamentales	13,5	2,6	8,4	15,5	42,2	16,2	14,8	15,8
Colegios o escuelas rurales de carácter público Municipales	25,2	18,4	27,0	20,8	18,6	11,7	27,0	15,1

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 1.2. Número promedio de guarderías y hogares de bienestar según categoría del municipio. Colombia, 2007.

Guarderías y hogares de bienestar	Categoría municipal según DNP							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
Hogares comunitarios de bienestar familiar funcionando en la cabecera	81,5	61,8	63,6	62,6	41,2	20,6	85,5	33,4
Hogares comunitarios de bienestar familiar funcionando en la zona rural	28,6	26,5	40,8	17,0	30,5	21,8	32,0	23,8
Guarderías y jardines infantiles, públicos y privados en la cabecera	41,5	31,5	37,4	19,0	5,0	3,0	75,8	11,3
Guarderías y jardines infantiles, públicos y privados en la zona rural	18,5	2,7	27,2	3,2	9,8	1,8	6,3	4,7

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 1.3. Presencia de programas especiales de salud pública según categoría del municipio. Colombia, 2007.

Municipios que realizan acciones para reducir:	Categoría municipal según DNP													
	1		2		3		4		5		6		Especial	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
La ocurrencia de accidentes de tránsito	8	50,0	8	61,5	6	50,0	7	53,8	7	63,6	58	37,9	5	100,0
La ocurrencia de lesiones por agresión	8	50,0	7	53,8	6	50,0	5	38,5	5	45,5	70	45,8	4	80,0
La violencia intrafamiliar	14	87,5	12	92,3	12	100,0	12	92,3	8	72,7	135	88,2	5	100,0
La mortalidad materna	15	93,8	12	92,3	11	91,7	13	100,0	10	90,9	139	90,8	5	100,0
La mortalidad infantil	14	87,5	11	84,6	11	91,7	12	92,3	10	90,9	126	82,9	4	80,0
La transmisión del VIH/SIDA	15	93,8	12	92,3	11	91,7	12	92,3	10	90,9	138	90,8	5	100,0
La transmisión de ITS	15	93,8	12	92,3	11	91,7	13	100,0	11	100,0	143	94,1	5	100,0
Reducir o detectar la violencia sexual	13	81,3	11	84,6	12	100,0	13	100,0	8	72,7	129	84,9	5	100,0
El consumo de alcohol y cigarrillo	11	68,8	13	100,0	12	100,0	12	92,3	6	54,5	127	83,6	5	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 1.4. Presencia de programas, proyectos y acciones de salud pública según categoría del municipio. Colombia 2007.

Municipios que realizan acciones para incentivar	Categoría municipal según DNP													
	1		2		3		4		5		6		Especial	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
La citología cérvico uterina	14	87,5	11	84,6	10	83,3	13	100,0	9	81,8	133	87,5	5	100
La utilización del control prenatal	13	81,3	11	84,6	9	75,0	13	100,0	9	81,8	134	88,2	4	80
La utilización del control de crecimiento y desarrollo	10	62,5	9	69,2	11	91,7	12	92,3	9	81,8	126	82,9	5	100
La vacunación de menores de 5 años	14	87,5	12	92,3	11	91,7	13	100,0	10	90,9	147	96,7	4	80
La actividad física y el ejercicio	10	62,5	13	100,0	12	100,0	12	92,3	6	54,5	135	88,8	5	100
Mejorar las condiciones nutricionales de la población	14	87,5	12	92,3	12	100,0	12	92,3	10	90,9	133	87,5	4	80

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 1.5. Número de muestras de agua tomadas para la vigilancia de la calidad del agua. Colombia, 2006.

Agrupación categoría municipal	Número de municipios	Número total de muestras en la agrupación	Rangos de datos			
			Mediana muestras tomadas	Percentil 75	Valor Mínimo	Valor Máximo
Categoría 1, 2 y 3	40	10.271	88	218	9	2.000
	Total municipios percentil		21	9	1	1
	% municipios percentil		52,5	22,5	2,5	2,5
Categoría 4, 5 y 6	142	12.951	31	86	0	1.430
	Total municipios percentil		72	35	3	1
	% municipios percentil		50,7	24,7	2,1	0,7
Categoría especial	5	6.055	905	2.000	400	2.000
	Total municipios percentil		3	1	1	2
	% municipios percentil		60,0	20,0	20,0	40,0
Total	187	29.277				

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 1.6. Distribución porcentual de municipios según número de muestras tomadas para la vigilancia de la calidad sanitaria de los alimentos. Colombia, 2006.

Categoría municipal según DNP	Nº municipios	Nº total de muestras	Porcentaje de municipios									
			0	1 - 25	26 - 50	51 - 100	101 - 200	201 - 300	301 - 400	401 - 500	501 - 1000	> 1000
1	14	2.343	7,1	14,3	0,0	21,4	21,4	7,1	21,4	7,1	0,0	0,0
2	12	3.044	0,0	8,3	25,0	8,3	16,7	0,0	16,7	16,7	8,3	0,0
3	11	2.477	0,0	9,1	45,5	9,1	0,0	18,2	0,0	9,1	0,0	9,1
4	11	2.907	36,4	27,3	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1
5	9	2.427	0,0	33,3	11,1	33,3	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
6	113	2.108	25,7	54,9	11,5	4,4	2,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Especial	5	2.643	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Total	175	17.949	20,0	41,1	13,1	8,0	5,7	3,4	2,9	2,3	1,1	2,3

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

TOMO V

ANEXOS CAPÍTULO II:

ACCESO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 2.1. Distribución de la población de personas que accedieron a servicios de salud a través de Consulta Externa, por subregiones del país, según área de residencia. Colombia, 2007

Gráfico 2.2. Proporción de personas del sexo femenino y del sexo masculino por subregiones del país que accedieron a consulta externa. Colombia, 2007

Gráfico 2.3. Relación entre la población de personas del sexo femenino y del sexo masculino que accedieron a consulta externa y encuestadas en los hogares, Colombia, 2007

Gráfico 2.4. Distribución porcentual de la población que accedió a Consulta Externa en cada una de las subregiones del país, según régimen de seguridad social en salud. Colombia, 2007

Gráfico 2.5. Porcentaje de personas que accedió a Consulta Externa que respondieron la encuesta de SISBEN en su hogar, según régimen de seguridad social en salud. Colombia, 2007

Gráfico 2.6. Porcentajes de personas que accedieron a servicios de Consulta Externa, por nivel educativo, según actividad desarrollada la semana anterior a la encuesta. Colombia, 2007

Gráfico 2.7. Proporción de mujeres y hombres que accedieron a servicios de salud, según estado civil, por nivel educativo. Colombia, 2007

Gráfico 2.8. Proporción de mujeres y hombres que accedieron a servicios de salud, según el tiempo empleado para llegar a la institución prestadora del servicio. Colombia, 2007

Gráfico 2.9. Proporción de personas que accedieron a servicios de salud según subregión y el tiempo empleado para llegar a la institución prestadora del servicio. Colombia, 2007

Gráfico 2.10 Tiempo promedio (minutos) empleado para llegar a la institución prestadora del servicio según subregión. Colombia, 2007

Gráfico 2.11. Proporción de personas que accedieron a servicios de salud según nivel educativo y el tiempo empleado para llegar a la institución prestadora del servicio. Colombia, 2007

Gráfico 2.12. Proporción de personas que accedieron a servicios de salud según la actividad que realizó en la semana anterior a la que se le hizo la encuesta y el tiempo empleado para llegar a la institución prestadora del servicio. Colombia, 2007

Gráfico 2.13. Tiempo promedio (minutos) empleado para llegar a la institución prestadora del servicio según sexo del usuario. Colombia, 2007

Gráfico 2.14. Tiempo promedio (minutos) que deben esperar las personas que llegan a la institución para ser atendidos, según el nivel de educación del usuario. Colombia, 2007

Gráfico 2.15. Tiempo promedio (minutos) que deben esperar las personas que llegan a la institución para ser atendidos, según la actividad que había desarrollado el usuario la semana anterior a la encuesta. Colombia, 2007

Gráfico 2.16. Proporción de personas en cada uno de los sexos según la fuente o responsable del pago de la mayor parte de los gastos por la atención recibida. Colombia, 2007

Gráfico 2.17. Proporción de personas en cada uno de los grupos de edad según la fuente o responsable del pago de la mayor parte de los gastos por la atención recibida. Colombia, 2007

Gráfico 2.18. Proporción de personas en cada uno de los niveles educativos del usuario, según la fuente o responsable del pago de la mayor parte de los gastos por la atención recibida. Colombia, 2007

Gráfico 2.19. Proporción de personas en cada una de las subregiones donde reside el usuario, según la fuente o responsable del pago de la mayor parte de los gastos por la atención recibida. Colombia, 2007

Gráfico 2.20. Proporción de personas en cada uno de los grupos de edad de los usuarios, según si le descontaron o no el salario correspondiente al tiempo no trabajado o dejaron de recibir ingresos. Colombia, 2007

Gráfico 2.21. Proporción de personas en cada uno de los regímenes de seguridad social donde está afiliado el usuario, según si le descontaron o no el salario correspondiente al tiempo no trabajado o dejaron de recibir ingresos. Colombia, 2007

Gráfico 2.22. Proporción de personas en cada uno de los niveles de educación del usuario, según si le descontaron o no el salario correspondiente al tiempo no trabajado o dejaron de recibir ingresos, Colombia, 2007

Gráfico 2.23. Proporción de personas en cada una de las actividades que realizó el usuario una semana antes de la encuesta, según si le descontaron o no el salario correspondiente al tiempo no trabajado o dejaron de recibir ingresos. Colombia, 2007

Gráfico 2.24. Proporción de mujeres gestantes que accedieron a control prenatal y que se les hizo una ecografía, según subregión. Colombia, 2007

Gráfico 2.25. Proporción de madres o padres que expresaron que han llevado sus hijos o hijas a controles de crecimiento y desarrollo, según la subregión de residencia. Colombia, 2007

LISTA DE CUADROS

Cuadro 2.1. Características en la atención de los usuarios para detección temprana de alteraciones del embarazo. Colombia, 2007

Cuadro 2.2. Características en la atención de los usuarios para detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo en menores de 10 años. Colombia, 2007

Cuadro 2.3. Características en la atención de las usuarias para la detección temprana de cáncer de cuello uterino. Colombia, 2007

Cuadro 2.4. Características en la atención de las usuarias para la atención del parto. Colombia, 2007

Cuadro 2.5. Características en la atención de las usuarias para la atención del recién nacido. Colombia, 2007

Cuadro 2.6. Características en la atención de los usuarios a la consulta de planificación familiar. Colombia, 2007

Cuadro 2.7. Características en la atención de los usuarios a la consulta de salud bucal. Colombia, 2007

Cuadro 2.8. Características en la atención de los usuarios a consulta por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). Colombia, 2007

Cuadro 2.9. Características en la atención de los usuarios a consulta por la Infección Respiratoria Aguda. Colombia, 2007

Cuadro 2.10. Características en la atención de los usuarios a consulta para el manejo de la desnutrición. Colombia, 2007


Cuadro 2.11. Características en la atención de los usuarios a consulta por obesidad y el sobrepeso. Colombia, 2007

Cuadro 2.12. Características en la atención de los usuarios a consulta para manejo de la hipertensión. Colombia, 2007

Cuadro 2.13. Características en la atención de los usuarios a consulta para manejo de la diabetes. Colombia, 2007

Cuadro 2.14. Características en la atención de los usuarios a consulta para manejo del VIH/SIDA. Colombia, 2007


GRÁFICOS



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.1. Distribución de la población de personas que accedieron a servicios de salud a través de Consulta Externa, por subregiones del país, según área de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.2. Proporción de personas del sexo femenino y del sexo masculino por subregiones del país que accedieron a consulta externa. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007





Gráfico 2.3. Relación entre la población de personas del sexo femenino y del sexo masculino que accedieron a consulta externa y encuestadas en los hogares, Colombia, 2007


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.4. Distribución porcentual de la población que accedió a Consulta Externa en cada una de las subregiones del país, según régimen de seguridad social en salud. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.5. Porcentaje de personas que accedió a Consulta Externa que respondieron la encuesta de SISBEN en su hogar, según régimen de seguridad social en salud. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.6. Porcentajes de personas que accedieron a servicios de Consulta Externa, por nivel educativo, según actividad desarrollada la semana anterior a la encuesta. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007


□ Ninguno ■ Preescolar ▨ Básica primaria □ Básica secundaria y media ▩ Educación superior



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.7. Proporción de mujeres y hombres que accedieron a servicios de salud, según estado civil, por nivel educativo. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.8. Proporción de mujeres y hombres que accedieron a servicios de salud, según el tiempo empleado para llegar a la institución prestadora del servicio. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 2.9. Proporción de personas que accedieron a servicios de salud según subregión y el tiempo empleado para llegar a la institución prestadora del servicio. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 2.10 Tiempo promedio (minutos) empleado para llegar a la institución prestadora del servicio según subregión. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 2.11. Proporción de personas que accedieron a servicios de salud según nivel educativo y el tiempo empleado para llegar a la institución prestadora del servicio. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.12. Proporción de personas que accedieron a servicios de salud según la actividad que realizó en la semana anterior a la que se le hizo la encuesta y el tiempo empleado para llegar a la institución prestadora del servicio. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.13. Tiempo promedio (minutos) empleado para llegar a la institución prestadora del servicio según sexo del usuario. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 2.14. Tiempo promedio (minutos) que deben esperar las personas que llegan a la institución para ser atendidos, según el nivel de educación del usuario. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.15. Tiempo promedio (minutos) que deben esperar las personas que llegan a la institución para ser atendidos, según la actividad que había desarrollado el usuario la semana anterior a la encuesta. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.16. Proporción de personas en cada uno de los sexos según la fuente o responsable del pago de la mayor parte de los gastos por la atención recibida. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.17. Proporción de personas en cada uno de los grupos de edad según la fuente o responsable del pago de la mayor parte de los gastos por la atención recibida. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.18. Proporción de personas en cada uno de los niveles educativos del usuario, según la fuente o responsable del pago de la mayor parte de los gastos por la atención recibida. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.19. Proporción de personas en cada una de las subregiones donde reside el usuario, según la fuente o responsable del pago de la mayor parte de los gastos por la atención recibida. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 2.20. Proporción de personas en cada uno de los grupos de edad de los usuarios, según si le descontaron o no el salario correspondiente al tiempo no trabajado o dejaron de recibir ingresos. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Gráfico 2.21. Proporción de personas en cada uno de los regímenes de seguridad social donde está afiliado el usuario, según si le descontaron o no el salario correspondiente al tiempo no trabajado o dejaron de recibir ingresos. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.22. Proporción de personas en cada uno de los niveles de educación del usuario, según si le descontaron o no el salario correspondiente al tiempo no trabajado o dejaron de recibir ingresos. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.23. Proporción de personas en cada una de las actividades que realizó el usuario una semana antes de la encuesta, según si le descontaron o no el salario correspondiente al tiempo no trabajado o dejaron de recibir ingresos. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.24. Proporción de mujeres gestantes que accedieron a control prenatal y que se les hizo una ecografía, según subregión. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 2.25. Proporción de madres o padres que expresaron que han llevado sus hijos o hijas a controles de crecimiento y desarrollo, según la subregión de residencia. Colombia, 2007.

CUADROS

Cuadro 2.1. Características en la atención de los usuarios para detección temprana de alteraciones del embarazo. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN				3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Remisiones	Suministro de medicamentos
El 92,8% de los funcionarios de las IPS objeto de la muestra, conocen la norma de obligatorio cumplimiento de detección temprana de alteraciones del embarazo.	La ENS-2007 demuestra que se realiza examen físico completo en el 58,6% de las IPS que ofertan las actividades, procedimientos e intervenciones de la norma de detección temprana de alteraciones durante el embarazo. Se observan bajas coberturas en las regiones Atlántica (54%), Orinoquia-Amazónica (55,6 %) y Bogotá (57,3%).	La solicitud o toma de exámenes de sangre se realiza al 91,4% de las usuarias encuestadas a nivel nacional; sin embargo, en Bogotá al 13,8% de las usuarias no se les realizó o se les solicitó el examen.	El 79,2% de las usuarias de la consulta reciben información sobre signos de alarma; Orinoquia-Amazónica, con el 32,5%, es la región que reporta mayor frecuencia de usuarias no informadas sobre estos signos.	La remisión a consulta de odontología general, muestra que en la totalidad de las regiones el 28,1% de las usuarias no es objeto de este beneficio. Bogotá tiene un 44,6% de usuarias que refieren no haber sido remitidas al servicio durante el control prenatal.	La formulación de hierro se realiza al 90,7% de las usuarias a nivel nacional; se observa que no formulan el mencionado micronutriente en las regiones de la Orinoquia- Amazonia con un 12,5%, Atlántica con un 10% y Bogotá con un 9,9%.
En las regiones Central y Pacífica los funcionarios muestran mayor conocimiento con el 94,9% y el 93,7% respectivamente.	A nivel nacional, la toma de presión arterial muestra porcentajes de 92,6 %. La región Atlántica, con un 11,2%, no realiza la actividad de toma de presión arterial durante la consulta realizada a la gestante.	La solicitud o toma de la prueba de VDRL no se realiza en el 51,5% de las usuarias encuestadas en Bogotá. A nivel nacional, el porcentaje para no solicitud de la prueba es del 35,3%.	El 26,8 % de las usuarias objeto de la muestra no son informadas sobre la importancia del parto institucional, observándose que en la región de la Orinoquia-Amazónica el 32,5% de gestantes no		En la totalidad de las regiones, al 90,2% de las usuarias atendidas se les formuló calcio. No se formula en las regiones Atlántica al 11,7%, Orinoquia-Amazónica, Oriental y Bogotá al 10,8%

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN				3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Remisiones	Suministro de medicamentos
			reciben la información.		de las gestantes atendidas en control prenatal.
Las regiones que muestran un mayor desconocimiento de la norma son Bogotá y Atlántica, con el 13% y el 10,7% respectivamente.	El control de peso no se realiza en el 12,7% de las IPS de la región de Bogotá. El condensado a nivel nacional muestra que no se realiza control de peso en el 9,2% de las IPS objeto de la muestra.	El porcentaje de solicitud y toma de uroanálisis en la totalidad de las regiones objeto de la muestra es del 93,5%. En Bogotá se evidencia que al 11,2% de las usuarias encuestadas no se les ha solicitado ni tomado un examen de orina durante el control prenatal.	Las recomendaciones sobre planificación familiar son recibidas durante el control prenatal por el 60,5% de las usuarias objeto de la muestra. La región de la Orinoquia-Amazonía reporta un 55% de usuarias informadas.		
	La toma de altura uterina no se realiza en el 15,4 de las IPS objeto de la muestra. Se observa que en las regiones Atlántica, Orinoquia-Amazonía y Bogotá no se realiza la actividad en un 18,2%, 17,9% y 17,5% respectivamente.	La prueba de VIH/SIDA se realiza al 89,1% de las usuarias encuestadas a nivel nacional. El 12,3% de usuarias en la región Bogotá manifiestan que no les solicitaron ni les tomaron la prueba.	El 81,6% de las gestantes, en la totalidad de las regiones objeto de la muestra, reciben recomendaciones frente al consumo de alcohol, tabaco y medicamentos no formulados. Las regiones donde las usuarias manifiestan no haber recibido la información son Orinoquia-Amazonía con 34,6%, Atlántica con 25,2% y Pacífica con 18%.		

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN				3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Remisiones	Suministro de medicamentos
	El control de la fetocardia no se realiza en el 18,7% de la IPS objeto de la muestra. La región donde se observa un mayor porcentaje (20,8%) de incumplimiento de esta actividad es Orinoquia-Amazonía.	La ecografía obstétrica se realiza al 87,9% de las usuarias a nivel nacional. Bogotá, con un 17,1%, es la región donde menos se práctica la ecografía a las usuarias encuestadas.			
	El porcentaje de aplicación de vacunas a la gestante, en la totalidad de IPS objeto de la muestra, es del 69%, observándose menor cobertura en la región Orinoquia-Amazonía con un 52,9%.				

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 2.2. Características en la atención de los usuarios para detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo en menores de 10 años. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN		
	Atenciones/Información recibida	Recomendaciones	Cita de control
El 92,6% de los funcionarios de las IPS objeto de la muestra, conocen la norma de obligatorio cumplimiento de detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo en menor de 10 años.	La ENS-2007 encontró que, en todas las regiones, se realiza examen físico completo en el 98,6% de las IPS que ofertan las actividades, procedimientos e intervenciones de detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años.	La recomendación sobre la importancia de la lactancia materna como alimento único hasta los seis meses y como alimento complementario hasta los dos años, es impartida al 82,3% de las usuarias objeto de la muestra. Bogotá, con un 26,7%, es la región que menos educación da a las madres sobre el tema.	El 92,8% de los niños menores de 10 años asiste a la cita de control de detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Se observa que en Bogotá se cita a consulta de control solo a 452 usuarios de los 524 reportados, lo que representa la menor cobertura en el país.
	En la región Central, el 9,3% de las IPS no realizan examen físico al menor de 10 años.	El carnet de vacunación refleja que es revisado al 58,9% de usuarios; la región Atlántica es la zona que representa el mayor porcentaje (35,6%), de no revisión.	
Las regiones que muestran un mayor desconocimiento de la norma son Bogotá y la Atlántica, con el 16,3% y el 11,8% respectivamente.	El control de peso se realiza en el 98,6% de las IPS objeto del estudio, observándose que en el 1,6% de las IPS en la región Central no controlan el peso de sus usuarios menores de 10 años.	La educación sobre prevención de accidentes se brinda al 46,5% de usuarios. En Bogotá el 58% de las madres evidencia no información sobre el tema.	

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN		
	Atenciones/Información recibida	Recomendaciones	Cita de control
Las regiones que muestran un mayor desconocimiento de la norma son Bogotá y la Atlántica, con el 16,3% y el 11,8% respectivamente.	El control de talla se realiza en el 97% de las IPS objeto de la muestra, observándose que en el 5,3% de las IPS de la región Bogotá no se realiza esta actividad.	La capacitación a las madres sobre la importancia del juego para estimular el desarrollo del niño(a) es brindada a 2000 (54,3%) de las madres y/o cuidadores. Los datos reportan que en Bogotá el 56,7% de las usuarias encuestadas respondió negativamente.	
	El perímetro cefálico se toma al 74,8% de los niños en las regiones objeto de la muestra; observándose que en la región de la Orinoquia-Amazonía esta actividad solo se realiza al 69,2% de los usuarios atendidos.	Las recomendaciones sobre pautas de crianza son proporcionadas al 46% de las madres y/o cuidadores de menores. Bogotá evidencia el 67,9% de no ejecución de esta actividad educativa.	
		La educación sobre hábitos higiénicos muestra a Bogotá con el mayor porcentaje (44,8%) de no educación sobre baño diario y aseo de genitales a madres y/o cuidadores del menor.	
		En todas las regiones, el 66,6% de la madres encuestadas recibieron información sobre el cuidado de la piel; no obstante, la región Oriental muestra un porcentaje del 36,7% de no instrucción sobre el tema.	

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN		
	Atenciones/Información recibida	Recomendaciones	Cita de control
		El estado de salud del menor objeto de la consulta es informado al 96,4% de las madres y/o cuidares objeto de la muestra.	
		Las recomendaciones sobre el inicio de la alimentación complementaria son proporcionadas al 68,6% de las madres y/o cuidadores en la totalidad de las regiones, excepto Bogotá donde no se brinda esta información al 38,3% de los usuarios objeto de la muestra.	
		Las pautas de crianza relacionadas con el sueño y las diferencias de llanto son brindadas al 45% de madres y/o cuidadores en todas las regiones, excepto Bogotá donde estas recomendaciones son suministradas solo al 27,6% de la población usuaria del servicio de control de crecimiento y desarrollo.	

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 2.3. Características en la atención de las usuarias para la detección temprana de cáncer de cuello uterino. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN			3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Cita de control	Remisiones	Suministro de insumos y/o medicamentos
La Encuesta Nacional de Salud no contempla esta variable	El procedimiento se explica al 75,4% de las usuarias atendidas en la totalidad de las regiones objeto de la muestra, excepto en la Atlántica que alcanza el 32,9% de no explicación del procedimiento a realizar.	La cita de control se informa al 79,6% de las usuarias, evidenciándose que en la región Atlántica el 25% de las usuarias no son citadas para el próximo examen.	Las usuarias objeto de la muestra son remitidas a exámenes confirmatorios como: colposcopia al 49,7%, biopsia al 26,2% y otro examen al 24,2%.	El 92,6% de las usuarias manifiestan no haber comprado ningún insumo al realizarle el procedimiento. Las regiones donde las usuarias han comprado insumos son la Atlántica (11,1%) y la Pacífica (10,2%).
	La importancia de la realización de la citología cérvico-uterina es explicada al 82% de las usuarias atendidas; se evidencia un porcentaje de no explicación del 22,1% en la región Atlántica.			
	La solicitud de autorización para realizar el procedimiento se efectúa al 72,5 % de las usuarias objeto de la encuesta. En la región Pacífica no se realiza esta actividad en el 34,3% de los casos atendidos.			
	La explicación de los resultados a las usuarias objeto de la encuesta se evidencia en el 95,2% en la totalidad de las regiones; no obstante, se muestra un porcentaje del 9,1% de no información a las usuarias en la región Atlántica.			

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN			3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Cita de control	Remisiones	Suministro de insumos y/o medicamentos
	La explicación es comprendida por el 98,2% de las usuarias en la totalidad de las regiones objeto de la encuesta.			

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 2.4. Características en la atención de las usuarias para la atención del parto. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN			3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Recomendaciones recibidas	Cita de control	Remisiones	Suministro de insumos y/o medicamentos
La Encuesta Nacional de Salud no contempla esta variable	La recomendación sobre problemas después del parto no se brinda al 35% de las madres objeto de la muestra. Se observa en la región Atlántica un porcentaje del 45,5% de no información a las usuarias.	El control post parto reporta que al 82,4% de las madres se le brinda información al respecto. La región Atlántica muestra el mayor porcentaje (27,8%) de usuarias no informadas.	La remisión se realiza a 893 usuarias que corresponden al 32,6% de la totalidad de la muestra.	La Encuesta Nacional de Salud no contempla esta variable
	La información sobre planificación familiar se omite al 42% de las usuarias objeto de la muestra; la región Atlántica muestra que el 57,9% de las madres egresan de las instituciones sin esta información.		Las causas de remisión son: 60,7% porque se requiere un mayor nivel de complejidad, 17,2% porque la institución no cuenta con materiales suficientes para su atención, 6,7% porque no había quién la atendiera o porque no había cupo y 5,3% porque no había contrato o desconoce el motivo de la remisión.	
	El 92% de las madres encuestadas mostró interés en el uso de métodos para evitar el embarazo, observándose desinterés en el 10% de las mujeres encuestadas en la región Atlántica.		En la región Oriental el 28% (35) de las usuarias fueron remitidas por causas inherentes a la calidad de la atención, tales como falta de insumos y recurso humano.	

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN			3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Recomendaciones recibidas	Cita de control	Remisiones	Suministro de insumos y/o medicamentos
	El cuidado de heridas posparto no se informa al 24,8% de las usuarias. En la región Atlántica el 31,3% de usuarias no son capacitadas al respecto.			
	La educación sobre lactancia materna se brinda al 84,5% de las usuarias atendidas, notándose que el 24,2% de las madres encuestadas en la región Atlántica no son informadas sobre cómo darle pecho o seno al bebé.			

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 2.5. Características en la atención de las usuarias para la atención del recién nacido. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN			3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Cita de control	Suministro de insumos y/o medicamentos
La Encuesta Nacional de Salud no contempla esta variable	De la totalidad de la muestra (2741 usuarias), se le aplicó vacunas al recién nacido al 72,9% (1998 usuarias), al 18,4% no les aplicaron y el 8,7% no sabe. En la región Atlántica el 40,7% (367 usuarias) de las madres manifiestan que no las aplicaron o no saben si recibieron el servicio.	La prueba para TSH se realiza al 68,8% de los 2741 recién nacidos reportados, no se le realiza al 10,8% y no sabe el 20,4%.	La norma de protección específica del recién nacido menciona que se le debe dar consulta de control a las 72 horas. En la región Atlántica el 36,4% de madres no son informadas. En la totalidad de las regiones se evidencia un 75,8% de personas informadas frente a un 24,2% de no informadas.	La Encuesta Nacional de Salud no contempla esta variable
	La entrega de carnet de vacunación del recién nacido se realizó a 1809 (90,5%) de las usuarias que respondieron haber recibido las vacunas; la región Pacífica reporta no hacer entrega del carnet al 17,7% de las usuarias que afirman que sus niños fueron vacunados.			

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 2.6. Características en la atención de los usuarios a la consulta de planificación familiar. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN		3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Suministro de insumos y/o medicamentos
El 91,6% de los funcionarios de las IPS objeto de la muestra conocen la norma de obligatorio cumplimiento de protección específica de planificación familiar; se observa mayor desconocimiento de la norma en las regiones Bogotá (10,9%) y Atlántica (10,3%).	Los métodos de planificación familiar son explicados por el médico al 89% de los usuarios. Bogotá, con un 15,9%, es la región con mayor proporción de usuarios no informados.	La Encuesta Nacional de Salud no contempla esta variable	El método elegido es comprado por el 27,3% de los usuarios objeto de la muestra. Bogotá muestra una mayor participación en la compra de anticonceptivos, con el 52,4% (129 usuarios).
La disponibilidad de la norma se encuentra en el 86,7% de las IPS objeto del análisis.	El método de mayor aceptación por parte de los usuarios es la inyección: 30% a nivel nacional. Bogotá, con un 39,8%, es la región donde es mejor aceptado este método. La píldora ocupa el segundo lugar de aceptación en las demás regiones del país.		
	La encuesta de usuarios muestra que el 93,7% elige libremente el método. En la mayoría de los casos quienes deciden la conveniencia del método son los profesionales de la salud: el médico representa un porcentaje del 77% y la enfermera del 12%.		
	La explicación sobre el uso de los métodos de planificación familiar se brindada al 96,2% de los usuarios y, de este porcentaje, es comprendida por el 99,3%.		

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

Cuadro 2.7. Características en la atención de los usuarios a la consulta de salud bucal. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN		3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Cita de control	Suministro de insumos y/o medicamentos
La norma de protección específica de salud bucal es conocida y utilizada durante la consulta por el 97,6% de los funcionarios de las IPS objeto de la muestra.	Los procedimientos de la norma de salud bucal se reflejan en: control de placa bacteriana realizado al 42,8% de los usuarios objeto de la muestra, aplicación de flúor al 19,4% y aplicación de sellantes al 18,7%.	La información sobre la consulta de control se brinda al 82,8% de los usuarios atendidos en consulta por salud bucal. El 19,9% de los usuarios atendidos en la región Pacífica manifiestan no haber recibido esta información.	La Encuesta Nacional de Salud no contempla esta variable
	La explicación sobre el lavado de dientes y el uso de seda dental es recibida, en el primer caso, por el 65,99% y, en el segundo, por el 59,3% de los usuarios.		
	La información sobre los problemas dentales existentes se imparte al 74,9% a los usuarios objeto de la muestra.		
	Al 72,9% de la población encuestada se le explica el tratamiento a realizar y los riesgos que implica.		

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

Cuadro 2.8. Características en la atención de los usuarios a consulta por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN				3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Suministro de insumos y/o medicamentos
El 89,8% de los funcionarios de las IPS objeto de la muestra conocen la guía de atención para la enfermedad diarreica aguda.	El control de peso durante la consulta se realiza a 638 menores, lo que representa el 88,9% de los usuarios objeto de la muestra.	La solicitud de exámenes de sangre se realiza al 60,9% de los usuarios objeto de consulta.	Las instrucciones para preparar el suero casero son ofrecidas al 42,6% de los usuarios.	La cita de control es informada al 45,5% de los usuarios atendidos en consulta por EDA. En la región Pacífica el 52,6% (41) de los usuarios no son informados al respecto.	El suministro de medicamentos es comprendido por el 99,3% de los usuarios objeto de la atención; se evidencia un porcentaje del 1,5% en la región Central, donde los usuarios no comprenden cómo suministrar el medicamento al niño.
La disponibilidad de la guía durante la consulta se reporta en el 51,9% de las IPS objeto de encuesta.	El control de talla se realizó a 325 menores, lo que representa el 45,3% de los usuarios objeto de la muestra.		La recomendación sobre alimentación al niño con EDA es brindada al 72% de los consultantes.		Los medicamentos formulados son entregados en su totalidad al 56,8%, el 22,6% los tiene que comprar todos y el 14,5% tiene que comprar parte. La región Atlántica. evidencia el 31,3% de compra total de medicamentos.
La Orinoquia-Amazonía, con el 94,8%, es la región con mayor conocimiento de la norma en las IPS objeto de la muestra.	La aplicación o suministro de suero muestra que el 69,8% (501) de los menores atendidos requiere el suplemento.		La información sobre la administración de líquidos es suministrada al 74,9% de los usuarios. La región Atlántica no informa sobre el tema al 46,9% de los		

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN				3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Suministro de insumos y/o medicamentos
El 89,8% de los funcionarios de las IPS objeto de la muestra conocen la guía de atención para la enfermedad diarreica aguda.	El control de peso durante la consulta se realiza a 638 menores, lo que representa el 88,9% de los usuarios objeto de la muestra.	La solicitud de exámenes de sangre se realiza al 60,9% de los usuarios objeto de consulta.	Las instrucciones para preparar el suero casero son ofrecidas al 42,6% de los usuarios.	La cita de control es informada al 45,5% de los usuarios atendidos en consulta por EDA. En la región Pacífica el 52,6% (41) de los usuarios no son informados al respecto.	El suministro de medicamentos es comprendido por el 99,3% de los usuarios objeto de la atención; se evidencia un porcentaje del 1,5% en la región Central, donde los usuarios no comprenden cómo suministrar el medicamento al niño.
			usuarios.		
			La educación sobre signos de alarma se ofrece al 51,9% de los usuarios. La región Atlántica muestra que 113 (60,4%) usuarios no son informados sobre el tema.		

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN				3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones/Información recibida	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Suministro de insumos y/o medicamentos
El 89,8% de los funcionarios de las IPS objeto de la muestra conocen la guía de atención para la enfermedad diarreica aguda.	El control de peso durante la consulta se realiza a 638 menores, lo que representa el 88,9% de los usuarios objeto de la muestra.	La solicitud de exámenes de sangre se realiza al 60,9% de los usuarios objeto de consulta.	Las instrucciones para preparar el suero casero son ofrecidas al 42,6% de los usuarios.	La cita de control es informada al 45,5% de los usuarios atendidos en consulta por EDA. En la región Pacífica el 52,6% (41) de los usuarios no son informados al respecto.	El suministro de medicamentos es comprendido por el 99,3% de los usuarios objeto de la atención; se evidencia un porcentaje del 1,5% en la región Central, donde los usuarios no comprenden cómo suministrar el medicamento al niño.
			La región Atlántica muestra la mayor proporción de usuarios no informados sobre alimentación (32,1%), administración de líquidos (28,3%) y signos de alarma (60,4%)		

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 2.9. Características en la atención de los usuarios a consulta por la Infección Respiratoria Aguda. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN				3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones recibidas	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Suministro de insumos y/o medicamentos
La guía de atención para la infección respiratoria aguda es conocida por el 87,5% de los funcionarios en las IPS objeto del estudio.	El examen físico se realiza a 1101 consultantes, lo que representa el 99,5% de los usuarios de la muestra.	La solicitud de exámenes de laboratorio o de radiología se realiza al 57,4% de los usuarios objeto de la muestra.	La recomendación sobre alimentación al infante con IRA es brindada al 52,1% de los consultantes. En la región Atlántica se reporta que el 54% de los usuarios no reciben recomendación al respecto.	La información es suministrada al 56,6% de los usuarios atendidos en consulta por IRA.	El modo del suministro de medicamentos es comprendido por el 98,5% de los usuarios objeto de la atención.
La guía de atención se encuentra disponible en los consultorios de atención en el 71,3% de las IPS objeto de la encuesta.	El control de peso durante la consulta se realizó a 1009 menores, lo que representa el 91,2% de los usuarios objeto de la muestra.		La información sobre la administración de líquidos al menor con IRA es suministrada al 55,2% de los usuarios. En la región de la Orinoquia-Amazonia el 52,6% de los consultantes no son informados al respecto.		Los medicamentos formulados para el tratamiento de IRA son entregados en su totalidad al 59,4% de los usuarios, el 18,9% los tiene que comprar todos y el 15,8% tiene que comprar parte.
	El control de talla durante la consulta se realizó a 572 menores, lo que representa el 51,9% de los usuarios objeto de la muestra.		La educación sobre signos de alarma se ofrece al 53,3% en la totalidad de las regiones objeto del estudio. La región Atlántica muestra que un 58,4% de los usuarios encuestados no son informados sobre el tema.		

Cuadro 2.10. Características en la atención de los usuarios a consulta para el manejo de la desnutrición. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA	2. DURANTE LA ATENCIÓN	3. POSTERIOR A LA
----------------	------------------------	-------------------

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

ATENCIÓN					ATENCIÓN
	Atenciones recibidas	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Suministro de insumos y/o medicamentos
La guía para la atención de alteraciones asociadas a la nutrición (desnutrición proteica, calórica y obesidad) es conocida por el 69,1% de las IPS, observándose el mayor desconocimiento (39,7%) de ella en Bogotá.	El examen físico se realizó a 44 usuarios, lo que representa el 97,8% de la totalidad de la muestra.	La solicitud de exámenes de laboratorio se realiza al 77,8% de los usuarios objeto de consulta.	De 45 casos reportados, se le brindaron recomendaciones sobre la alimentación adecuada del menor con deficiencias nutricionales al 75,6% de los usuarios. En Bogotá, el 50% del total de casos (2) recibieron información al respecto.	La información sobre la consulta de control se ofrece al 64,4% de los usuarios atendidos en consulta por deficiencias nutricionales.	La formulación de suplemento nutricional se le proporciona al 55,6% de los usuarios atendidos. En la región Oriental no se formuló a los 4 menores atendidos.
La guía se encuentra disponible para su consulta en el 54,6% de las IPS objeto de la muestra.	El control de peso se realiza durante la consulta al 97,8% de los usuarios.				El modo de suministro de medicamentos es comprendido por el 100% de los usuarios objeto de la atención.
	El control de talla durante la consulta se realizó a 31 usuarios, lo que representa el 68,9% de la totalidad de la muestra.				Los medicamentos formulados son entregados en su totalidad al 37,5% de los usuarios, el 50% los compró total o parcialmente. En la región Atlántica se encuentra la mayor proporción de usuarios (30,8%) que deben comprar todos los medicamentos.

Cuadro 2.11. Características en la atención de los usuarios a consulta por obesidad y el sobrepeso. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN				3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones recibidas	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Suministro de insumos y/o medicamentos
La guía para la atención de alteraciones asociadas a la nutrición (desnutrición proteica, calórica y obesidad) es conocida por el 69,1% de las IPS, observándose el mayor desconocimiento (39,7%) de ella en Bogotá.	La consulta por médico general se brindó al 84% de los 51 casos objeto de la muestra.	Los exámenes de colesterol y triglicéridos se realizaron a 43 (84,3%) usuarios objeto de consulta por obesidad y/o sobrepeso. En las regiones Oriental y Central se realizaron al 100% de los usuarios atendidos en consulta.	La información sobre los hábitos no saludables de consumo de cigarrillo y alcohol se brindó, en el primer caso, al 81,8% de los usuarios y, en el segundo, al 78,2%.	La información sobre la consulta de control se brinda al 72,7% de los usuarios atendidos en consulta por obesidad y/o sobrepeso.	El consumo de medicamentos se reporta en el 11,8% de los usuarios atendidos en consulta por obesidad y/o sobrepeso.
La guía se encuentra disponible para su consulta en el 54,6 % de las IPS objeto de la muestra.	La consulta por especialista muestra que 31 (62,7%) usuarios encuestados fueron atendidos por problemas relacionados con obesidad y/o sobrepeso.	La prueba de glicemia en sangre o en orina se realizó a 36 (70,6%) usuarios encuestados. En la región Atlántica al 58,3% (7) de los usuarios no se les solicita glicemia.	Las indicaciones sobre el manejo del estrés y la importancia de realizar ejercicio se brindan al 78,2% y 90,9%, respectivamente, de los usuarios del servicio.		Los medicamentos formulados son entregados en su totalidad al 50% (3) de los usuarios; el otro 50% los tiene que comprar.
	Las consultas de psicología se realizaron al 21,6% de los usuarios, y de nutrición al 56,9%.		Las recomendaciones para bajar de peso se ofrecieron al 98,2% de los usuarios.		

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN				3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones recibidas	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Suministro de insumos y/o medicamentos
			Se brindaron recomendaciones sobre hábitos alimentarios tales como: disminución del consumo de grasas (96,4%), harinas (94,5%) y dulces (92,5%).		
			La invitación a realizarse periódicamente exámenes de sangre para determinar grasa en sangre se realiza al 80% de los usuarios atendidos.		

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

Cuadro 2.12. Características en la atención de los usuarios a consulta para manejo de la hipertensión. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN					3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones recibidas	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Remisiones	Suministro de insumos y/o medicamentos
La guía de atención de la hipertensión es conocida por el 82,9% de los funcionarios de las IPS objeto de la muestra.	La consulta por médico general se realiza al 92,1% de los usuarios atendidos por hipertensión. Bogotá tiene el mayor número de casos (15) no atendidos.	Los exámenes de colesterol y triglicéridos se realizan al 78,5% de los usuarios objeto de consulta por hipertensión arterial	La información sobre hábitos no saludables se brinda: sobre el consumo de cigarrillo al 75% de los usuarios y sobre el consumo de alcohol al 72%.	La información sobre la consulta de control es suministrada al 78,7% de los usuarios atendidos en consulta por hipertensión arterial.	El 6,2% de los usuarios fue remitido a consultas de psicología. Bogotá es la región con mayor proporción de usuarios (95; 6%) no atendidos por esta disciplina.	El 87,5% de los usuarios atendidos en consulta por hipertensión arterial consume medicamentos.
La guía se encuentra disponible para la consulta en el 58,8% de las IPS objeto de la muestra.	El 52,6% de los usuarios atendidos por hipertensión arterial lo fueron por médico especialista. La región Oriental tiene el mayor porcentaje (56%) de usuarios no atendidos.		Las indicaciones sobre el manejo del estrés y la importancia de realizar ejercicio se brindan al 74,8% y 78,8%, respectivamente, de los usuarios del servicio.		La consulta de nutrición se realiza al 22,1% de los usuarios. En la región Oriental el 80,5% de los usuarios no fueron atendidos por nutricionista.	Al 68,2%, de los 534 usuarios atendidos, los medicamentos formulados les fueron suministrados en su totalidad; el 31,7% los tuvo que comprar total o parcialmente. Bogotá evidencia el mayor porcentaje (25,6%) de compra total de medicamentos.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN					3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones recibidas	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Remisiones	Suministro de insumos y/o medicamentos
			Las recomendaciones para bajar de peso se brindan al 66,52% de los usuarios.			De los 85 (13,9%) usuarios que dijeron haber suspendido el tratamiento, adujeron razones de tipo personal, el 53%, no disponibilidad del medicamento en la EPS el 11,8% por y por ser medicamentos no POS el 8,2%.
			Las recomendaciones sobre hábitos alimentarios como la disminución del consumo de grasas y harinas se brindan al 93% y al 93,2% respectivamente.			
			La invitación a realizarse periódicamente exámenes de sangre para determinar grasa en sangre se realiza al 72,9% de los usuarios atendidos.			

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

Cuadro 2.13. Características en la atención de los usuarios a consulta para manejo de la diabetes. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN					3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones recibidas	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Remisiones	Suministro de insumos y/o medicamentos
La guía de atención para diabetes es conocida por el 81,9% de los funcionarios de las IPS objeto de la muestra.	El control de la presión arterial se realiza al 84% de los usuarios de la consulta de diabetes, reflejándose, la región Atlántica con mayor porcentaje (25,4%) de no control de la presión arterial a los usuarios.	Los exámenes de colesterol y triglicéridos se les realizan al 85,5% de los usuarios objeto de consulta por diabetes.	La información sobre hábitos no saludables como el consumo de cigarrillo y alcohol se realiza al 81,1% y al 79,7% respectivamente.	La información sobre la consulta de control se brinda al 81,1% de los usuarios atendidos en consulta por diabetes.	La remisión a consultas de psicología y nutrición se observa en el 8,9% y el 42,7% de los usuarios atendidos respectivamente.	Los medicamentos formulados a 235 usuarios son suministrados en su totalidad al 67,2%, el 13,2% los tiene que comprar todos y el 17% tiene que comprar parte. Observándose, que en la región Oriental el 22% de los usuarios compra todos los medicamentos.
La guía se encuentra disponible para la consulta en el 58,1% de las IPS objeto de la muestra.	La consulta por especialista muestra que el 63,5% de los usuarios encuestados han sido atendidos por diabetes.	La solicitud o realización de glicemia en sangre o en orina se evidencia en el 88,7% de los usuarios encuestados.	Las indicaciones sobre el manejo del estrés y la importancia de realizar ejercicio se brindan al 77,4% y 84,8% de los usuarios del servicio respectivamente.			
		El uso de glucómetro o tiras reactivas para medir glicemia en la casa, se observa en 104 (31,2%) usuarios que manifiestan	Las recomendaciones para bajar de peso se ofrecen al 72,8%			

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN					3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones recibidas	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Recomendaciones	Cita de control	Remisiones	Suministro de insumos y/o medicamentos
		emplear algún método.				
			Las recomendaciones sobre hábitos alimentarios como la disminución del consumo de grasas, harinas y dulces se brindan al 94,6%, al 96% y al 97,7% respectivamente.			
			La invitación a realizarse periódicamente exámenes de sangre para determinar niveles de azúcar en sangre se realiza el 89,1% de los usuarios atendidos.			

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

Cuadro 2.14. Características en la atención de los usuarios a consulta para manejo del VIH/SIDA. Colombia, 2007.

1. ANTES DE LA ATENCIÓN	2. DURANTE LA ATENCIÓN				3. POSTERIOR A LA ATENCIÓN
	Atenciones recibidas	Exámenes de laboratorio solicitados o tomados	Cita de control	Remisiones	Suministro de insumos y/o medicamentos
La Encuesta Nacional de Salud no contempla esta variable	La consulta de medicina general se realizó a 18 pacientes (90%) atendidos por VIH-SIDA	La prueba de carga viral se realizó a 17 de los 20 usuarios atendidos por VIH-SIDA.	Los controles atendidos por el mismo médico fueron realizados a 13 pacientes, y por médicos diferentes a 7 pacientes.	La remisión a otros profesionales mostró: 12 usuarios remitidos a consulta de psicología y nutrición y 8 a consulta de trabajo social.	El consumo de medicamentos se observa en 17 (85%) usuarios atendidos en consulta por VIH-SIDA.
	La consulta por especialista se realiza al 90% de los usuarios atendidos por VIH-SIDA.				Los medicamentos formulados fueron suministrados en su totalidad a 13 pacientes, 1 los tuvo que comprar todos y 2 compraron parte.
					Las razones manifestadas para suspender el tratamiento con antirretrovirales fueron: lo suspenden por motivos personales, 3 usuarios (se sintieron bien o no toleraron el medicamento), falta de disponibilidad del medicamento en la EPS, 2 usuarios.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 2007

TOMO V

ANEXOS CAPÍTULO V:

DEMANDA Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS, PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 5.1. Distribución de frecuencias de problemas de salud bucal auto percibidos según departamento y sexo. Colombia, 2007

Gráfico 5.2. Distribución de frecuencias de problemas de salud bucal auto percibidos (dolor dental) según departamento y sexo. Colombia, 2007

Gráfico 5.3. Distribución de frecuencias de problemas de salud bucal auto percibidos (caries dental) según departamento y sexo. Colombia, 2007

Gráfico 5.4. Morbilidad atendida según profesional que brindó el servicio. Colombia, 2007

Gráfico 5.5. Morbilidad sentida según profesional que brindó el servicio. Colombia, 2007

LISTA DE CUADROS

Cuadro 5.1. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) de problemas bucales auto percibidos según características socio demográficas. Colombia, 2007

Cuadro 5.2. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) de problemas bucales auto percibidos (dolor dental) según características socio demográficas. Colombia, 2007

Cuadro 5.3. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) de problemas bucales auto percibidos (caries dental) según características socio demográficas. Colombia, 2007


Cuadro 5.4. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) según consulta externa por problemas dentales según algunas variables socio demográficas. Colombia, 2007

Cuadro 5.5. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) de según consulta externa por atención preventiva según algunas variables socio demográficas. Colombia, 2007

Cuadro 5.6. Afiliación al sistema de salud según uso de los servicios de salud. Colombia, 2007

Cuadro 5.7. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) de según acciones de atención preventiva. Colombia, 2007

GRÁFICOS




*Porcentajes ajustados por cada departamento.

**No se aprecia San Andrés, el cual tiene un % de 16,1 en hombres y 12,7 en mujeres.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Grafico 5.1 Distribución de frecuencias de problemas de salud bucal auto percibidos según departamento y sexo. Colombia, 2007.




*Porcentajes ajustados por cada departamento

**No se aprecia San Andrés, el cual tiene un % de 63,6 en hombres, y 62,5 en mujeres

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 5.2. Distribución de frecuencias de problemas de salud bucal auto percibidos (dolor dental) según departamento y sexo. Colombia, 2007.




*Porcentajes ajustados por cada departamento

**No se aprecia San Andrés, el cual tiene un % de 40,0 en hombres y 33,3 en mujeres

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 5.3. Distribución de frecuencias de problemas de salud bucal auto percibidos (caries dental) según departamento y sexo. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 5.4. Morbilidad atendida según profesional que brindó el servicio. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 5.5. Morbilidad sentida según profesional que brindó el servicio. Colombia, 2007.

CUADROS

Cuadro 5.1. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) de problemas bucales auto percibidos según características socio demográficas. Colombia, 2007.

Variables	Problemas bucales en los últimos 30 días			
	%		Análisis bivariado	
	Sí (n=11.775)	No (n=68.851)	OR	IC 95%
Sexo				
Hombre	43,4	48,5	1,0	
Mujer	56,6	51,5	1,2	[1,19 - 1,28]
Edad				
<10	11,1	11,5	1,0	
nov-20	20,7	23,5	0,9	[0,85 - 0,99]
21-30	21,2	19,3	1,1	[1,06 - 1,23]
31-40	16,7	14,9	1,2	[1,08 - 1,26]
41-50	16,3	14,3	1,2	[1,10 - 1,28]
>50	14,0	16,4	0,9	[0,82 - 0,96]
Nivel Educativo				
Ninguno/Primarios	38,4	42,3	1,1	[1,00 - 1,19]
Secundarios	52,5	48,6	0,9	[0,84 - 1,00]
Universitarias	9,1	9,2	1,0	
Grupo étnico (Sí = 10.253, No=59.160)				
Indígena	6,9	5,3	1,4	[1,25 - 1,48]
Gitano	0,2	0,1	1,6	[0,96 - 2,72]
Raizal del archipiélago	0,1	0,1	1,1	[0,64 - 1,93]
Palenquero	0,2	0,1	2,9	[1,77 - 4,70]
Negro, mulato (afro descendiente)	11,0	9,3	1,2	[1,15 - 1,32]
Ninguno de los anteriores	81,6	85,1	1,0	
Situación de salud general				
Buena	60,8	74,2	1,0	
Mala	39,2	25,8	1,9	[1,78 - 1,93]

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.2. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) de problemas bucales auto percibidos (dolor dental) según características socio demográficas. Colombia, 2007.

Variables	Dolor		Análisis bivariado	
	%		OR	IC 95%
	Sí (n =7.310)	No (n =11.774)		
Sexo				
Hombre	42,9	44,1	1,0	
Mujer	57,1	55,9	1,1	[0,98 - 1,13]
Edad				
<10	10,9	11,3	1,0	
nov-20	20,0	22,0	0,9	[0,81 - 1,08]
21-30	21,5	20,5	1,0	[0,85 - 1,13]
31-40	16,5	17,0	1,0	[0,86 - 1,15]
41-50	17,5	14,4	1,3	[1,08 - 1,45]
>50	13,6	14,8	1,0	[0,81 - 1,10]
Nivel Educativo				
Ninguno/Primarios	44,1	28,2	3,1	[2,61 - 3,66]
Secundarios	49,1	58,5	1,7	[1,41 - 1,95]
Universitarias	6,7	13,3	1,0	
Grupo étnico (Sí = 6.384, No = 3.868)				
Indígena	7,3	6,2	1,2	[1,04 - 1,45]
Gitano	0,1	0,3	0,4	[0,14 - 1,11]
Raizal del archipiélago	0,2	0,1	1,3	[0,40 - 4,22]
Palenquero	0,3	0,1	2,4	[0,84 - 7,31]
Negro, mulato (afro descendiente)	11,7	9,7	1,3	[1,09 - 1,43]
Ninguno de los anteriores	80,4	83,6	1,0	
Situación de salud general				
Buena	56,2	68,4	1,0	
Mala	43,8	31,6	1,7	[1,56 - 1,83]

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.3. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) de problemas bucales auto percibidos (caries dental) según características socio demográficas. Colombia, 2007.

Variables	Caries dental			
	%		Análisis bivariado	
	Sí (n =4.285)	No (n =7.490)	OR	IC 95%
Sexo				
Hombre	46,6	41,5	1,0	
Mujer	53,4	58,5	0,8	[0,75 - 0,88]
Edad				
<10	11,4	10,9	1,0	
10-20	17,5	22,6	0,7	[0,64 - 0,85]
21-30	21,3	21,1	1,0	[0,85 - 1,13]
31-40	18,0	15,9	1,1	[0,93 - 1,25]
41-50	17,6	15,6	1,1	[0,93 - 1,24]
>50	14,1	14,0	1,0	[0,83 - 1,12]
Nivel Educativo				
Ninguno/Primarios	42,9	35,6	1,8	[1,51 - 2,15]
Secundarios	50,1	54,0	1,4	[1,14 - 1,61]
Universitarias	7,0	10,4	1,0	
Grupo étnico (Sí= 3.729, No= 6.524)				
Indígena	8,6	5,9	1,5	[1,31 - 1,80]
Gitano	0,1	0,2	0,6	[0,17 - 1,68]
Raizal del archipiélago	0,1	0,2	0,7	[0,18 - 2,25]
Palenquero	0,4	0,2	2,6	[1,07 - 6,20]
Negro, mulato (afro descendiente)	11,5	10,7	1,1	[0,98 - 1,28]
Ninguno de los anteriores	79,3	82,9	1,0	
Situación de salud general				
Buena	54,3	64,6	1,0	
Mala	45,7	35,4	1,5	[1,42 - 1,65]

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5.4. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) según consulta externa por problemas dentales según algunas variables socio demográficas. Colombia, 2007.

Variables	Consulta relacionada con problemas dentales			
	%		Análisis bivariado	
	Sí (n=1.179)	No (n=79.451)	OR	IC 95%
Sexo				
Hombre	52,1	47,7	1,0	
Mujer	47,9	52,3	0,9	[0,74 - 0,94]
Edad				
<10	16,2	11,4	1,0	
oct-20	29,3	23,0	0,9	[0,75 - 1,07]
21-30	16,8	19,6	0,6	[0,49 - 0,74]
31-40	16,1	15,1	0,8	[0,61 - 0,91]
41-50	12,7	14,6	0,6	[0,49 - 0,76]
>50	8,8	16,2	0,4	[0,30 - 0,49]
Nivel Educativo				
Ninguno/Primarios	34,3	41,8	0,5	[0,48 - 0,73]
Secundarios	43,1	41,8	0,8	[0,61 - 0,14]
Universitarios	22,6	16,4	1,0	
Trabajo actual (4 últimas semanas)				
Obrero o empleado de empresa o persona particular	33,6	36,8	0,6	[0,27 - 1,23]
Obrero o empleado del gobierno	6,4	5,0	0,8	[0,36 - 1,82]
Jornalero o peón	9,6	6,5	0,9	[0,43 - 2,06]
Empleado doméstico	3,8	4,1	0,6	[0,25 - 1,39]
Profesional independiente	2,3	2,3	0,6	[0,24 - 1,57]
Trabajador independiente o por cuenta propia	36,8	37,8	0,6	[0,29 - 1,32]
Patrón o empleador	1,3	0,8	1,0	
Trabajador de su propia finca o de finca en arriendo	2,4	3,5	0,4	[0,17 - 1,10]
Trabajador familiar sin remuneración	2,3	2,5	0,6	[0,23 - 1,48]
Ayudante sin remuneración	1,7	0,9	1,2	[0,44 - 3,13]
Grupo étnico				
Indígena	5,2	5,5	0,9	[0,71 - 1,26]
Gitano	0,1	0,1	0,9	[0,12 - 6,10]
Raizal del archipiélago	0,2	0,1	1,5	[0,38 - 6,07]
Negro, mulato (afro descendiente)	10,5	9,5	1,1	[0,89 - 1,36]
Ninguno de los anteriores	84,0	84,6	1,0	

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.5. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) de según consulta externa por atención preventiva según algunas variables socio demográficas. Colombia, 2007.

Variables	Atención preventiva			
	%		Análisis bivariado	
	Sí	No	OR	IC 95%
Sexo				
Hombre	41,0	48,0	1,0	
Mujer	59,0	52,0	1,3	[0,76 - 2,31]
Edad				
<10	17,3	11,4	1,7	[1,38 - 1,97]
10-20	21,6	23,2	1,3	[1,09 - 1,52]
21-30	15,3	19,7	1,1	[0,91 - 1,29]
31-40	10,9	15,3	1,0	
41-50	12,8	14,7	1,2	[1,01 - 1,45]
>50	25,6	15,8	2,2	[1,88 - 2,58]
Nivel Educativo				
Ninguno/Primarios	36,1	41,8	0,6	[0,49 - 0,66]
Secundarios	39,2	41,9	0,6	[0,54 - 0,71]
Universitarios	24,7	16,3	1,0	
Trabajo actual (4 últimas semanas)				
Obrero o empleado de empresa o persona particular	36,5	36,8	0,4	[0,23 - 0,61]
Obrero o empleado del gobierno	9,7	4,9	0,8	[0,44 - 1,25]
Jornalero o peón	2,9	6,6	0,2	[0,09 - 0,32]
Empleado doméstico	2,3	4,1	0,2	[0,11 - 0,42]
Profesional independiente	1,5	2,3	0,3	[0,12 - 0,53]
Trabajador independiente o por cuenta propia	37,6	37,6	0,4	[0,24 - 0,62]
Patrón o empleador	2,2	0,8	1,0	
Trabajador de su propia finca o de finca en arriendo	2,1	3,6	0,2	[0,11 - 0,44]
Trabajador familiar sin remuneración	3,8	2,4	0,6	[0,33 - 1,08]
Ayudante sin remuneración	1,3	0,9	0,5	[0,25 - 1,16]
Grupo étnico				
Indígena	7,3	5,5	1,3	[1,11 - 1,61]
Gitano	0,1	0,1	1,0	[0,26 - 4,05]
Raizal del archipiélago	0,2	0,1	1,4	[0,44 - 4,17]
Negro, mulato (afro descendiente)	9,1	9,5	1,0	[0,82 - 1,15]
Ninguno de los anteriores	83,3	84,6	1,0	
Dificultad para comunicarse				
Sí	1,7	1,4	1,2	[0,84 - 1,80]
No	98,3	98,6	1,0	

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 5.6. Afiliación al sistema de salud según uso de los servicios de salud. Colombia, 2007.

Afiliación al Sistema de Salud	Problema o enfermedad de la boca o los dientes		Atención preventiva en salud bucal		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Seguro Social	65	5,5	179	9,3	244	7,9
Fuerzas Militares, Policía Nacional	18	1,6	51	2,7	70	2,2
ECOPETROL			10	0,5	10	0,3
Magisterio	22	1,9	50	2,6	72	2,3
EPS/ adaptada diferente ISS	409	34,6	725	37,6	1.133	36,5
ARS	419	35,5	630	32,6	1.049	33,7
Otra entidad	44	3,7	51	2,7	95	3,1
Desplazado/desmovilizado	3	0,3	7	0,4	11	0,4
Ninguna	193	16,3	203	10,5	395	12,7
No sabe	7	0,6	23	1,2	30	1,0
Total	1.180	100	1.929	100	3.109	100

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5.7. Distribución de frecuencias (%) y OR crudas (IC95%) de según acciones de atención preventiva. Colombia, 2007.

Variables	Atención preventiva							
	Flúor				Sellantes			
	Sí	No	OR	IC 95%	Sí	No	OR	IC 95%
Edad								
Menores de 10 años	4.866	4.384	1,0		3.680	5.570	1,0	
11 a 20	5.858	11.109	0,5	[0,45 - 0,50]	2.938	7.065	0,6	[0,59 - 0,66]
Total	10.724	15.493			6.618	12.635		
Nivel educativo								
Ninguno/primarios	297	1.439	1,4	[1,20 - 1,68]	93	822	0,5	[0,32 - 0,67]
Secundaria	502	1.633	1,3	[1,10 - 1,55]	50	206	1,0	
Universitarios	41	57	1,0					
Total	840	3.129			143	1.028		

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007



ASIS
Análisis de Situación en Salud



Libertad y Orden

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA
1803

Facultad Nacional de Salud Pública
"Héctor Abad Gómez"