

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA 2002-2007



ASIS
Análisis de Situación en Salud

ANEXO VI

ANÁLISIS DE DESIGUALDADES E INEQUIDADES EN SALUD EN COLOMBIA



Libertad y Orden

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002-2007

ANEXOS TOMO VI

ANÁLISIS DE DESIGUALDADES E INEQUIDADES EN SALUD EN COLOMBIA

TOMO VI


ANEXOS CAPÍTULO I:

LA INEQUIDAD EN SALUD: REFLEJO Y CONSECUENCIA DE LA INEQUIDAD SOCIAL

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1.1. Estructura de la distribución del ingreso por deciles, América Latina (14 países) alrededor del 2007.

GRÁFICOS



Fuente: CEPAL: Panorama Social de América Latina, 2008.

Gráfico 1.1. Estructura de la distribución del ingreso por deciles, América Latina (14 países) alrededor del 2007

TOMO VI

ANEXOS CAPÍTULO II:

ANÁLISIS DE DESIGUALDADES EN EL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

LISTA DE CUADROS

Cuadro 2.1. Modelo de regresión logística de los factores asociados con los estados de salud regular, malo y muy malo de la población de 12 y más años.

Cuadro 2.2. Modelo de regresión logística de los factores asociados con los estados de salud regular, malo y muy malo de la población de 12 y más años.

Cuadro 2.3. *Odds ratio* e intervalos de confianza obtenidos de un modelo logístico con el estado de salud de la población de 12 y más años como variable dependiente (para el nivel de respuesta de estado de salud regular, malo o muy malo) en función de los años de educación, el sexo los grupos de edad, el tipo de afiliación a la Seguridad Social en Salud y la zona.

CUADROS

Cuadro 2.1. Modelo de regresión logística de los factores asociados con los estados de salud regular, malo y muy malo de la población de 12 y más años.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Estrato socioeconómico				
Uno	0,44	<0,00101	1,55	[1,40-1,72]
Dos	0,26	<0,00101	1,30	[1,18-1,44]
Cinco y seis	-0,72	<0,0001	0,49	[0,36-0,65]
Sexo				
Mujer	0,22	<0,00101	1,24	[1,21-1,28]
Grupos de edad				
12 a 17	-0,45	<0,00101	0,64	[0,60-0,68]
18 a 24	-0,33	<0,00101	0,72	[0,67-0,78]
25 a 34	-0,13	0,0003	0,88	[0,82-0,94]
35 a 44	0,13	0,0002	1,14	[1,07-1,22]
45 a 54	0,40	<0,00101	1,49	[1,39-1,61]
55 a 69	0,80	<0,00101	2,23	[2,07-2,41]
Tipo afiliación				
No afiliado: vinculado	0,17	<0,00101	1,18	[1,12-1,26]
Subsidiado	0,25	<0,00101	1,28	[1,22-1,35]
Especial	-0,20	<0,00101	0,82	[0,74-0,90]
Zona				
Rural	0,11	<0,00101	1,11	[1,08-1,15]

1. **b:** Coeficiente de regresión

2. **Valor p:** Significación estadística

3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Cuadro 2.2. Modelo de regresión logística de los factores asociados con los estados de salud regular, malo y muy malo de la población de 12 y más años.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Años de educación				
Menos de 4	0,50	<0,00101	1,65	[1,54-1,77]
4-5	0,34	<0,00101	1,41	[1,32-1,50]
6-11	0,10	0,00006	1,10	[1,04-1,17]
12-14	-0,33	<0,00101	0,75	[0,65-0,80]
Sexo				
Mujer	0,22	<0,00101	1,25	[1,21-1,28]
Edad				
12 a 24	-0,37	<0,00101	0,69	[0,65-0,73]
25 a 44	0,07	0,0089	1,07	[1,02-1,13]
45 a 54	0,36	<0,00101	1,43	[1,34-1,53]
55 a 69	0,63	<0,00101	1,88	[1,75-2,02]
Tipo afiliación				
No afiliado: vinculado	0,09	0,0002	1,09	[1,04-1,14]
Subsidiado	0,16	<0,00101	1,17	[1,13-1,22]
Zona				
Rural	0,11	<0,00101	1,11	[1,08-1,15]

1. **b:** Coeficiente de regresión
2. **Valor p:** Significación estadística
3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística
4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Cuadro 2.3. *Odds ratio* e intervalos de confianza obtenidos de un modelo logístico con el estado de salud de la población de 12 y más años como variable dependiente (para el nivel de respuesta de estado de salud regular, malo o muy malo) en función de los años de educación, el sexo los grupos de edad, el tipo de afiliación a la Seguridad Social en Salud y la zona.

Factores asociados	OR ¹	IC _{95%} ²
Años de educación		
Menos de 4	3,03	[2,58-3,55]
4-5	2,59	[2,22-3,02]
6-11	2,04	[1,75-2,35]
12-14	1,33	[1,10-1,58]
Más de 14	1,00	
Sexo		
Mujer	1,55	[1,46-1,64]
Hombre	1,00	
Edad		
6 a 11	1,00	
12 a 24	1,38	[1,24-1,52]
25 a 44	2,15	[1,94-2,36]
45 a 54	2,86	[2,56-3,19]
55 a 69	3,76	[3,38-4,18]
Tipo de afiliación		
No afiliado: Vinculados	1,40	[1,29-1,51]
Reg. Subsidiado	1,51	[1,41-1,61]
Reg. Contributivo	1,00	
Zona		
Rural	1,24	[1,56-1,32]
Urbana	1,00	

1. OR: Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística

2. IC: Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

TOMO VI

ANEXOS CAPÍTULO III:

ANÁLISIS DE DESIGUALDADES EN LA DISCAPACIDAD PERCIBIDA

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 3.1. Prevalencia de la discapacidad percibida relativa a las actividades y participación de la población masculina por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007.

Gráfico 3.2. Prevalencia de la discapacidad percibida relativa a las actividades y participación de la población femenina por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007.

Gráfico 3.3. Prevalencia de la discapacidad física por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007.

Gráfico 3.4. Prevalencia de la discapacidad cognitiva por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007

Gráfico 3.5. Prevalencia de discapacidad física de la población de 12 a 69 años, con y sin accidentes de tránsito, por zona urbana y rural. Colombia, 2007.

Gráfico 3.6. Prevalencia de discapacidad percibida relativa a las actividades y participación, por intensidad y estrato socioeconómico - 2007

Gráfico 3.7. Prevalencia de discapacidad relativa a las actividades y participación, severa o extrema por grupos de edad y estratos socioeconómicos. Colombia, 2007.

Gráfico 3.8. Razón de prevalencias de discapacidad percibida entre los estratos socioeconómicos 1, y 5 y 6 de la población nacional de 35 a 69 años, por intensidad, según grupos de edad. Colombia, 2007.

Gráfico 3.9. Razón de prevalencias de discapacidad percibida entre los estratos socioeconómicos 1, y 5 y 6 de la población urbana de 35 a 69 años, por intensidad, según grupos de edad. Colombia, 2007.

Gráfico 3.10. Razón de prevalencias de discapacidad percibida entre la población nacional de 35 a 69 años, con menos de 4 años de educación y la que tiene 14 y más, por intensidad, según grupos de edad. Colombia, 2007.

Grafico 3.11. Razón de prevalencias de discapacidad percibida entre la población urbana de 35 a 69 años, con menos de 4 años de educación y la que tiene 14 y más, por intensidad, según grupos de edad. Colombia, 2007.

Grafico 3.12. Razón de prevalencias de discapacidad percibida entre la población rural de 35 a 69 años, con menos de 4 años de educación y la que tiene 14 y más, por intensidad, según grupos de edad. Colombia, 2007.

LISTA DE CUADROS

Cuadro 3.1. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación, de la población de 12 a 69 años, por zona y sexo, según grupos de edad. Colombia 2007.

Cuadro 3.2. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por tipo e intensidad de la misma, según grupos de edad. Colombia 2007.

Cuadro 3.3. Discapacidad física percibida relativa a las actividades y la participación, de la población de 12 a 69 años, por intensidad y zona, según ocurrencia de diabetes y accidente de tránsito. Colombia 2007¹.

Cuadro 3.4. Discapacidad física percibida de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según desplazamiento por amenaza contra la vida desde 2003. Colombia 2007.

Cuadro 3.5. Discapacidad física percibida de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según habitación en zonas de riesgo. Colombia 2007.

Cuadro 3.6. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según estratos socioeconómicos, total nacional. Colombia 2007.

Cuadro 3.7. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según estratos socioeconómicos, zona urbana (cabeceras municipales). Colombia 2007.

Cuadro 3.8. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según estratos socioeconómicos, zona rural (resto de municipios). Colombia 2007.

Cuadro 3.9. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según años de educación, total nacional. Colombia 2007.

Cuadro 3.10. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según años de educación, zona urbana (cabeceras municipales). Colombia 2007.

Cuadro 3.11. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según años de educación, zona rural (resto de los municipios). Colombia 2007.

Cuadro 3.12. Factores asociados a la discapacidad severa o extrema sentida de la población de 12 y más años, en función de sexo, edad, zona, años de educación, y diabetes.

Cuadro 3.13. OR's e intervalos de confianza obtenidos de un modelo logístico con la discapacidad severa o extrema como variable dependiente (para el nivel de respuesta de presencia de discapacidad) en función de años de educación, sexo, edad, diabetes y zona.

Cuadro 3.14. Factores asociados a la discapacidad percibida de la población de 12 y más años en función de sexo, edad, años de educación y accidentes de tránsito.


Cuadro 3.15. Capacidad auditiva percibida de la población de 12 a 69 años, por grupo de edad y sexo. Colombia, 2007.

Cuadro 3.16. Población por capacidad auditiva percibida de la población de 12 a 69 años, por estrato socioeconómico, zona, sexo y grupos de edad. Colombia, 2007.

Cuadro 3.17. Capacidad visual percibida y ceguera de la población de 12 a 69 años, por grupo de edad y sexo. Colombia, 2007.

Cuadro 3.18. Población por capacidad visual percibida y ceguera de la población de 12 a 69 años, por estrato socioeconómico, zona, sexo y grupos de edad. Colombia, 2007.


GRÁFICOS



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.


Gráfico 3.1. Prevalencia de la discapacidad percibida relativa a las actividades y participación de la población masculina por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.


Gráfico 3.2. Prevalencia de la discapacidad percibida relativa a las actividades y participación de la población femenina por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007.



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.


Gráfico 3.3. Prevalencia de la discapacidad física por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.


Gráfico 3.4.Prevalencia de la discapacidad cognitiva por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.


Gráfico 3.5.Prevalencia de discapacidad física de la población de 12 a 69 años, con y sin accidentes de tránsito, por zona urbana y rural. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.


Grafico 3.6.Prevalencia de discapacidad percibida relativa a las actividades y participación, por intensidad y estrato socioeconómico - 2007



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.


Gráfico 3.7.Prevalencia de discapacidad relativa a las actividades y participación, severa o extrema por grupos de edad y estratos socioeconómicos. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Grafico 3.8. Razón de prevalencias de discapacidad percibida entre los estratos socioeconómicos 1, y 5 y 6 de la población nacional de 35 a 69 años, por intensidad, según grupos de edad. Colombia, 2007.




Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Gráfico 3.9. Razón de prevalencias de discapacidad percibida entre los estratos socioeconómicos 1, y 5 y 6 de la población urbana de 35 a 69 años, por intensidad, según grupos de edad. Colombia, 2007.




Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Grafico 3.10. Razón de prevalencias de discapacidad percibida entre la población nacional de 35 a 69 años, con menos de 4 años de educación y la que tiene 14 y más, por intensidad, según grupos de edad. Colombia, 2007.



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Grafico 3.11. Razón de prevalencias de discapacidad percibida entre la población urbana de 35 a 69 años, con menos de 4 años de educación y la que tiene 14 y más, por intensidad, según grupos de edad. Colombia, 2007.



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Grafico 3.12. Razón de prevalencias de discapacidad percibida entre la población rural de 35 a 69 años, con menos de 4 años de educación y la que tiene 14 y más, por intensidad, según grupos de edad. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

CUADROS

Cuadro 3.1. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación, de la población de 12 a 69 años, por zona y sexo, según grupos de edad. Colombia 2007.

Discapacidad, edad, zona		Total		Grupo de edad											
				12 a 17 años		18 a 24 años		25 a 34 años		35 a 44 años		45 a 54 años		55 a 69 años	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
TOTAL		31.543.837	100,0	5.360.422	100,0	5.302.009	100,0	6.224.274	100,0	5.660.095	100,0	4.742.538	100,0	4.254.499	100,0
Discapacidad															
Discapacidad severa o extrema		2.143.807	6,8	232.204	4,3	267.604	5,0	345.934	5,6	403.560	7,1	411.525	8,7	482.979	11,4
Discapacidad moderada		2.903.630	9,2	285.650	5,3	394.867	7,4	514.142	8,3	504.468	8,9	539.475	11,4	665.028	15,6
Sin discapacidad		26.496.400	84,0	4.842.567	90,3	4.639.539	87,5	5.364.198	86,2	4.752.067	84,0	3.791.538	79,9	3.106.491	73,0
Zona															
Cabecera	Discapacidad														
	Discapacidad severa o extrema	1.712.238	7,0	182.907	4,6	225.998	5,4	278.812	5,6	318.269	7,2	332.722	8,8	373.530	11,3
	Discapacidad moderada	2.159.150	8,8	216.927	5,5	299.598	7,1	404.049	8,2	344.520	7,8	406.377	10,8	487.679	14,8
Sin discapacidad		20.720.316	84,3	3.563.942	89,9	3.674.689	87,5	4.263.697	86,2	3.754.178	85,0	3.029.414	80,4	2.434.395	73,9
Resto	Discapacidad severa o extrema	431.569	6,2	49.298	3,5	41.606	3,8	67.123	5,3	85.291	6,9	78.803	8,1	109.449	11,4
	Discapacidad moderada	744.480	10,7	68.724	4,9	95.269	8,6	110.094	8,6	159.947	12,9	133.098	13,7	177.349	18,5
	Sin discapacidad	5.776.084	83,1	1.278.625	91,5	964.849	87,6	1.100.501	86,1	997.889	80,3	762.124	78,2	672.096	70,1
Sexo															
Hombre	Discapacidad														
	Discapacidad severa o extrema	892.466	6,0	109.458	4,1	109.706	4,3	152.546	5,2	157.930	6,5	159.729	7,1	203.096	10,3
	Discapacidad moderada	1.034.756	7,0	133.647	5,0	161.801	6,4	183.521	6,3	151.752	6,2	191.331	8,6	212.704	10,8

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Discapacidad, edad, zona		Total		Grupo de edad											
				12 a 17 años		18 a 24 años		25 a 34 años		35 a 44 años		45 a 54 años		55 a 69 años	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Mujer	Sin discapacidad	12.889.471	87,0	2.455.798	91,0	2.260.665	89,3	2.594.233	88,5	2.136.048	87,3	1.885.765	84,3	1.556.962	78,9
	Discapacidad severa o extrema	1.251.341	7,5	122.746	4,6	157.898	5,7	193.388	5,9	245.630	7,6	251.796	10,0	279.884	12,3
	Discapacidad moderada	1.868.874	11,2	152.003	5,7	233.066	8,4	330.622	10,0	352.716	11,0	348.144	13,9	452.324	19,8
	Sin discapacidad	13.606.929	81,3	2.386.769	89,7	2.378.874	85,9	2.769.964	84,1	2.616.020	81,4	1.905.774	76,1	1.549.529	67,9

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 3.2. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por tipo e intensidad de la misma, según grupos de edad. Colombia 2007.

Tipo e intensidad de la discapacidad	TOTAL		Grupo de edad											
			12-17		18-24		25-34		35-44		45-54		55-69	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
TOTAL	31.543.837	100,0	5.360.422	100,0	5.302.009	100,0	6.224.274	100,0	5.660.095	100,0	4.742.538	100,0	4.254.499	100,0
Discapacidad														
Discapacidad severa o extrema	2.143.807	6,8	232.204	4,3	267.604	5,0	345.934	5,6	403.560	7,1	411.525	8,7	482.979	11,4
Discapacidad moderada	2.903.630	9,2	285.650	5,3	394.867	7,4	514.142	8,3	504.468	8,9	539.475	11,4	665.028	15,6
Sin discapacidad	26.496.400	84,0	4.842.567	90,3	4.639.539	87,5	5.364.198	86,2	4.752.067	84,0	3.791.538	79,9	3.106.491	73,0
Discapacidad física														
Discapacidad severa o extrema	1.464.339	4,6	122.466	2,3	143.219	2,7	229.566	3,7	273.474	4,8	314.043	6,6	381.571	9,0
Discapacidad moderada	166.439	0,5	14.594	0,3	14.289	0,3	40.650	0,7	40.418	0,7	25.527	0,5	30.961	0,7
Sin discapacidad	29.913.059	94,8	5.223.362	97,4	5.144.501	97,0	5.954.058	95,7	5.346.203	94,5	4.402.968	92,8	3.841.967	90,3
Discapacidad cognitiva														
Discapacidad severa o extrema	881.642	2,8	114.069	2,1	103.858	2,0	151.904	2,4	159.817	2,8	176.522	3,7	175.472	4,1
Discapacidad moderada	758.516	2,4	71.833	1,3	89.804	1,7	124.629	2,0	128.558	2,3	135.663	2,9	208.030	4,9
Sin discapacidad	29.903.679	94,8	5.174.520	96,5	5.108.347	96,3	5.947.741	95,6	5.371.720	94,9	4.430.353	93,4	3.870.997	91,0
Discapacidad para relacionarse socialmente														
Discapacidad severa o extrema	505.072	1,6	76.096	1,4	73.153	1,4	83.726	1,3	88.520	1,6	97.577	2,1	86.001	2,0
Discapacidad moderada	132.085	0,4	11.719	0,2	13.813	0,3	25.352	0,4	21.512	0,4	27.378	0,6	32.311	0,8
Sin discapacidad	30.906.680	98,0	5.272.607	98,4	5.215.044	98,4	6.115.197	98,2	5.550.062	98,1	4.617.583	97,4	4.136.187	97,2

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 3.3. Discapacidad física percibida relativa a las actividades y la participación, de la población de 12 a 69 años, por intensidad y zona, según ocurrencia de diabetes y accidente de tránsito. Colombia 2007 ¹.

Discapacidad física por intensidad y zona	TOTAL		Diabetes						Accidente de tránsito			
			Con diabetes		Con diabetes, menor 40 años		Sin diabetes		Si		No	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
TOTAL	31.543.837	100,0	691.723	100,0	280.467	100,0	30.506.238	100,0	4.129.781	100,0	25.526.036	100,0
Discapacidad física												
Discapacidad severa o extrema	1.464.339	4,6	92.613	13,4	24.646	8,8	1.345.761	4,4	277.548	6,7	1.091.680	4,3
Discapacidad moderada	166.439	0,5	9.758	1,4	3.706	1,3	151.874	0,5	22.010	0,5	131.592	0,5
Sin discapacidad	29.913.059	94,8	589.352	85,2	252.115	89,9	29.008.602	95,1	3.830.223	92,7	24.302.763	95,2
CABECERA	24.591.704	100,0	567.987	100,0	236.832	100,0	23.732.997	100,0	3.412.290	100,0	19.599.513	100,0
Discapacidad física												
Discapacidad severa o extrema	1.187.616	4,8	74.916	13,2	21.714	9,2	1.090.274	4,6	241.701	7,1	862.681	4,4
Discapacidad moderada	134.935	0,5	8.274	1,5	3.508	1,5	122.052	0,5	16.206	0,5	109.793	0,6
Sin discapacidad	23.269.153	94,6	484.797	85,4	211.610	89,4	22.520.671	94,9	3.154.383	92,4	18.627.039	95,0
RESTO	6.952.134	100,0	123.736	100,0	43.634	100,0	6.773.240	100,0	717.491	100,0	5.926.524	100,0
Discapacidad severa o extrema	276.724	4,0	17.697	14,3	2.932	6,7	255.487	3,8	35.847	5,0	229.000	3,9
Discapacidad moderada	31.503	0,5	1.484	1,2	197	0,5	29.822	0,4	5.804	0,8	21.800	0,4
Sin discapacidad	6.643.907	95,6	104.555	84,5	40.505	92,8	6.487.931	95,8	675.840	94,2	5.675.724	95,8
45 a 54 años												

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Discapacidad física por intensidad y zona	TOTAL		Diabetes				Accidente de tránsito					
			Con diabetes		Con diabetes, menor 40 años		Sin diabetes		Si		No	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Discapacidad severa o extrema	314.043	6,6	25.001	11,3	607	-	288.434	6,4	79.727	9,8	221.221	5,9
Discapacidad moderada	25.527	0,5	4.122	1,9	-	-	21.405	0,5	3.480	0,4	19.909	0,5
Sin discapacidad	4.402.968	92,8	192.302	86,8	4.988	-	4.205.653	93,1	730.750	89,8	3.504.434	93,6
<i>55 a 69 años</i>												
Discapacidad severa o extrema	381.571	9,0	62.851	16,0	-	-	318.720	8,3	77.878	11,2	295.188	8,6
Discapacidad moderada	30.961	0,7	4.532	1,2	-	-	26.429	0,7	4.168	0,6	26.008	0,8
Sin discapacidad	3.841.967	90,3	325.521	82,9	891	-	3.515.556	91,1	616.410	88,3	3.120.412	90,7
<i>45 a 69 años</i>												
Discapacidad severa o extrema	695.614	7,7	87.852	14,3	607	-	607.154	7,2	157.605	10,4	516.409	7,2
Discapacidad moderada	56.488	0,6	8.654	1,4	0	-	47.834	0,6	7.648	0,5	45.917	0,6
Sin discapacidad	8.244.935	91,6	517.823	84,3	5.879	-	7.721.209	92,2	1.347.160	89,1	6.624.846	92,2

1. Las categorías de las columnas no cubren toda la población.

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 3.4. Discapacidad física percibida de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según desplazamiento por amenaza contra la vida desde 2003. Colombia 2007.

Discapacidad física y grupos de edad		Desplazamiento por amenaza a la vida, desde 2003									
		TOTAL		Sin desplazamiento desde 2003		Si desplazamiento por amenaza		No desplazamiento por amenaza		No responde desplazamiento por amenaza	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
TOTAL		31.543.837	100,0	22.347.644	100,0	516.235	100,0	8.674.770	100,0	5.188	100,0
Discapacidad física		1.464.339	4,6	1.066.591	4,8	44.900	8,7	352.848	4,1	-	-
Discapacidad severa o extrema											
Discapacidad moderada		166.439	0,5	103.052	0,5	6.994	1,4	56.392	0,7	-	-
Sin discapacidad		29.913.059	94,8	21.178.001	94,8	464.341	89,9	8.265.530	95,3	5.188	100,0
<i>Grupos de edad</i>											
12 a 17años	Discapacidad física										
	Discapacidad severa o extrema	122.466	2,3	83.752	2,2	5.768	4,8	32.947	2,4	-	-
	Discapacidad moderada	14.594	0,3	8.699	0,2	624	0,5	5.271	0,4	-	-
	Sin discapacidad	5.223.362	97,4	3.753.257	97,6	113.769	94,7	1.355.822	97,3	514	100,0
18 a 24años	Discapacidad severa o extrema	143.219	2,7	89.512	2,7	5.509	5,2	48.198	2,6	-	-
	Discapacidad moderada	14.289	0,3	5.660	0,2	1.147	1,1	7.482	0,4	-	-
	Sin discapacidad	5.144.501	97,0	3.270.928	97,2	98.529	93,7	1.773.640	97,0	1.404	100,0
25 a 34años	Discapacidad severa o extrema	229.566	3,7	149.469	4,0	10.140	8,6	69.958	2,9	-	-
	Discapacidad moderada	40.650	0,7	15.499	0,4	106	0,1	25.044	1,0	-	-
	Sin discapacidad	5.954.058	95,7	3.528.033	95,5	107.036	91,3	2.317.434	96,1	1.555	100,0
35 a 44años	Discapacidad severa o extrema	273.474	4,8	193.476	4,8	11.379	11,9	68.620	4,5	-	-
	Discapacidad moderada	40.418	0,7	32.538	0,8	443	0,5	7.437	0,5	-	-
	Sin discapacidad	5.346.203	94,5	3.823.649	94,4	83.695	87,6	1.438.737	95,0	122	100,0

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Discapacidad física y grupos de edad		Desplazamiento por amenaza a la vida, desde 2003									
		TOTAL		Sin desplazamiento desde 2003		Si desplazamiento por amenaza		No desplazamiento por amenaza		No responde desplazamiento por amenaza	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
45 a 54años	Discapacidad severa o extrema	314.043	6,6	231.922	6,2	8.289	16,7	73.832	7,8	-	-
	Discapacidad moderada	25.527	0,5	18.250	0,5	1.020	2,1	6.256	0,7	-	-
	Sin discapacidad	4.402.968	92,8	3.497.599	93,3	40.324	81,2	863.642	91,5	1.403	100,0
55 a 69años	Discapacidad severa o extrema	381.571	9,0	318.462	8,7	3.816	13,4	59.293	10,2	-	-
	Discapacidad moderada	30.961	0,7	22.406	0,6	3.653	12,8	4.902	0,8	-	-
	Sin discapacidad	3.841.967	90,3	3.304.534	90,6	20.989	73,8	516.254	88,9	190	100,0
Sexo		Discapacidad física									
Hombre	Discapacidad severa o extrema	603.469	4,1	464.166	4,4	15.770	6,7	123.533	3,0	-	-
	Discapacidad moderada	73.602	0,5	38.839	0,4	5.168	2,2	29.595	0,7	-	-
	Sin discapacidad	14.139.622	95,4	10.001.798	95,2	214.918	91,1	3.920.556	96,2	2.350	100,0
Mujer	Discapacidad severa o extrema	860.870	5,1	602.425	5,1	29.130	10,4	229.315	5,0	-	-
	Discapacidad moderada	92.837	0,6	64.214	0,5	1.826	0,7	26.797	0,6	-	-
	Sin discapacidad	15.773.437	94,3	11.176.202	94,4	249.423	89,0	4.344.974	94,4	2.838	100,0

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 3.5. Discapacidad física percibida de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según habitación en zonas de riesgo. Colombia 2007.

Discapacidad física, edad, zona		Vive en zona de riesgo									
		TOTAL		Vive en zona de riesgo		No vive en zona de riesgo		No sabe si vive en zona de riesgo		No informa si vive en zona de riesgo	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
TOTAL		31.543.837	100,0	5.996.167	100,0	23.662.135	100,0	119.045	100,0	1.766.490	100,0
Discapacidad física											
Discapacidad severa o extrema		1.464.339	4,6	354.398	5,9	1.038.237	4,4	7.874	6,6	63.831	3,6
Discapacidad moderada		166.439	0,5	32.206	0,5	123.521	0,5	-	-	10.712	0,6
Sin discapacidad		29.913.059	94,8	5.609.563	93,6	22.500.378	95,1	111.171	93,4	1.691.947	95,8
<i>Grupo de edad</i>											
12 a 17 años	Discapacidad física										
	Discapacidad severa o extrema	122.466	2,3	34.754	3,0	82.662	2,1	4	0,0	5.046	2,0
	Discapacidad moderada	14.594	0,3	3.904	0,3	9.279	0,2	-	-	1.411	0,5
	Sin discapacidad	5.223.362	97,4	1.131.794	96,7	3.822.321	97,7	17.174	100,0	252.072	97,5
18 a 24 años	Discapacidad severa o extrema	143.219	2,7	46.788	4,7	89.672	2,3	-	-	6.759	1,8
	Discapacidad moderada	14.289	0,3	1.590	0,2	12.699	0,3	-	-	-	-
	Sin discapacidad	5.144.501	97,0	943.056	95,1	3.806.310	97,4	19.564	100,0	375.571	98,2
25 a 34 años	Discapacidad severa o extrema	229.566	3,7	54.785	4,9	155.564	3,4	2.437	8,9	16.781	3,4
	Discapacidad moderada	40.650	0,7	4.775	0,4	32.040	0,7	-	-	3.835	0,8
	Sin discapacidad	5.954.058	95,7	1.057.268	94,7	4.396.208	95,9	24.838	91,1	475.745	95,8
35 a 44 años	Discapacidad severa o extrema	273.474	4,8	62.277	5,9	196.428	4,6	1.742	8,0	13.027	4,7
	Discapacidad moderada	40.418	0,7	7.271	0,7	32.866	0,8	-	-	280	0,1

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Discapacidad física, edad, zona		Vive en zona de riesgo									
		TOTAL		Vive en zona de riesgo		No vive en zona de riesgo		No sabe si vive en zona de riesgo		No informa si vive en zona de riesgo	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
45 a 54 años	Sin discapacidad	5.346.203	94,5	981.548	93,4	4.081.216	94,7	20.000	92,0	263.438	95,2
	Discapacidad severa o extrema	314.043	6,6	77.825	8,8	226.377	6,3	2.757	15,3	7.085	3,2
	Discapacidad moderada	25.527	0,5	3.560	0,4	18.670	0,5	-	-	3.297	1,5
55 a 69 años	Sin discapacidad	4.402.968	92,8	802.591	90,8	3.373.737	93,2	15.215	84,7	211.425	95,3
	Discapacidad severa o extrema	381.571	9,0	77.969	10,0	287.534	8,6	935	6,1	15.133	11,6
	Discapacidad moderada	30.961	0,7	11.106	1,4	17.967	0,5	-	-	1.888	1,4
	Sin discapacidad	3.841.967	90,3	693.305	88,6	3.020.586	90,8	14.380	93,9	113.696	87,0

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 3.6. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según estratos socioeconómicos, total nacional. Colombia 2007.

Discapacidad, edad, zona		TOTAL		Estrato									
				Sin estrato, S.I.		Uno		Dos		Tres y cuatro		Cinco y seis	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
TOTAL		31.543.837	100,0	2.866.127	100,0	7.483.832	100,0	11.896.919	100,0	8.773.233	100,0	523.727	100,0
Discapacidad													
Discapacidad severa o extrema		2.143.807	6,8	162.377	5,7	533.833	7,1	840.503	7,1	586.755	6,7	20.339	3,9
Discapacidad leve o moderada		2.903.630	9,2	249.404	8,7	725.895	9,7	1.145.001	9,6	748.591	8,5	34.740	6,6
Sin discapacidad		26.496.400	84,0	2.454.346	85,6	6.224.104	83,2	9.911.415	83,3	7.437.887	84,8	468.648	89,5
<i>Grupo de edad</i>													
12 a 17 años	Discapacidad												
	Discapacidad severa o extrema	232.204	4,3	23.424	4,4	68.757	4,5	86.477	4,3	52.377	4,2	1.170	2,2
	Discapacidad leve o moderada	285.650	5,3	29.295	5,6	78.474	5,1	110.192	5,5	63.612	5,1	4.078	7,8
Sin discapacidad		4.842.567	90,3	475.111	90,0	1.379.469	90,4	1.798.885	90,1	1.141.848	90,8	47.254	90,0
18 a 24 años	Discapacidad severa o extrema	267.604	5,0	26.455	4,8	68.261	5,3	100.985	5,1	71.259	5,1	644	1,2
	Discapacidad leve o moderada	394.867	7,4	38.095	6,9	97.739	7,6	154.821	7,8	100.446	7,2	3.766	6,7
Sin discapacidad		4.639.539	87,5	486.771	88,3	1.128.368	87,2	1.741.882	87,2	1.231.135	87,8	51.382	92,1
25 a 34 años	Discapacidad severa o extrema	345.934	5,6	40.574	5,7	84.793	5,8	122.233	5,1	95.632	6,1	2.703	3,1
	Discapacidad leve o moderada	514.142	8,3	57.514	8,0	132.306	9,0	195.931	8,2	128.391	8,2	-	-
Sin discapacidad		5.364.198	86,2	617.153	86,3	1.252.524	85,2	2.068.761	86,7	1.341.348	85,7	84.411	96,9

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Discapacidad, edad, zona		TOTAL		Estrato									
				Sin estrato, S.I.		Uno		Dos		Tres y cuatro		Cinco y seis	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
35 a 44 años	Discapacidad severa o extrema	403.560	7,1	23.363	5,1	109.247	8,3	163.141	7,6	106.752	6,4	1.056	1,2
	Discapacidad leve o moderada	504.468	8,9	39.982	8,7	133.250	10,2	189.353	8,8	137.720	8,3	4.163	4,9
	Sin discapacidad	4.752.067	84,0	397.143	86,2	1.066.577	81,5	1.793.499	83,6	1.414.721	85,3	80.127	93,9
45 a 54 años	Discapacidad severa o extrema	411.525	8,7	20.579	6,0	90.326	9,3	169.465	9,3	127.733	8,5	3.423	3,3
	Discapacidad leve o moderada	539.475	11,4	39.095	11,4	124.942	12,8	223.708	12,3	148.102	9,9	3.628	3,5
	Sin discapacidad	3.791.538	79,9	282.676	82,6	759.939	77,9	1.429.517	78,4	1.223.697	81,6	95.709	93,1
55 a 69 años	Discapacidad severa o extrema	482.979	11,4	27.983	10,4	112.449	12,4	198.201	12,8	133.003	9,6	11.343	8,1
	Discapacidad leve o moderada	665.028	15,6	45.423	16,9	159.184	17,5	270.995	17,5	170.320	12,3	19.106	13,6
	Sin discapacidad	3.106.491	73,0	195.492	72,7	637.226	70,1	1.078.871	69,7	1.085.137	78,2	109.765	78,3

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 3.7. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según estratos socioeconómicos, zona urbana (cabeceras municipales). Colombia 2007.

Intensidad de discapacidad y grupo de edad		TOTAL		Estrato										Razón de tasa ¹
				Sin estrato, S.I.		Uno		Dos		Tres y cuatro		Cinco y seis		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
TOTAL URBANO		24.591.704	100,0	1.720.762	100,0	4.195.982	100,0	9.620.360	100,0	8.577.570	100,0	477.031	100,0	-
Discapacidad														
Discapacidad severa o extrema		1.712.238	7,0	107.573	6,3	308.814	7,4	701.981	7,3	578.129	6,7	15.742	3,3	2,2
Discapacidad moderada		2.159.150	8,8	140.428	8,2	392.434	9,4	860.243	8,9	731.306	8,5	34.740	7,3	1,3
Sin discapacidad		20.720.316	84,3	1.472.761	85,6	3.494.734	83,3	8.058.136	83,8	7.268.135	84,7	426.549	89,4	-
Grupos de edad														
12 a 17 años	Discapacidad													
	Discapacidad severa o extrema	182.907	4,6	15.633	5,9	38.452	4,6	75.595	4,8	52.056	4,3	1.170	2,4	1,9
	Discapacidad moderada	216.927	5,5	17.533	6,6	44.566	5,3	88.003	5,6	62.747	5,1	4.078	8,3	0,6
Sin discapacidad		3.563.942	89,9	231.805	87,5	760.444	90,2	1.419.585	89,7	1.108.194	90,6	43.914	89,3	-
18 a 24 años	Discapacidad													
	Discapacidad severa o extrema	225.998	5,4	16.315	4,5	48.155	6,4	90.391	5,4	71.137	5,2	-	-	-
	Discapacidad moderada	299.598	7,1	24.761	6,9	57.668	7,7	117.407	7,0	95.997	7,0	3.766	7,7	1,0
Sin discapacidad		3.674.689	87,5	317.635	88,5	641.291	85,8	1.464.702	87,6	1.205.689	87,8	45.373	92,3	-
25 a 34 años	Discapacidad													
	Discapacidad severa o extrema	278.812	5,6	22.888	5,0	52.545	5,8	106.288	5,4	95.100	6,2	1.991	2,7	2,1

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Intensidad de discapacidad y grupo de edad		TOTAL		Estrato										Razón de tasa ¹
				Sin estrato, S.I.		Uno		Dos		Tres y cuatro		Cinco y seis		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
	Discapacidad moderada	404.049	8,2	36.355	8,0	80.113	8,9	159.951	8,1	127.629	8,4	-	-	-
	Sin discapacidad	4.263.697	86,2	396.861	87,0	770.947	85,3	1.720.391	86,6	1.302.641	85,4	72.857	97,3	-
35 a 44 años	Discapacidad severa o extrema	318.269	7,2	17.885	6,5	60.497	8,5	137.984	8,0	101.387	6,2	516	0,7	12,1
	Discapacidad moderada	344.520	7,8	17.451	6,3	63.319	8,9	126.363	7,3	133.224	8,2	4.163	5,5	1,6
	Sin discapacidad	3.754.178	85,0	241.536	87,2	587.650	82,6	1.465.638	84,7	1.388.642	85,5	70.713	93,8	-
45 a 54 años	Discapacidad severa o extrema	332.722	8,8	14.822	6,5	52.561	10,1	135.458	9,3	127.733	8,7	2.148	2,2	4,6
	Discapacidad moderada	406.377	10,8	23.850	10,5	67.213	13,0	167.930	11,6	143.756	9,7	3.628	3,7	3,5
	Sin discapacidad	3.029.414	80,4	187.735	82,9	399.177	76,9	1.147.043	79,1	1.203.521	81,6	91.937	94,1	-
55 a 69 años	Discapacidad severa o extrema	373.530	11,3	20.030	14,5	56.603	12,0	156.265	13,0	130.715	9,6	9.917	7,6	1,6
	Discapacidad moderada	487.679	14,8	20.478	14,9	79.555	16,9	200.587	16,7	167.953	12,4	19.106	14,6	1,2
	Sin discapacidad	2.434.395	73,9	97.189	70,6	335.225	71,1	840.778	70,2	1.059.448	78,0	101.755	77,8	-

1. Incidencia estrato 1 / incidencia estratos 5 y 6.

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 3.8. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según estratos socioeconómicos, zona rural (resto de municipios). Colombia 2007.

Intensidad de discapacidad y grupo de edad		Estrato												Razón de tasa ¹
		TOTAL		Sin estrato, S.I.		Uno		Dos		Tres y cuatro		Cinco y seis		
No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
TOTAL RURAL		6.952.133	100,0	1.145.365	100,0	3.287.850	100,0	2.276.559	100,0	195.663	100,0	46.697	100,0	
Discapacidad														
Discapacidad severa o extrema		431.569	6,2	54.804	4,8	225.019	6,8	138.522	6,1	8.626	4,4	4.598	9,8	1,5
Discapacidad moderada		744.480	10,7	108.976	9,5	333.461	10,1	284.758	12,5	17.285	8,8			1,1
Sin discapacidad		5.776.084	83,1	981.585	85,7	2.729.370	83,0	1.853.279	81,4	169.752	86,8	42.099	90,2	-
Grupo de edad														
12 a 17 años	Discapacidad													
	Discapacidad severa o extrema	49.298	3,5	7.791	3,0	30.304	4,4	10.882	2,6	320	0,9	-	-	1,1
	Discapacidad moderada	68.724	4,9	11.762	4,5	33.908	5,0	22.189	5,4	865	2,5	-	-	2,0
Sin discapacidad		1.278.625	91,5	243.306	92,6	619.026	90,6	379.300	92,0	33.654	96,6	3.340	100,0	-
18 a 24 años	Discapacidad													
	Discapacidad severa o extrema	41.606	3,8	10.140	5,3	20.106	3,7	10.594	3,3	121	0,4	644	9,7	9,3
	Discapacidad moderada	95.269	8,6	13.334	6,9	40.071	7,3	37.414	11,5	4.449	14,8	-	-	0,5
Sin discapacidad		964.849	87,6	169.137	87,8	487.077	89,0	277.180	85,2	25.446	84,8	6.009	90,3	-
25 a 34 años	Discapacidad													
	Discapacidad severa o extrema	67.123	5,3	17.686	6,8	32.248	5,7	15.946	4,0	532	1,3	712	5,8	4,4

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Intensidad de discapacidad y grupo de edad		Estrato												Razón de tasa¹
		TOTAL		Sin estrato, S.I.		Uno		Dos		Tres y cuatro		Cinco y seis		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
35 a 44 años	Discapacidad moderada	110.094	8,6	21.159	8,2	52.193	9,2	35.980	9,0	762	1,9	-	-	4,8
	Sin discapacidad	1.100.501	86,1	220.293	85,0	481.576	85,1	348.370	87,0	38.707	96,8	11.555	94,2	-
	Discapacidad severa o extrema	85.291	6,9	5.478	3,0	48.750	8,2	25.157	6,0	5.365	14,9	540	5,4	0,6
	Discapacidad moderada	159.947	12,9	22.531	12,3	69.931	11,7	62.990	15,1	4.495	12,5	-	-	0,9
	Sin discapacidad	997.889	80,3	155.607	84,7	478.927	80,1	327.862	78,8	26.080	72,6	9.414	94,6	-
45 a 54 años	Discapacidad severa o extrema	78.803	8,1	5.756	5,0	37.765	8,3	34.007	9,1	-	-	1.274	25,3	-
	Discapacidad moderada	133.098	13,7	15.245	13,1	57.729	12,7	55.778	15,0	4.346	17,7	-	-	0,7
	Sin discapacidad	762.124	78,2	94.941	81,9	360.762	79,1	282.474	75,9	20.176	82,3	3.771	74,7	-
55 a 69 años	Discapacidad severa o extrema	109.449	11,4	7.953	6,1	55.846	12,8	41.936	12,0	2.288	7,5	1.427	15,1	1,7
	Discapacidad moderada	177.349	18,5	24.945	19,0	79.629	18,2	70.408	20,1	2.368	7,8	-	-	2,3
	Sin discapacidad	672.096	70,1	98.302	74,9	302.001	69,0	238.093	67,9	25.689	84,7	8.010	84,9	-

1. Incidencia estrato 1 / incidencia estratos 3 y 4.

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro3.9. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según años de educación, total nacional. Colombia 2007.

Discapacidad y grupos de edad		TOTAL		Años de educación												Razón de tasa ¹
				Menos de 4 años		4-5 años		6-10 años		11 años		12-14 años		Más de 14 años		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
TOTAL		31.543.837	100,0	5.228.581	100,0	6.228.055	100,0	9.018.171	100,0	6.006.480	100,0	2.813.934	100,0	2.248.615	100,0	
Discapacidad																
Discapacidad severa o extrema		2.143.807	6,8	683.090	13,1	424.262	6,8	523.275	5,8	287.109	4,8	140.141	5,0	85.930	3,8	3,4
Discapacidad moderada		2.903.630	9,2	690.313	13,2	603.929	9,7	707.981	7,9	481.776	8,0	262.443	9,3	157.189	7,0	1,9
Sin discapacidad		26.496.400	84,0	3.855.178	73,7	5.199.864	83,5	7.786.914	86,3	5.237.596	87,2	2.411.351	85,7	2.005.496	89,2	-
Grupo de edad	Discapacidad															
12 a 17 años	Discapacidad severa o extrema	232.204	4,3	49.683	12,5	45.007	3,9	130.751	3,6	5.954	2,9	810	4,5	-	-	-
	Discapacidad moderada	285.650	5,3	23.912	6,0	58.347	5,1	190.161	5,3	11.970	5,8	1.136	6,3	125	4,9	1,1
	Sin discapacidad	4.842.567	90,3	324.339	81,5	1.037.734	90,9	3.272.372	91,1	189.720	91,4	15.966	89,1	2.436	95,1	-
18 a 24 años	Discapacidad severa o extrema	267.604	5,0	39.912	12,5	30.390	4,9	87.137	5,7	60.313	3,5	40.763	4,6	9.088	4,1	3,0
	Discapacidad moderada	394.867	7,4	20.132	6,3	53.991	8,7	113.983	7,5	107.113	6,2	77.370	8,7	22.278	10,1	0,6
	Sin discapacidad	4.639.539	87,5	259.910	81,2	533.047	86,3	1.322.232	86,8	1.565.468	90,3	769.892	86,7	188.989	85,8	-
25 a 34 años	Discapacidad severa o extrema	345.934	5,6	94.875	15,6	39.635	3,9	73.534	6,0	75.372	4,3	37.389	4,1	25.128	3,5	4,5
	Discapacidad moderada	514.142	8,3	50.917	8,4	74.839	7,4	107.579	8,7	157.028	9,0	82.198	9,1	41.581	5,7	1,5

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Discapacidad y grupos de edad		TOTAL		Años de educación												Razón de tasa¹
				Menos de 4 años		4-5 años		6-10 años		11 años		12-14 años		Más de 14 años		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
35 a 44 años	Sin discapacidad	5.364.198	86,2	461.324	76,0	902.983	88,7	1.052.783	85,3	1.506.687	86,6	783.289	86,8	657.131	90,8	-
	Discapacidad severa o extrema	403.560	7,1	108.484	11,5	93.492	7,9	97.056	8,2	69.336	5,5	21.483	4,4	13.708	2,3	5,0
	Discapacidad moderada	504.468	8,9	109.801	11,7	112.879	9,5	108.293	9,2	95.557	7,6	40.175	8,2	37.763	6,3	1,9
45 a 54 años	Sin discapacidad	4.752.067	84,0	723.547	76,8	982.444	82,6	976.455	82,6	1.098.829	87,0	426.233	87,4	544.558	91,4	-
	Discapacidad severa o extrema	411.525	8,7	145.778	12,5	99.610	8,6	65.113	7,1	52.376	7,2	24.382	7,5	24.267	5,4	2,3
	Discapacidad moderada	539.475	11,4	175.469	15,1	119.645	10,3	110.922	12,1	60.529	8,4	41.495	12,7	31.416	7,0	2,2
55 a 69 años	Sin discapacidad	3.791.538	79,9	843.913	72,4	945.276	81,2	741.229	80,8	609.613	84,4	261.169	79,9	390.339	87,5	-
	Discapacidad severa o extrema	482.979	11,4	244.358	13,6	116.129	10,6	69.684	12,3	23.758	7,0	15.314	8,1	13.737	5,3	2,6
	Discapacidad moderada	665.028	15,6	310.083	17,3	184.228	16,8	77.043	13,6	49.578	14,6	20.069	10,6	24.027	9,2	1,9
	Sin discapacidad	3.106.491	73,0	1.242.145	69,1	798.381	72,7	421.842	74,2	267.278	78,5	154.801	81,4	222.044	85,5	-

1. Incidencia de menos de 4 años de educación / incidencia de 14 y más años.

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 3.10. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según años de educación, zona urbana (cabeceras municipales). Colombia 2007.

Discapacidad y grupos de edad			TOTAL		Años de educación												Razón de tasa¹
					Menos de 4 años		4-5 años		6-10 años		11 años		12-14 años		Más de 14 años		
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Zona urbana	Discapacidad																
	Discapacidad severa o extrema		1.712.238	7,0	452.154	15,8	331.573	7,8	458.195	6,2	253.756	4,8	135.720	5,1	80.840	3,7	4,3
	Discapacidad moderada		2.159.150	8,8	368.093	12,8	415.448	9,8	589.260	8,0	396.946	7,6	241.790	9,1	147.613	6,8	1,9
	Sin discapacidad		20.720.316	84,3	2.047.485	71,4	3.503.794	82,4	6.357.402	85,9	4.606.261	87,6	2.275.569	85,8	1.929.804	89,4	-
Zona urbana	Grupo de edad	Discapacidad															
	12 a 17 años	Discapacidad severa o extrema	182.907	4,6	32.457	16,9	32.958	4,6	111.412	3,9	5.270	3,1	810	5,3	-	-	-
		Discapacidad moderada	216.927	5,5	11.551	6,0	38.423	5,4	155.723	5,4	10.085	5,8	1.021	6,7	125	5,7	0,9
		Sin discapacidad	3.563.942	89,9	148.082	77,1	640.373	90,0	2.602.643	90,7	157.395	91,1	13.381	88,0	2.067	94,3	-
	18 a 24 años	Discapacidad severa o extrema	225.998	5,4	23.518	15,2	23.834	7,1	75.432	6,3	55.316	3,8	38.868	4,6	9.030	4,2	3,6
		Discapacidad moderada	299.598	7,1	8.942	5,8	27.667	8,3	88.452	7,4	81.351	5,5	70.908	8,5	22.278	10,3	0,6
		Sin discapacidad	3.674.689	87,5	122.640	79,1	281.916	84,6	1.029.198	86,3	1.329.341	90,7	727.609	86,9	183.985	85,5	-
	25 a 34 años	Discapacidad severa o extrema	278.812	5,6	65.643	21,4	28.649	4,6	61.010	6,2	64.688	4,3	36.561	4,4	22.262	3,2	6,7
		Discapacidad	404.049	8,2	27.504	9,0	49.305	7,9	84.972	8,6	131.265	8,7	72.563	8,7	38.441	5,6	1,6

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Discapacidad y grupos de edad		TOTAL		Años de educación												Razón de tasa¹
				Menos de 4 años		4-5 años		6-10 años		11 años		12-14 años		Más de 14 años		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
	moderada															
	Sin discapacidad	4.263.697	86,2	213.561	69,6	546.321	87,5	844.684	85,3	1.308.450	87,0	724.535	86,9	626.146	91,2	-
35 a 44 años	Discapacidad severa o extrema	318.269	7,2	75.440	15,9	66.745	8,6	81.929	8,3	59.530	5,3	21.483	4,6	13.142	2,3	6,9
	Discapacidad moderada	344.520	7,8	45.516	9,6	62.727	8,1	86.421	8,7	76.708	6,8	36.527	7,8	36.622	6,3	1,5
	Sin discapacidad	3.754.178	85,0	352.290	74,4	643.309	83,2	824.151	83,0	995.927	88,0	408.165	87,6	530.336	91,4	-
45 a 54 años	Discapacidad severa o extrema	332.722	8,8	94.480	14,6	84.632	9,5	60.993	7,3	46.162	7,0	23.721	7,6	22.734	5,4	2,7
	Discapacidad moderada	406.377	10,8	103.156	16,0	83.382	9,3	99.756	12,0	52.014	7,9	40.811	13,0	27.258	6,4	2,5
	Sin discapacidad	3.029.414	80,4	448.094	69,4	725.221	81,2	674.008	80,7	559.277	85,1	249.119	79,4	373.695	88,2	-
55 a 69 años	Discapacidad severa o extrema	373.530	11,3	160.614	14,7	94.755	10,4	67.420	12,9	22.790	7,0	14.278	7,6	13.672	5,5	2,7
	Discapacidad moderada	487.679	14,8	171.424	15,7	153.944	16,8	73.936	14,1	45.523	14,0	19.961	10,7	22.891	9,2	1,7
	Sin discapacidad	2.434.395	73,9	762.817	69,7	666.654	72,8	382.718	73,0	255.872	78,9	152.760	81,7	213.575	85,4	-

1. Menos de 4 años de educación / 14 y más años.

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Cuadro 3.11. Discapacidad percibida relativa a las actividades y la participación de la población de 12 a 69 años, por intensidad y grupos de edad, según años de educación, zona rural (resto de los municipios). Colombia 2007.

Discapacidad y grupos de edad			TOTAL		Años de educación												Razón de tasa ¹
					Menos de 4 años		4-5 años		6-10años		11 años		12-14 años		Más de 14 años		
			No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Zona rural		Discapacidad severa o extrema	431.569	6,2	230.936	9,8	92.689	4,7	65.080	4,0	33.353	4,4	4.421	2,7	5.090	5,6	1,8
		Discapacidad moderada	744.480	10,7	322.220	13,6	188.481	9,5	118.721	7,4	84.829	11,3	20.653	12,8	9.576	10,6	1,3
		Sin discapacidad	5.776.084	83,1	1.807.694	76,6	1.696.070	85,8	1.429.512	88,6	631.335	84,2	135.782	84,4	75.692	83,8	-
Zona rural	12 a 17 años	Discapacidad severa o extrema	49.298	3,5	17.226	8,4	12.049	2,8	19.339	2,7	684	2,0	-	-	-	-	-
		Discapacidad moderada	68.724	4,9	12.362	6,0	19.925	4,6	34.438	4,8	1.885	5,4	115	4,3	-	-	-
		Sin discapacidad	1.278.625	91,5	176.257	85,6	397.361	92,6	669.729	92,6	32.325	92,6	2.584	95,7	369	100,0	-
	18 a 24 años	Discapacidad severa o extrema	41.606	3,8	16.394	9,9	6.556	2,3	11.705	3,5	4.997	1,9	1.896	3,7	58	1,2	8,3
		Discapacidad moderada	95.269	8,6	11.190	6,8	26.323	9,3	25.531	7,7	25.762	9,7	6.462	12,8	-	-	-
		Sin discapacidad	964.849	87,6	137.270	83,3	251.131	88,4	293.034	88,7	236.127	88,5	42.283	83,5	5.004	98,8	0,8
	25 a 34 años	Discapacidad severa o extrema	67.123	5,3	29.232	9,7	10.987	2,8	12.525	5,1	10.684	4,6	829	1,2	2.866	7,7	1,3
		Discapacidad moderada	110.094	8,6	23.412	7,8	25.534	6,5	22.607	9,3	25.764	11,0	9.636	13,9	3.140	8,5	0,9
		Sin discapacidad	1.100.501	86,1	247.762	82,5	356.662	90,7	208.100	85,6	198.237	84,5	58.754	84,9	30.985	83,8	-

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Discapacidad y grupos de edad		TOTAL		Años de educación												Razón de tasa¹
				Menos de 4 años		4-5 años		6-10años		11 años		12-14 años		Más de 14 años		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
35 a 44 años	Discapacidad severa o extrema	85.291	6,9	33.043	7,1	26.746	6,4	15.128	8,0	9.806	7,5	-	-	567	3,6	2,0
	Discapacidad moderada	159.947	12,9	64.285	13,7	50.152	12,1	21.872	11,6	18.849	14,3	3.647	16,8	1.142	7,2	1,9
	Sin discapacidad	997.889	80,3	371.257	79,2	339.134	81,5	152.305	80,5	102.903	78,2	18.068	83,2	14.222	89,3	-
45 a 54 años	Discapacidad severa o extrema	78.803	8,1	51.297	9,9	14.978	5,5	4.120	5,0	6.214	9,6	661	4,9	1.533	6,9	1,4
	Discapacidad moderada	133.098	13,7	72.313	13,9	36.263	13,4	11.166	13,5	8.515	13,1	684	5,1	4.158	18,6	0,7
	Sin discapacidad	762.124	78,2	395.819	76,2	220.055	81,1	67.221	81,5	50.336	77,4	12.050	90,0	16.643	74,5	-
55 a 69 años	Discapacidad severa o extrema	109.449	11,4	83.743	11,9	21.374	11,7	2.264	5,1	968	5,9	1.036	32,5	65	0,7	17,0
	Discapacidad moderada	177.349	18,5	138.659	19,8	30.284	16,5	3.107	7,0	4.055	24,7	108	3,4	1.136	11,7	1,7
	Sin discapacidad	672.096	70,1	479.328	68,3	131.728	71,8	39.124	87,9	11.407	69,4	2.041	64,1	8.469	87,6	-

1. Menos de 4 años de educación / 14 y más años.

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Cuadro 3.12. Factores asociados a la discapacidad severa o extrema sentida de la población de 12 y más años, en función de sexo, edad, zona, años de educación, y diabetes.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Mujer	0,15	0,0018	1,16	[1,06-1,28]
Edad	0,02	<,0001	1,02	[1,02-1,03]
Cabecera	0,22	0,0009	1,25	[1,10-1,43]
Años de educación	-0,05	<0,00101	0,95	[0,93-0,98]
Con diabetes	0,29	0,0169	1,34	[1,05-1,68]

1. **b:** Coeficiente de regresión
2. **Valor p:** Significación estadística
3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística
4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Cuadro 3.13. OR's e intervalos de confianza obtenidos de un modelo logístico con la discapacidad severa o extrema como variable dependiente (para el nivel de respuesta de presencia de discapacidad) en función de años de educación, sexo, edad, diabetes y zona.

Factores asociados	OR ¹	IC _{95%} ²
Mujer	1,35	[1,12-1,64]
Edad	1,02	[1,02-1,03]
Cabecera municipal	1,57	[1,20-2,04]
Años de educación	0,95	[0,93-0,98]
Con diabetes	1,77	[1,11-2,83]

1. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística.
2. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR.

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

Cuadro 3.14. Factores asociados a la discapacidad percibida de la población de 12 y más años en función de sexo, edad, años de educación y accidentes de tránsito.

Factores asociados	b ¹	Valor p ²	OR ³	IC _{95%} ⁴
Mujer	0,26	<0,00101	1,30	[1,21-1,39]
Edad	0,02	<0,00101	1,02	[1,02-1,03]
Años de educación	-0,02	0,0465	0,98	[0,97-1,00]
Si Accidente de tránsito	0,17	<0,00101	1,18	[1,09-1,28]

1. **b:** Coeficiente de regresión
2. **Valor p:** Significación estadística
3. **OR:** Odds Ratio ajustado por los otros factores, calculado a partir de una regresión logística
4. **IC:** Intervalo de confianza del 95% para el OR

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Cuadro 3.15. Capacidad auditiva percibida de la población de 12 a 69 años, por grupo de edad y sexo. Colombia, 2007.

Capacidad auditiva, zona y sexo		TOTAL		Grupo de edad											
				12 a 17 años		18 a 24 años		25 a 34 años		35 a 44 años		45 a 54 años		55 a 69 años	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
TOTAL		31.543.837	100,0	5.360.422	100,0	5.302.009	100,0	6.224.274	100,0	5.660.095	100,0	4.742.538	100,0	4.254.499	100,0
Capacidad auditiva															
Capacidad auditiva buena		29.198.005	92,6	5.145.039	96,0	5.045.491	95,2	5.923.196	95,2	5.284.319	93,4	4.261.235	89,9	3.538.725	83,2
Oye con dificultad o está sordo		2.345.832	7,4	215.383	4,0	256.519	4,8	301.078	4,8	375.776	6,6	481.303	10,1	715.774	16,8
Zona															
Capacidad auditiva															
Cabecera	Capacidad auditiva buena	22.764.364	92,6	3.799.635	95,9	4.012.213	95,5	4.709.458	95,2	4.123.009	93,3	3.378.715	89,7	2.741.333	83,2
	Oye con dificultad o está sordo	1.827.340	7,4	164.140	4,1	188.073	4,5	237.099	4,8	293.959	6,7	389.799	10,3	554.272	16,8
Resto	Capacidad auditiva buena	6.433.641	92,5	1.345.404	96,3	1.033.278	93,8	1.213.738	95,0	1.161.310	93,4	882.520	90,6	797.392	83,2
	Oye con dificultad o está sordo	518.492	7,5	51.243	3,7	68.446	6,2	63.979	5,0	81.817	6,6	91.504	9,4	161.502	16,8
Sexo															
Hombre	Capacidad auditiva														
	Capacidad auditiva buena	13.701.709	92,5	2.595.095	96,2	2.399.457	94,8	2.772.808	94,6	2.278.825	93,2	2.016.854	90,2	1.638.670	83,1
	Oye con dificultad o está sordo	1.114.984	7,5	103.809	3,8	132.714	5,2	157.493	5,4	166.904	6,8	219.971	9,8	334.093	16,9
Mujer	Capacidad auditiva buena	15.496.297	92,6	2.549.944	95,8	2.646.033	95,5	3.150.388	95,6	3.005.494	93,5	2.244.381	89,6	1.900.056	83,3
	Oye con dificultad o está sordo	1.230.848	7,4	111.574	4,2	123.804	4,5	143.585	4,4	208.872	6,5	261.332	10,4	381.681	16,7

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Cuadro 3.16. Población por capacidad auditiva percibida de la población de 12 a 69 años, por estrato socioeconómico, zona, sexo y grupos de edad. Colombia, 2007.

Capacidad auditiva, zona, sexo y grupo de edad		TOTAL		Estrato										Razón de tasa
				Sin estrato, S.I.		Uno		Dos		Tres y cuatro		Cinco y seis		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
TOTAL		31.543.837	100,0	2.866.127	100,0	7.483.832	100,0	11.896.919	100,0	8.773.233	100,0	523.727	100,0	-
Capacidad auditiva														
Capacidad auditiva buena		29.198.005	92,6	2.660.950	92,8	6.888.564	92,0	10.967.993	92,2	8.172.268	93,2	508.230	97,0	-
Oye con dificultad o está sordo		2.345.832	7,4	205.177	7,2	595.268	8,0	928.926	7,8	600.964	6,8	15.498	3,0	2,7
Zona	Capacidad auditiva													
Cabecera	Capacidad auditiva buena	22.764.364	92,6	1.589.820	92,4	3.875.361	92,4	8.851.686	92,0	7.984.123	93,1	463.375	97,1	-
	Oye con dificultad o está sordo	1.827.340	7,4	130.943	7,6	320.621	7,6	768.674	8,0	593.447	6,9	13.656	2,9	2,6
Resto	Capacidad auditiva buena	6.433.641	92,5	1.071.131	93,5	3.013.203	91,6	2.116.308	93,0	188.145	96,2	44.855	96,1	-
	Oye con dificultad o está sordo	518.492	7,5	74.234	6,5	274.647	8,4	160.252	7,0	7.518	3,8	1.841	3,9	2,2
Sexo	Capacidad auditiva													
Hombre	Capacidad auditiva buena	13.701.709	92,5	1.282.898	92,4	3.359.771	91,9	5.108.788	92,4	3.765.689	93,0	184.562	96,3	-
	Oye con dificultad o está sordo	1.114.984	7,5	105.656	7,6	297.508	8,1	422.876	7,6	281.791	7,0	7.153	3,7	2,2
Mujer	Capacidad auditiva buena	15.496.297	92,6	1.378.052	93,3	3.528.793	92,2	5.859.205	92,0	4.406.579	93,2	323.668	97,5	-
	Oye con dificultad o está sordo	1.230.848	7,4	99.521	6,7	297.760	7,8	506.049	8,0	319.174	6,8	8.344	2,5	3,1
Grupo de edad	Capacidad auditiva													
12 a 17 años	Capacidad auditiva buena	5.145.039	96,0	507.952	96,2	1.457.847	95,5	1.913.930	95,9	1.212.808	96,4	52.502	100,0	-

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Capacidad auditiva, zona, sexo y grupo de edad		TOTAL		Estrato										Razón de tasa
				Sin estrato, S.I.		Uno		Dos		Tres y cuatro		Cinco y seis		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
	Oye con dificultad o está sordo	215.383	4,0	19.878	3,8	68.853	4,5	81.624	4,1	45.028	3,6	-	-	-
18 a 24 años	Capacidad auditiva buena	5.045.491	95,2	518.319	94,0	1.210.967	93,6	1.903.307	95,3	1.357.106	96,7	55.792	100,0	-
	Oye con dificultad o está sordo	256.519	4,8	33.002	6,0	83.401	6,4	94.381	4,7	45.734	3,3	-	-	-
25 a 34 años	Capacidad auditiva buena	5.923.196	95,2	673.437	94,2	1.393.823	94,8	2.260.795	94,7	1.510.670	96,5	84.471	97,0	-
	Oye con dificultad o está sordo	301.078	4,8	41.804	5,8	75.799	5,2	126.131	5,3	54.701	3,5	2.643	3,0	1,7
35 a 44 años	Capacidad auditiva buena	5.284.319	93,4	427.426	92,8	1.216.485	92,9	2.000.037	93,2	1.556.757	93,8	83.613	98,0	-
	Oye con dificultad o está sordo	375.776	6,6	33.062	7,2	92.590	7,1	145.956	6,8	102.435	6,2	1.733	2,0	3,6
45 a 54 años	Capacidad auditiva buena	4.261.235	89,9	301.356	88,0	865.319	88,7	1.605.451	88,1	1.387.485	92,5	101.624	98,9	-
	Oye con dificultad o está sordo	481.303	10,1	40.994	12,0	109.888	11,3	217.239	11,9	112.047	7,5	1.135	1,1	10,3
55 a 69 años	Capacidad auditiva buena	3.538.725	83,2	232.461	86,4	744.123	81,9	1.284.473	83,0	1.147.441	82,6	130.228	92,9	-
	Oye con dificultad o está sordo	715.774	16,8	36.437	13,6	164.737	18,1	263.594	17,0	241.020	17,4	9.986	7,1	2,5

1. Estratos 5 y 6/ estrato 1

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Cuadro 3.17. Capacidad visual percibida y ceguera de la población de 12 a 69 años, por grupo de edad y sexo. Colombia, 2007.

Capacidad visual, ceguera, zona y sexo		TOTAL		Grupo de edad											
				12 a 17 años		18 a 24 años		25 a 34 años		35 a 44 años		45 a 54 años		55 a 69 años	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
TOTAL		31.543.837	100,0	5.360.422	100,0	5.302.009	100,0	6.224.274	100,0	5.660.095	100,0	4.742.538	100,0	4.254.499	100,0
Capacidad visual y ceguera															
Sin dificultad visual		26.900.735	85,3	4.942.877	92,2	4.817.495	90,9	5.647.532	90,7	4.779.510	84,4	3.569.526	75,3	3.143.795	73,9
Con dificultad visual		4.165.407	13,2	400.490	7,5	448.692	8,5	538.734	8,7	792.340	14,0	1.034.385	21,8	950.767	22,3
Con ceguera		477.695	1,5	17.055	0,3	35.822	0,7	38.009	0,6	88.245	1,6	138.627	2,9	159.937	3,8
Zona															
Cabecera	Capacidad visual y ceguera														
	Sin dificultad visual	21.136.141	85,9	3.656.093	92,2	3.820.581	91,0	4.485.640	90,7	3.791.031	85,8	2.904.629	77,1	2.478.168	75,2
	Con dificultad visual	3.097.717	12,6	294.837	7,4	351.987	8,4	430.097	8,7	558.700	12,6	764.311	20,3	697.785	21,2
	Con ceguera	357.845	1,5	12.846	0,3	27.717	0,7	30.820	0,6	67.236	1,5	99.575	2,6	119.652	3,6
Resto	Sin dificultad visual	5.764.594	82,9	1.286.785	92,1	996.914	90,5	1.161.892	90,9	988.479	79,5	664.898	68,3	665.627	69,4
	Con dificultad visual	1.067.690	15,4	105.653	7,6	96.705	8,8	108.636	8,5	233.640	18,8	270.074	27,7	252.982	26,4
	Con ceguera	119.849	1,7	4.209	0,3	8.104	0,7	7.189	0,6	21.009	1,7	39.052	4,0	40.285	4,2
Sexo															
Hombre	Capacidad visual y ceguera														
	Sin dificultad visual	12.945.649	87,4	2.523.577	93,5	2.348.366	92,7	2.672.063	91,2	2.142.873	87,6	1.744.773	78,0	1.513.998	76,7
	Con dificultad visual	1.688.796	11,4	168.822	6,3	169.110	6,7	246.733	8,4	276.430	11,3	440.123	19,7	387.578	19,6
	Con ceguera	182.247	1,2	6.505	0,2	14.696	0,6	11.504	0,4	26.426	1,1	51.929	2,3	71.186	3,6
Mujer	Sin dificultad visual	13.955.086	83,4	2.419.301	90,9	2.469.129	89,1	2.975.469	90,3	2.636.637	82,0	1.824.753	72,8	1.629.798	71,4
	Con dificultad visual	2.476.611	14,8	231.668	8,7	279.583	10,1	292.001	8,9	515.910	16,1	594.262	23,7	563.189	24,7
	Con ceguera	295.447	1,8	10.550	0,4	21.126	0,8	26.504	0,8	61.819	1,9	86.698	3,5	88.750	3,9

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Cuadro 3.18. Población por capacidad visual percibida y ceguera de la población de 12 a 69 años, por estrato socioeconómico, zona, sexo y grupos de edad. Colombia, 2007.

Discapacidad, edad, zona y grupos de edad		TOTAL		Estrato										Razónde tasa ¹
				Sin estrato, S,I,		Uno		Dos		Tres y cuatro		Cinco y seis		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
TOTAL		31.543.837	100,0	2.866.127	100,0	7.483.832	100,0	11.896.919	100,0	8.773.233	100,0	523.727	100,0	-
Capacidad visual y ceguera														
Sin dificultad visual		26.900.735	85,3	2.503.932	87,4	6.187.978	82,7	10.149.983	85,3	7.585.434	86,5	473.409	90,4	-
Con dificultad visual		4.165.407	13,2	322.451	11,3	1.170.321	15,6	1.542.175	13,0	1.084.968	12,4	45.492	8,7	1,8
Con ceguera		477.695	1,5	39.744	1,4	125.532	1,7	204.761	1,7	102.831	1,2	4.826	0,9	1,9
Zona	Capacidad visual y ceguera													
CABECERA	Sin dificultad visual	21.136.141	85,9	1.521.428	88,4	3.543.806	84,5	8.221.867	85,5	7.413.037	86,4	436.003	91,4	-
	Con dificultad visual	3.097.717	12,6	175.482	10,2	591.759	14,1	1.227.071	12,8	1.065.929	12,4	37.476	7,9	1,8
	Con ceguera	357.845	1,5	23.852	1,4	60.417	1,4	171.421	1,8	98.603	1,1	3.552	0,7	2,0
RESTO														
Sin dificultad visual		5.764.594	82,9	982.503	85,8	2.644.172	80,4	1.928.117	84,7	172.396	88,1	37.406	80,1	-
Con dificultad visual		1.067.690	15,4	146.969	12,8	578.562	17,6	315.104	13,8	19.039	9,7	8.015	17,2	1,0
Con ceguera		119.849	1,7	15.892	1,4	65.116	2,0	33.339	1,5	4.228	2,2	1.274	2,7	0,7
Sexo	Capacidad visual y ceguera													
Hombre	Sin dificultad visual	12.945.649	87,4	1.219.377	87,8	3.123.159	85,4	4.829.381	87,3	3.601.591	89,0	172.140	89,8	-
	Con dificultad visual	1.688.796	11,4	147.481	10,6	486.346	13,3	630.297	11,4	405.097	10,0	19.574	10,2	1,3
	Con ceguera	182.247	1,2	21.696	1,6	47.774	1,3	71.986	1,3	40.791	1,0	-	-	-
Mujer	Sin dificultad visual	13.955.086	83,4	1.284.555	86,9	3.064.818	80,1	5.320.602	83,6	3.983.842	84,3	301.269	90,7	-
	Con dificultad visual	2.476.611	14,8	174.970	11,8	683.975	17,9	911.878	14,3	679.871	14,4	25.917	7,8	2,3
	Con ceguera	295.447	1,8	18.048	1,2	77.759	2,0	132.775	2,1	62.040	1,3	4.826	1,5	1,3
Grupo de edad														
Capacidad visual y		4.942.877	92,2	489.378	92,7	1.392.096	91,2	1.829.820	91,7	1.180.210	93,8	51.374	97,9	-

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Discapacidad, edad, zona y grupos de edad		TOTAL		Estrato										Razón de tasa ¹
				Sin estrato, S,I,		Uno		Dos		Tres y cuatro		Cinco y seis		
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
12 a 17 años	ceguera													
	Sin dificultad visual													
	Con dificultad visual	400.490	7,5	36.226	6,9	130.995	8,6	157.923	7,9	74.217	5,9	1.128	2,1	4,1
	Con ceguera	17.055	0,3	2.226	0,4	3.608	0,2	7.811	0,4	3.409	0,3	-	-	-
18 a 24 años	Sin dificultad visual	4.817.495	90,9	512.220	92,9	1.150.354	88,9	1.825.967	91,4	1.273.163	90,8	55.792	100,0	-
	Con dificultad visual	448.692	8,5	32.957	6,0	134.862	10,4	155.896	7,8	124.978	8,9	-	-	-
	Con ceguera	35.822	0,7	6.144	1,1	9.153	0,7	15.825	0,8	4.700	0,3	-	-	-
25 a 34 años	Sin dificultad visual	5.647.532	90,7	658.591	92,1	1.315.072	89,5	2.175.799	91,2	1.416.526	90,5	81.543	93,6	-
	Con dificultad visual	538.734	8,7	52.154	7,3	145.772	9,9	191.482	8,0	143.754	9,2	5.571	6,4	1,5
	Con ceguera	38.009	0,6	4.496	0,6	8.779	0,6	19.645	0,8	5.090	0,3	-	-	-
35 a 44 años	Sin dificultad visual	4.779.510	84,4	382.654	83,1	1.026.746	78,4	1.832.880	85,4	1.461.776	88,1	75.454	88,4	-
	Con dificultad visual	792.340	14,0	68.542	14,9	260.242	19,9	279.567	13,0	174.097	10,5	9.891	11,6	1,7
	Con ceguera	88.245	1,6	9.292	2,0	22.087	1,7	33.547	1,6	23.320	1,4	-	-	-
45 a 54 años	Sin dificultad visual	3.569.526	75,3	257.846	75,3	671.979	68,9	1.369.238	75,1	1.186.483	79,1	83.980	81,7	-
	Con dificultad visual	1.034.385	21,8	78.521	22,9	260.688	26,7	393.328	21,6	284.343	19,0	17.505	17,0	1,6
	Con ceguera	138.627	2,9	5.983	1,7	42.539	4,4	60.124	3,3	28.706	1,9	1.274	1,2	3,7
55 a 69 años	Sin dificultad visual	3.143.795	73,9	203.244	75,6	631.731	69,5	1.116.278	72,1	1.067.276	76,9	125.267	89,3	-
	Con dificultad visual	950.767	22,3	54.050	20,1	237.762	26,2	363.980	23,5	283.579	20,4	11.396	8,1	3,2
	Con ceguera	159.937	3,8	11.604	4,3	39.366	4,3	67.808	4,4	37.606	2,7	3.552	2,5	1,7

1. Estratos 5 y 6 / estrato 1.

Fuente: Procesamiento propio de la Encuesta Nacional de Salud, 2007.

TOMO VI

ANEXOS CAPÍTULO IV:

**ANÁLISIS DE DESIGUALDADES E INEQUIDADES POR
PROBLEMAS DE SALUD.**

**RIESGO DIFERENCIAL EN ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES**

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 4.1 Riesgo relativo comparativo del piso de tierra para EDA en las diferentes sub-regiones.

Gráfico 4.2. Riesgo de EDA de acuerdo al número de habitantes y al tipo de piso.

Gráfico 4.3. Porcentaje de viviendas sin acueducto por sub-regiones y su riesgo de EDA.

Gráfico 4.41. Riesgo de IRA según combustible para cocinar (leña, Madera, carbón de leña) por regiones.

Gráfico 4.5. Riesgo de IRA según combustible para cocinar por subregiones.

Gráfico 4.6. Riesgo de IRA por falta de educación en cuidadores de niños por áreas.

Gráfico 4.7. Riesgo de IRA por falta de educación en cuidadores de niños por regiones.

Gráfico 4.8. Riesgo de IRA por falta de educación en cuidadores de niños por subregión.

Gráfico 4.92. Riesgo de IRA por falta de educación en cuidadores de niños por número de habitantes.

Gráfico 4.10. Riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por áreas sin coberturas útiles de vacunación.

Gráfico 4.11. Riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por subregiones sin coberturas útiles de vacunación.

Gráfico 4.12. Riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por número de habitantes sin cobertura útil de vacunación.

Gráfico 4.13. Caracterización de la vacunación con respecto a las características del jefe de hogar.

Gráfico 4.14. Riesgo de ITS por relaciones sexuales por área.

Gráfico 4.153. Riesgo de ITS por relaciones sexuales por regiones.

Gráfico 4.16. Riesgo de ITS por relaciones sexuales por subregiones.

Gráfico 4.174. Riesgo de ITS por relaciones sexuales, por regímenes de afiliación al SGSSS.

Gráfico 4.185. Riesgo de ITS por no uso del condón en la primera relación sexual, por áreas.

Gráfico 4.19. Riesgo de ITS por no uso del condón en la primera relación sexual por subregión.

Gráfico 4.20. Riesgo de VIH por relaciones sexuales por área.

Gráfico 4.21. Riesgo de VIH-SIDA por relaciones sexuales por región.

Gráfico 4.22.6 Riesgo de VIH-SIDA por relaciones sexuales por subregión. Pruebas estadísticas.

Gráfico 4.23. Riesgo de VIH-SIDA por relaciones sexuales por régimen de afiliación al SGSSS.

Gráfico 4.24. Riesgo de VIH-SIDA por no uso del condón en la primera relación sexual por áreas.

Gráfico 4.25. Riesgo de VIH SIDA por no uso del condón en la primera relación sexual por regiones.

Gráfico 4.26. Riesgo de VIH-SIDA por no uso del condón en la primera relación sexual por subregiones.

Gráfico 4.27. Riesgo de ETV por paredes inadecuadas por áreas.

Gráfico 4.28. Riesgo de ETV por paredes inadecuadas por regiones

Gráfico 4.29. Riesgo de ETV por paredes inadecuadas por subregiones.

Gráfico 4.30. Riesgo de ETV por paredes inadecuadas por número de habitantes.

Gráfico 4.31. Riesgo de ETV por paredes inadecuadas por nivel de pobreza.

Gráfico 4.32. Riesgo de ETV por no lavar la alberca por áreas.

Gráfico 4.33. Riesgo de ETV por no lavar la alberca por regiones.

Gráfico 4.34. Riesgo de ETV por no lavar la alberca por subregiones.

Gráfico 4.35. Riesgo de ETV por no lavar la alberca por número de habitantes.

Gráfico 4.36. Riesgo de ETV por no lavar la alberca por nivel de pobreza.

Gráfico 4.37. Riesgo de ETV por tanque de agua no tapado por area.

Gráfico 4.38. Riesgo de ETV por tanque de agua no tapado por regiones.

Gráfico 4.39. Riesgo de ETV por tanque de agua no tapado por subregiones.

Gráfico 4.40. Riesgo de ETV por tanque de agua no tapado por numero de habitantes.

LISTA DE CUADROS

Cuadro 4.1. Porcentaje de viviendas con piso de tierra y riesgo relativo comparativo por área.

Cuadro 4.2. Porcentaje de viviendas por regiones con piso de tierra y riesgo relativo comparativo para enfermedad diarreica aguda.

Cuadro 4.3. Porcentaje de viviendas con piso de tierra y riesgo relativo comparativo para EDA de las distintas sub-regiones.

Cuadro 4.4. Comportamiento del riesgo comparativo por subregiones teniendo en cuenta el tipo de tierra.

Cuadro 4.5. Riesgo de EDA por subregión Atlántica.

Cuadro 4.6. Riesgo de EDA en la subregión Oriental.

Cuadro 4.7. Riesgo de EDA por subregión Pacífica.

Cuadro 4.8. Riesgo de EDA por subregión Central.

Cuadro 4.9 Porcentaje de viviendas por municipio con riesgo comparativo de EDA.

Cuadro 4.10. Porcentaje de viviendas sin acueducto por regiones y su riesgo de EDA.

Cuadro 4.11. Riesgo de EDA en las viviendas sin acueducto en la región Central.

Cuadro 4.12. Porcentaje de viviendas sin acueducto por número de habitantes y su riesgo de EDA.

Cuadro 4.13. Porcentaje de viviendas por área (urbano y rural), sin recolección de basuras y su riesgo de EDA.

Cuadro 4.14. Porcentaje de viviendas por subregión sin recolección de basuras y su riesgo de EDA.

Cuadro 4.15. Riesgo de EDA en la subregión Atlántica que no posee servicios de recolección de basuras.

Cuadro 4.16. Riesgo de EDA en la subregión Pacífica que no posee servicios de recolección de basuras.

Cuadro 4.17. Riesgo de EDA en la subregión Central que no posee servicios de recolección de basuras.

Cuadro 4.18. Riesgo de EDA en la subregión Central que no posee servicios de recolección de basuras.

Cuadro 4.19. Riesgo de EDA por número de habitantes que no poseen servicios de recolección de basuras.

Cuadro 4.20. Comparación de los riesgos integrados de EDA vs los riesgos comparativos.

Cuadro 4.21. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar y el riesgo de IRA.

Cuadro 4.22. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar y por subregión y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.23. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar y por subregión y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.24. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar en la subregión Atlántica y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.25. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar en la subregión Pacífica y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.26. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar en la subregión Oriental y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.27. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar en la subregión Central y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.28. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar por número de habitantes y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.29. Porcentaje de grado de escolaridad del cuidador.

Cuadro 4.30. Porcentaje de grado de escolaridad del cuidador por área y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.31. Porcentaje de grado de escolaridad del cuidador por subregión y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.32. Porcentaje de cuidadores sin escolaridad por subregión y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.33. Porcentaje de cuidadores sin escolaridad en la subregión Oriental y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.34. Porcentaje de cuidadores sin escolaridad en la subregión Central y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.35. Porcentaje de cuidadores sin escolaridad en la subregión Atlántica y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.36. Porcentaje de cuidadores sin escolaridad en la subregión Pacífica y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.37. Porcentaje de cuidadores sin educación por número de habitantes y su riesgo de IRA.

Cuadro 4.38. Riesgo integrado va riesgo comparativo de los factores determinantes para IRA.

Cuadro 4.39. Porcentaje por áreas sin coberturas útiles de vacunación.

Cuadro 4.40. Porcentaje de áreas sin coberturas útiles de vacunación y riesgo de enfermedades inmunoprevenibles.

Cuadro 4.41. Porcentaje por regiones sin coberturas útiles de vacunación y riesgo de enfermedades inmunoprevenibles.

Cuadro 4.42. Porcentaje por regiones sin coberturas útiles de vacunación y riesgo de enfermedades inmunoprevenibles.

Cuadro 4.43. Porcentaje por subregiones sin coberturas útiles de vacunación y riesgo de enfermedades inmunoprevenibles.

Cuadro 4.44. Riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por número de habitantes.

Cuadro 4.45. Riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por número de habitantes.

Cuadro 4.46. Porcentaje de relaciones sexuales por área y riesgo de ITS.

Cuadro 4.47. Porcentaje de relaciones sexuales por regiones y riesgo de ITS.

Cuadro 4.48. Porcentaje de relaciones sexuales por subregiones y riesgo de ITS.

Cuadro 4.49. OR y Chi cuadrado del riesgo de ITS por subregión.

Cuadro 4.50. Porcentaje de relaciones sexuales por régimen de afiliación y riesgo de ITS.

Cuadro 4.51. Porcentaje de relaciones sexuales en las que no se usó condón y riesgo de ITS.

Cuadro 4.52. Porcentaje de relaciones sexuales en las que no se usó condón por regiones y riesgo de ITS.

Cuadro 4.53. Porcentaje de primeras relaciones sexuales en las que no se usó condón por sub regiones y riesgo de ITS.

Cuadro 4.54. Pruebas estadísticas por sub-regiones del riesgo de ITS por el no USO de condón en las relaciones sexuales.

Cuadro 4.55. Porcentaje de primeras relaciones sexuales en las que no se usó condón por número de habitantes y riesgo de ITS. Pruebas estadísticas.

Cuadro 4.56. Porcentaje de primeras relaciones sexuales en las que no se usó condón por régimen de afiliación y riesgo de ITS. Pruebas estadísticas.

Cuadro 4.57. Porcentaje de relaciones sexuales por área y riesgo de ITS.

Cuadro 4.58. Porcentaje de relaciones sexuales por regiones y riesgo de ITS.

Cuadro 4.59. Porcentaje de relaciones sexuales por subregiones y riesgo de ITS.

Cuadro 4.60. Porcentaje de relaciones sexuales por subregiones y riesgo de ITS. Pruebas Estadísticas.

Cuadro 4.61. Porcentaje de relaciones sexuales por régimen de afiliación y riesgo de ITS.

Cuadro 4.62. Porcentaje de relaciones sexuales por área y riesgo de ITS.

Cuadro 4.63. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por regiones y riesgo de ITS.

Cuadro 4.64. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por sub regiones y riesgo de ITS.

Cuadro 4.65. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por sub regiones y riesgo de ITS. Pruebas estadísticas.

Cuadro 4.66. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por número de habitantes y riesgo de ITS.

Cuadro 4.67. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por número de habitantes y riesgo de ITS.

Cuadro 4.68. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por régimen de afiliación y riesgo de ITS.

Cuadro 4.69. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas y riesgo de ETV.

Cuadro 4.70. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas por sub regiones y riesgo de ETV.

Cuadro 4.71. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas en la subregión y riesgo de ETV.

Cuadro 4.72. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas en la subregión Atlántica y riesgo de ETV.

Cuadro 4.73. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas en la subregión Central y riesgo de ETV.

Cuadro 4.74. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas en la subregión Oriental y riesgo de ETV.

Cuadro 4.75. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas por número de habitantes y riesgo de ETV.

Cuadro 4.76. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por área y riesgo de ETV.

Cuadro 4.77. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por regiones y riesgo de ETV.

Cuadro 4.71. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por regiones y riesgo de ETV.

Cuadro 4.72. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Atlántica y riesgo de ETV.

Cuadro 4.73. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Pacífica y riesgo de ETV.

Cuadro 4.74. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Oriental y riesgo de ETV.

Cuadro 4.75. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Oriental y riesgo de ETV.

Cuadro 4.76. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por área y riesgo de ETV.

Cuadro 4.77. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por regiones y riesgo de ETV.

Cuadro 4.71. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por regiones y riesgo de ETV.

Cuadro 4.72. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Atlántica y riesgo de ETV.

Cuadro 4.73. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Pacífica y riesgo de ETV.

Cuadro 4.74. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Oriental y riesgo de ETV.

Cuadro 4.75. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Oriental y riesgo de ETV.

Cuadro 4.76. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por número de habitantes y riesgo de ETV.

Cuadro 4.77. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por NBI y riesgo de ETV.

Cuadro 4.78. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por área y riesgo de ETV.

Cuadro 4.79. Porcentaje de viviendas con tanque adicional sin tapa por sub regiones y riesgo de ETV.

Cuadro 4.80. Riesgo de ETV en la subregión Oriental.

Cuadro 4.81. Riesgo de ETV en la subregión Central.

Cuadro 4.82. Riesgo de ETV en la subregión Atlántica.


Cuadro 4.83. Riesgo de ETV en la subregión Pacífica.

Cuadro 4.84. Porcentaje de viviendas con tanque adicional sin tapa por número de habitantes y riesgo de ETV.

Cuadro 4.85. Porcentaje de viviendas con tanque adicional sin tapa por NBI y riesgo de ETV.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007


GRÁFICOS



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.1 Riesgo relativo comparativo del piso de tierra para EDA en las diferentes sub-regiones.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.2. Riesgo de EDA de acuerdo al número de habitantes y al tipo de piso.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.3. Porcentaje de viviendas sin acueducto por sub-regiones y su riesgo de EDA.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.47. Riesgo de IRA según combustible para cocinar (leña, Madera, carbón de leña) por regiones.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.5. Riesgo de IRA según combustible para cocinar por subregiones.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.6. Riesgo de IRA por falta de educación en cuidadores de niños por áreas.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.7. Riesgo de IRA por falta de educación en cuidadores de niños por regiones.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.8. Riesgo de IRA por falta de educación en cuidadores de niños por subregión.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.98. Riesgo de IRA por falta de educación en cuidadores de niños por número de habitantes.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.10. Riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por áreas sin coberturas útiles de vacunación.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.11. Riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por subregiones sin coberturas útiles de vacunación.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.12. Riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por número de habitantes sin cobertura útil de vacunación.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Grafico 4.13. Caracterización de la vacunación con respecto a las características del jefe de hogar.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.14. Riesgo de ITS por relaciones sexuales por área.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.159. Riesgo de ITS por relaciones sexuales por regiones.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.16. Riesgo de ITS por relaciones sexuales por subregiones.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.1710. Riesgo de ITS por relaciones sexuales, por regímenes de afiliación al SGSSS.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.1811. Riesgo de ITS por no uso del condón en la primera relación sexual, por áreas.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.19. Riesgo de ITS por no uso del condón en la primera relación sexual por subregión.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.20. Riesgo de VIH por relaciones sexuales por área.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.21. Riesgo de VIH-SIDA por relaciones sexuales por región.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.22.12 Riesgo de VIH-SIDA por relaciones sexuales por subregión. Pruebas estadísticas.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.23. Riesgo de VIH-SIDA por relaciones sexuales por régimen de afiliación al SGSSS.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.24. Riesgo de VIH-SIDA por no uso del condón en la primera relación sexual por áreas.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.25. Riesgo de VIH SIDA por no uso del condón en la primera relación sexual por regiones.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.26. Riesgo de VIH-SIDA por no uso del condón en la primera relación sexual por subregiones.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.27. Riesgo de ETV por paredes inadecuadas por áreas.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.28. Riesgo de ETV por paredes inadecuadas por regiones


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.29. Riesgo de ETV por paredes inadecuadas por subregiones.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.30. Riesgo de ETV por paredes inadecuadas por número de habitantes.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.31. Riesgo de ETV por paredes inadecuadas por nivel de pobreza.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.32. Riesgo de ETV por no lavar la alberca por áreas.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.33. Riesgo de ETV por no lavar la alberca por regiones.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.34. Riesgo de ETV por no lavar la alberca por subregiones.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.35. Riesgo de ETV por no lavar la alberca por número de habitantes.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.36. Riesgo de ETV por no lavar la alberca por nivel de pobreza.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.37. Riesgo de ETV por tanque de agua no tapado por area.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 4.38. Riesgo de ETV por tanque de agua no tapado por regiones.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.39. Riesgo de ETV por tanque de agua no tapado por subregiones.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.40. Riesgo de ETV por tanque de agua no tapado por numero de habitantes.

CUADROS

Cuadro 4.1. Porcentaje de viviendas con piso de tierra y riesgo relativo comparativo por área.

Área	%	Riesgo
Rural-disperso	25,2	12,6
Centro-poblado	19,7	9,9
Cabecera	2,0	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.2. Porcentaje de viviendas por regiones con piso de tierra y riesgo relativo comparativo para enfermedad diarreica aguda.

Región	%	Riesgo
Atlántica	19,0	63,3
Orinoquía-Amazonía	6,7	22,3
Oriental	5,3	17,7
Central	4,5	15,0
Pacífica	3,3	11,0
Bogotá	0,3	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.3. Porcentaje de viviendas con piso de tierra y riesgo relativo comparativo para EDA de las distintas sub-regiones.

Sub-región	%	Riesgo
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	33,9	113,0
Guajira, Cesar, Magdalena	23,1	77,0
Antioquia (Sin Medellín)	14,3	47,7
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	8,4	28,0
Boyacá, Cundinamarca, Meta	6,1	20,3
Orinoquía-Amazonia	3,0	10,0
Tolima, Huila, Caquetá	4,8	16,0
Santanderes	4,1	13,7
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	4,2	14,0
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	2,1	7,0
AM Barranquilla	1,8	6,0
Litoral Pacífico	1,4	4,7
AM Cali	0,4	1,3
Caldas, Risaralda, Quindío	0,3	1,0
AM Medellín	0,3	1,0
Bogotá	0,3	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.4. Comportamiento del riesgo comparativo por subregiones teniendo en cuenta el tipo de tierra.

Sub-región	%	Riesgo
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	33,9	113,0
Guajira, Cesar, Magdalena	23,1	77,0
Antioquia (Sin Medellín)	14,3	47,7
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	8,4	28,0
Boyacá, Cundinamarca, Meta	6,1	20,3
Orinoquía-Amazonía	3,0	10,0
Tolima, Huila, Caquetá	4,8	16,0
Santanderes	4,1	13,7
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	4,2	14,0
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	2,1	7,0
AM Barranquilla	1,8	6,0
Litoral Pacífico	1,4	4,7
AM Cali	0,4	1,3
Caldas, Risaralda, Quindío	0,3	1,0
AM Medellín	0,3	1,0
Bogotá	0,3	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.5. Riesgo de EDA por subregión Atlántica.

Sub-región	Riesgo
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	17,0
Guajira, Cesar, Magdalena	11,5
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	2,0
AM Barranquilla	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.6. Riesgo de EDA en la subregión Oriental.

Sub-región	Riesgo
Boyacá, Cundinamarca, Meta	1,5
Tolima, Huila, Caquetá	1,2
Santanderes	1,0

Cuadro 4.7. Riesgo de EDA por subregión Pacífica.

Sub-región	Riesgo
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	21,0
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	5,3
Litoral Pacífico	3,5
AM Cali	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.8. Riesgo de EDA por subregión Central.

Sub-región	Riesgo
Antioquia (Sin Medellín)	47,7
Caldas, Risaralda, Quindío	1,0
AM Medellín	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.9 Porcentaje de viviendas por municipio con riesgo comparativo de EDA.

Población	%	Riesgo
20.000 a 50.000	15,5	51,7
Menos de 10.000	14,1	47,0
10.000 a 20.000	12,2	40,7
50.000 a 100.000	9,2	30,7
100.000 a 200.000	8,6	28,7
200.000 a 900.000	3,3	11,0
900.000 a 3'000.000	1,5	5,0
Bogotá	0,3	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.10. Porcentaje de viviendas sin acueducto por regiones y su riesgo de EDA.

Región	%	Riesgo
Atlántica	16,2	81,0
Pacífica	14,4	72,0
Orinoquía-Amazonía	10,5	52,5
Oriental	10,0	50,0
Central	7,3	36,5
Bogotá	0,2	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.11. Riesgo de EDA en las viviendas sin acueducto en la región Central.

Sub-región	%	Riesgo
Antioquia (sin Medellín)	21,2	16,3
Caldas, Risaralda, Quindío	2,9	2,2
AM Medellín	1,3	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.12. Porcentaje de viviendas sin acueducto por número de habitantes y su riesgo de EDA.

Población	%	Riesgo
20.000 a 50.000	23,6	118,0
Menos de 10.000	18,4	92,0
10.000 a 20.000	16,7	83,5
50.000 a 100.000	14,2	71,0
100.000 a 200.000	12,9	64,5
200.000 a 900.000	4,5	22,5
900.000 a 3'000.000	1,6	8,0
Bogotá	0,2	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.13. Porcentaje de viviendas por área (urbano y rural), sin recolección de basuras y su riesgo de EDA.

Área	%	Riesgo
Rural Disperso	90,2	23,1
Centro Poblado	54,9	14,1
Cabecera	3,9	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.14. Porcentaje de viviendas por subregión sin recolección de basuras y su riesgo de EDA.

Región	%	Riesgo
Atlántica	35,6	356,0
Oriental	24,5	245,0
Pacífica	21,2	212,0
Central	17,1	171,0
Orinoquía-Amazonía	2,2	22,0
Bogotá	0,1	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.15. Riesgo de EDA en la subregión Atlántica que no posee servicios de recolección de basuras.

Sub-región	%	Riesgo
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	55,9	46,6
Guajira, Cesar, Magdalena	42,9	35,8
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	22,3	18,6
AM Barranquilla	1,2	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.16. Riesgo de EDA en la subregión Pacífica que no posee servicios de recolección de basuras.

Sub-región	%	Riesgo
Litoral Pacífico	54,1	60,1
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	26,5	29,4
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	10,1	11,2
AM Cali	0,9	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.17. Riesgo de EDA en la subregión Central que no posee servicios de recolección de basuras.

Sub-región	%	Riesgo
Antioquia (sin Medellín)	34,4	43,0
Caldas, Risaralda, Quindío	9,4	11,8
AM Medellín	0,8	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.18. Riesgo de EDA en la subregión Central que no posee servicios de recolección de basuras.

Sub-región	%	Riesgo
Boyacá, Cundinamarca, Meta	29,7	1,7
Tolima, Huila, Caquetá	28,7	1,7
Santanderes	17,3	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.19. Riesgo de EDA por número de habitantes que no poseen servicios de recolección de basuras.

Población	%	Riesgo
Menos de 10.000	59,5	595,0
10.000 a 20.000	49,4	494,0
20.000 a 50.000	45,6	456,0
50.000 a 100.000	25,3	253,0
100.000 a 200.000	16,8	168,0
200.000 a 900.000	6,7	67,0
900.000 a 3'000.000	0,8	8,0
Bogotá	0,1	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.20. Comparación de los riesgos integrados de EDA vs los riesgos comparativos.

Región	Riesgo Integrado	Riesgo Comparativo
Atlántica	70,8	118,0
Oriental	39,8	66,3
Pacífica	38,9	64,8
Central	28,9	48,2
Orinoquía-Amazonía	19,4	32,3
Bogotá	0,6	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.21. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar y el riesgo de IRA.

Área	%	Riesgo
Rural Disperso	73,4	30,6
Centro Poblado	39,9	16,6
Cabecera	2,4	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.22. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar y por subregión y su riesgo de IRA.

Región	%	Riesgo
Atlántica	22,3	223,0
Pacífica	19,4	194,0
Oriental	17,9	179,0
Central	13,7	137,0
Orinoquía-Amazonía	4,2	42,0
Bogotá	0,1	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.23. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar y por subregión y su riesgo de IRA.

Sub-región	%	Riesgo
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	39,2	392,0
Litoral Pacífico	37,1	371,0
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	34,7	347,0
Guajira, Cesar, Magdalena	27,4	274,0
Tolima, Huila, Caquetá	24,9	249,0
Antioquia (sin Medellín)	24,5	245,0
Boyacá, Cundinamarca, Meta	22,0	220,0
Santanderes	12,2	122,0
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	8,6	86,0
Caldas, Risaralda, Quindío	8,3	83,0
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	7,8	78,0
Orinoquía-Amazonia	4,2	42,0
AM Medellín	0,8	8,0
AM Cali	0,6	6,0
AM Barranquilla	0,5	5,0
Bogotá	0,1	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.24. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar en la subregión Atlántica y su riesgo de IRA.

Sub-región	%	Riesgo
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	39,2	78,4
Guajira, Cesar, Magdalena	27,4	54,8
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	7,8	15,6
AM Barranquilla	0,5	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.25. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar en la subregión Pacífica y su riesgo de IRA.

Sub-región	%	Riesgo
Litoral Pacífico	37,1	61,8
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	34,7	57,8
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	8,6	14,3
AM Cali	0,6	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.26. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar en la subregión Oriental y su riesgo de IRA.

Sub-región	%	Riesgo
Tolima, Huila, Caquetá	24,9	2,0
Boyacá, Cundinamarca, Meta	22,0	1,8
Santanderes	12,2	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.27. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar en la subregión Central y su riesgo de IRA.

Sub-región	%	Riesgo
Antioquia (sin Medellín)	24,5	30,6
Caldas, Risaralda, Quindío	8,3	10,4
AM Medellín	0,8	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.28. Porcentaje de uso de leña, madera u otro combustible para cocinar por número de habitantes y su riesgo de IRA.

Población	%	Riesgo
Menos de 10.000	55,5	555,0
10.000 a 20.000	39,6	396,0
20.000 a 50.000	33,9	339,0
50.000 a 100.000	13,3	133,0
100.000 a 200.000	11,8	118,0
200.000 a 900.000	3,7	37,0
900.000 a 3'000.000	1,4	14,0
Bogotá	0,1	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.29. Porcentaje de grado de escolaridad del cuidador.

Grado de escolaridad	%
Sin educación	56,4
Primaria	18,3
Secundaria	20,0
Técnico o tecnológico	2,8

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.30. Porcentaje de grado de escolaridad del cuidador por área y su riesgo de IRA.

Área	%	Riesgo
Cabecera	57,8	1,1
Rural Disperso	55,3	1,1
Centro Poblado	51,2	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.31. Porcentaje de grado de escolaridad del cuidador por subregión y su riesgo de IRA.

Región	%	Riesgo
Oriental	82,2	2,0
Orinoquía-Amazonía	66,3	1,6
Bogotá	61,1	1,5
Atlántica	51,0	1,3
Central	49,2	1,2
Pacífica	40,5	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.32. Porcentaje de cuidadores sin escolaridad por subregión y su riesgo de IRA.

Sub-región	%	Riesgo
Boyacá, Cundinamarca, Meta	83,2	7,9
Santanderes	80,9	7,7
AM Medellín	67,7	6,4
Caldas, Risaralda, Quindío	66,2	6,3
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	66,0	6,3
AM Barranquilla	64,8	6,2
Bogotá	61,1	5,8
Guajira, Cesar, Magdalena	56,4	5,4
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	44,3	4,2
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	41,8	4,0
Tolima, Huila, Caquetá	41,6	4,0
Litoral Pacífico	39,1	3,7
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	36,1	3,4
Antioquia (sin Medellín)	32,4	3,1
AM Cali	29,1	2,8
Orinoquía-Amazonía	10,5	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.33. Porcentaje de cuidadores sin escolaridad en la subregión Oriental y su riesgo de IRA.

Sub-región	%	Riesgo
Boyacá, Cundinamarca, Meta	83,2	2,0
Santanderes	80,9	1,9
Tolima, Huila, Caquetá	41,6	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.34. Porcentaje de cuidadores sin escolaridad en la subregión Central y su riesgo de IRA.

Sub-región	%	Riesgo
AM Medellín	67,7	2,1
Caldas, Risaralda, Quindío	66,2	2,0
Antioquia (sin Medellín)	32,4	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.35. Porcentaje de cuidadores sin escolaridad en la subregión Atlántica y su riesgo de IRA.

Sub-región	%	Riesgo
AM Barranquilla	64,8	1,6
Guajira, Cesar, Magdalena	56,4	1,3
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	44,3	1,1
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	41,8	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.36. Porcentaje de cuidadores sin escolaridad en la subregión Pacífica y su riesgo de IRA.

Sub-región	%	Riesgo
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	66,0	2,3
Litoral Pacífico	39,1	1,3
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	36,1	1,2
AM Cali	29,1	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.37. Porcentaje de cuidadores sin educación por número de habitantes y su riesgo de IRA.

Población	%	Riesgo
200.000 a 900.000	66,0	1,3
Bogotá	61,1	1,2
Menos de 10.000	59,7	1,2
100.000 a 200.000	56,9	1,2
10.000 a 20.000	56,6	1,2
900.000 a 3'000.000	51,7	1,1
50.000 a 100.000	50,1	1,0
20.000 a 50.000	49,1	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.38. Riesgo integrado va riesgo comparativo de los factores determinantes para IRA.

Región	Riesgo Integrado	Riesgo Comparativo
Oriental	100,1	1,7
Atlántica	73,3	1,2
Orinoquía-Amazonía	70,5	1,2
Central	62,9	1,1
Bogotá	61,2	1,0
Pacífica	59,9	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Cuadro 4.39. Porcentaje por áreas sin coberturas útiles de vacunación.

Área	%
Centro Poblado	23,2
Rural Disperso	22,8
Cabecera	22,8

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.40. Porcentaje de áreas sin coberturas útiles de vacunación y riesgo de enfermedades inmunoprevenibles.

Área	Riesgo	OR	chi cuadrado	P
Centro Poblado	4,64	5,74	136,74	<0,0011
Rural Disperso	4,56	5,61	132,37	<0,0011
Cabecera	4,56	5,61	132,37	<0,0011
Cobertura útil	1,00	1,00	0,00	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.41. Porcentaje por regiones sin coberturas útiles de vacunación y riesgo de enfermedades inmunoprevenibles.

Región	%
Bogotá	28,9
Pacífica	25,4
Atlántica	24,7
Oriental	24,5
Central	16,5
Orinoquía-Amazonía	10,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.42. Porcentaje por regiones sin coberturas útiles de vacunación y riesgo de enfermedades inmunoprevenibles.

Región	Riesgo	OR	<i>chi cuadrado</i>	P
Bogotá	5,8	7,7	202,9	<0,0011
Pacífica	5,1	6,5	161,4	<0,0011
Atlántica	4,9	6,2	153,5	<0,0011
Oriental	4,9	6,2	151,2	<0,0011
Central	3,3	3,8	68,9	<0,0011
Orinoquía-Amazonía	2,2	2,3	23,8	<0,0011
<i>Cobertura útil</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.43. Porcentaje por subregiones sin coberturas útiles de vacunación y riesgo de enfermedades inmunoprevenibles.

Sub-región	Riesgo	OR	chi cuadrado	P
Litoral Pacífico	8,2	13,2	365,9	<0,001
Santanderes	6,8	9,7	266,6	<0,001
AM Barranquilla	5,9	7,9	207,8	<0,001
Bogotá	5,8	7,7	202,9	<0,001
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	5,0	6,3	154,6	<0,001
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	4,9	6,2	151,2	<0,001
Guajira, Cesar, Magdalena	4,7	5,8	138,9	<0,001
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	4,5	5,5	127,0	<0,001
Tolima, Huila, Caquetá	4,4	5,3	121,6	<0,001
AM Cali	4,0	4,8	103,9	<0,001
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	4,0	4,8	102,9	<0,001
Boyacá, Cundinamarca, Meta	3,8	4,5	93,8	<0,001
AM Medellín	3,5	4,0	77,3	<0,001
Caldas, Risaralda, Quindío	3,5	4,0	76,4	<0,001
Antioquia (sin Medellín)	2,2	2,4	25,1	<0,001
Orinoquía-Amazonía	2,2	2,3	23,8	<0,001
Cobertura útil	1,0	1,0	0,0	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.44. Riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por número de habitantes.

Población	%
Bogotá	28,9
200.000 a 900.000	24,3
900.000 a 3'000.000	23,7
10.000 a 20.000	22,8
20.000 a 50.000	22,3
50.000 a 100.000	22,1
100.000 a 200.000	20,7
Menos de 10.000	9,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.45. Riesgo de enfermedades inmunoprevenibles por número de habitantes.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

Población	Riesgo	OR	chi cuadrado	P
Bogotá	5,8	7,7	202,9	<0,001
200.000 a 900.000	4,9	6,1	149,0	<0,001
900.000 a 3'000.000	4,7	5,9	142,3	<0,001
10.000 a 20.000	4,6	5,6	132,4	<0,001
20.000 a 50.000	4,5	5,5	127,0	<0,001
50.000 a 100.000	4,4	5,4	124,8	<0,001
100.000 a 200.000	4,1	5,0	110,1	<0,001
Menos de 10.000	1,9	2,0	15,6	<0,001
Cobertura útil	1,0	1,0	0,0	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.46. Porcentaje de relaciones sexuales por área y riesgo de ITS.

Área	%	Riesgo
Centro Poblado	92,8	1,01
Cabecera	92,3	1,01
Rural Disperso	91,0	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.47. Porcentaje de relaciones sexuales por regiones y riesgo de ITS.

Región	%	Riesgo
Orinoquía-Amazonía	95,4	1,07
Bogotá	94,4	1,06
Atlántica	93,8	1,05
Pacífica	93,2	1,04
Central	90,7	1,01
Oriental	89,0	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.48. Porcentaje de relaciones sexuales por subregiones y riesgo de ITS.

SUBREGIÓN	%	Riesgo
Litoral Pacífico	97,9	1,13
Orinoquía-Amazonía	95,4	1,10
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	95,2	1,10
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	94,6	1,09
AM Barranquilla	94,5	1,09
Bogotá	94,4	1,09
Guajira, Cesar, Magdalena	93,9	1,08
Caldas, Risaralda, Quindío	93,8	1,08
Santanderes	93,0	1,07
Antioquia (sin Medellín)	92,8	1,07
AM Cali	92,2	1,06
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	92,1	1,06
Tolima, Huila, Caquetá	91,7	1,06
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	86,6	1,00
AM Medellín	86,5	1,00
Boyacá, Cundinamarca, Meta	86,2	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.49. OR y Chi cuadrado del riesgo de ITS por subregión.

Sub-región	OR	chi cuadrado	p
Litoral Pacífico	7,5	93,5	<0,001
Orinoquía-Amazonía	3,3	50,7	<0,001
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	3,2	48,0	<0,001
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	2,8	40,7	<0,001
AM Barranquilla	2,8	39,5	<0,001
Bogotá	2,7	38,4	<0,001
Guajira, Cesar, Magdalena	2,5	33,1	<0,001
Caldas, Risaralda, Quindío	2,4	32,1	<0,001
Santanderes	2,1	24,8	<0,001
Antioquia (sin Medellín)	2,1	23,2	<0,001
AM Cali	1,9	18,7	<0,001
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	1,9	18,0	<0,001
Tolima, Huila, Caquetá	1,8	15,4	<0,001
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	1,0	0,1	<0,79
AM Medellín	1,0	0,0	<0,84
Boyacá, Cundinamarca, Meta	1,0	0,0	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.50. Porcentaje de relaciones sexuales por régimen de afiliación y riesgo de ITS.

Régimen	%	Riesgo
Excepción	94,8	1,03
Vinculados	93,0	1,01
Contributivo	92,8	1,01
Subsidiado	91,9	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.51. Porcentaje de relaciones sexuales en las que no se usó condón y riesgo de ITS.

Área	%	Riesgo
Centro Poblado	92,8	1,02
Cabecera	92,3	1,01
Rural Disperso	91,0	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.52. Porcentaje de relaciones sexuales en las que no se usó condón por regiones y riesgo de ITS.

Región	%	Riesgo	OR	<i>chi cuadrado</i>	p
Atlántica	86,4	1,10	1,74	21,57	<0,001
Central	83,3	1,06	1,37	7,46	0,006
Pacífica	81,8	1,04	1,23	3,42	0,064
Oriental	79,9	1,02	1,09	0,59	0,442
Bogotá	79,0	1,01	1,03	0,07	0,791
Orinoquía-Amazonía	78,5	1,00	1,00	0,00	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.53. Porcentaje de primeras relaciones sexuales en las que no se usó condón por sub regiones y riesgo de ITS.

Sub-región	%	Riesgo
Litoral Pacífico	89,0	1,13
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	87,5	1,11
Antioquia (sin Medellín)	86,8	1,10
Guajira, Cesar, Magdalena	86,5	1,10
AM Barranquilla	86,2	1,09
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	85,0	1,08
Tolima, Huila, Caquetá	83,4	1,06
AM Medellín	83,0	1,05
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	81,9	1,04
Caldas, Risaralda, Quindío	81,0	1,03
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	80,6	1,02
Boyacá, Cundinamarca, Meta	80,2	1,02
Santanderes	79,6	1,01
Bogotá	79,0	1,00
AM Cali	78,9	1,00
Orinoquía-Amazonía	78,5	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.54. Pruebas estadísticas por sub-regiones del riesgo de ITS por el no USO de condón en las relaciones sexuales.

Sub-región	OR	chi cuadrado	P
Litoral Pacífico	2,2	40,5	<0,001
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	1,9	28,7	<0,001
Antioquia (sin Medellín)	1,8	24,0	<0,001
Guajira, Cesar, Magdalena	1,8	22,2	<0,001
AM Barranquilla	1,7	20,4	<0,001
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	1,6	14,2	<0,001
Tolima, Huila, Caquetá	1,4	7,8	0,005
AM Medellín	1,3	6,5	0,011
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	1,2	3,6	0,058
Caldas, Risaralda, Quindío	1,2	1,9	0,168
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	1,1	1,4	0,237
Boyacá, Cundinamarca, Meta	1,1	0,9	0,343
Santanderes	1,0	0,1	0,752
Bogotá	1,0	0,1	0,752
AM Cali	1,0	0,1	0,752
Orinoquía-Amazonía	1,0	0,0	1,000

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.55. Porcentaje de primeras relaciones sexuales en las que no se usó condón por número de habitantes y riesgo de ITS. Pruebas estadísticas.

Población	OR	chi cuadrado	p
20.000 a 50.000	1,6	16,5	<0,001
50.000 a 100.000	1,5	10,1	0,001
10.000 a 20.000	1,4	9,4	0,002
100.000 a 200.000	1,2	3,1	0,078
Menos de 10.000	1,2	2,7	0,100
900.000 a 3'000.000	1,2	2,5	0,114
200.000 a 900.000	1,1	1,1	0,294
Bogotá	1,0	0,0	1,000

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.56. Porcentaje de primeras relaciones sexuales en las que no se usó condón por régimen de afiliación y riesgo de ITS. Pruebas estadísticas.

Régimen	%	Riesgo
Subsidiado	86,0	1,1
Vinculados	84,1	1,0
Contributivo	82,8	1,0
Excepción	81,9	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.57. Porcentaje de relaciones sexuales por área y riesgo de ITS.

Área	%	Riesgo
Centro Poblado	92,8	1,01
Cabecera	92,3	1,01
Rural Disperso	91,0	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.58. Porcentaje de relaciones sexuales por regiones y riesgo de ITS.

Región	%	Riesgo
Orinoquía-Amazonía	95,4	1,07
Bogotá	94,4	1,06
Atlántica	93,8	1,05
Pacífica	93,2	1,05
Central	90,7	1,02
Oriental	89,0	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.59. Porcentaje de relaciones sexuales por subregiones y riesgo de ITS.

Sub-región	%	Riesgo
Litoral Pacífico	97,9	1,13
Orinoquía-Amazonía	95,4	1,10
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	95,2	1,10
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	94,6	1,09
AM Barranquilla	94,5	1,09
Bogotá	94,4	1,09
Guajira, Cesar, Magdalena	93,9	1,08
Caldas, Risaralda, Quindío	93,8	1,08
Santanderes	93,0	1,07
Antioquia (sin Medellín)	92,8	1,07
AM Cali	92,2	1,06
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	92,1	1,06
Tolima, Huila, Caquetá	91,7	1,06
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	86,6	1,00
AM Medellín	86,5	1,00
Boyacá, Cundinamarca, Meta	86,2	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.60. Porcentaje de relaciones sexuales por subregiones y riesgo de ITS. Pruebas Estadísticas.

Sub-región	OR	chi cuadrado	p
Litoral Pacífico	7,5	93,5	<0,001
Orinoquía-Amazonía	3,3	50,7	<0,001
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	3,2	48,0	<0,001
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	2,8	40,7	<0,001
AM Barranquilla	2,8	39,5	<0,001
Bogotá	2,7	38,4	<0,001
Guajira, Cesar, Magdalena	2,5	33,1	<0,001
Caldas, Risaralda, Quindío	2,4	32,1	<0,001
Santanderes	2,1	24,8	<0,001
Antioquia (sin Medellín)	2,1	23,2	<0,001
AM Cali	1,9	18,7	<0,001
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	1,9	18,0	<0,001
Tolima, Huila, Caquetá	1,8	15,4	<0,001
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	1,0	0,1	0,752
AM Medellín	1,0	0,0	1,000
Boyacá, Cundinamarca, Meta	1,0	0,0	1,000

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.61. Porcentaje de relaciones sexuales por régimen de afiliación y riesgo de ITS.

Régimen	%	Riesgo
Excepción	94,8	1,03
Vinculados	93,0	1,01
Contributivo	92,8	1,01
Subsidiado	91,9	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.62. Porcentaje de relaciones sexuales por área y riesgo de ITS.

Área	%	Riesgo
Centro Poblado	92,8	1,02
Cabecera	92,3	1,01
Rural Disperso	91,0	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.63. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por regiones y riesgo de ITS.

Región	%	Riesgo	OR	chi cuadrado	p
Atlántica	86,40	1,10	1,74	21,57	<0,001
Central	83,30	1,06	1,37	7,46	0,006
Pacífica	81,80	1,04	1,23	3,42	0,064
Oriental	79,90	1,02	1,09	0,59	0,442
Bogotá	79,00	1,01	1,03	0,07	0,791
Orinoquía-Amazonía	78,50	1,00	1,00	0,00	1,000

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.64. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por sub regiones y riesgo de ITS.

Sub-región	%	Riesgo
Litoral Pacífico	89,00	1,13
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	87,50	1,11
Antioquia (sin Medellín)	86,80	1,10
Guajira, Cesar, Magdalena	86,50	1,10
AM Barranquilla	86,20	1,09
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	85,00	1,08
Tolima, Huila, Caquetá	83,40	1,06
AM Medellín	83,00	1,05
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	81,90	1,04
Caldas, Risaralda, Quindío	81,00	1,03
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	80,60	1,02
Boyacá, Cundinamarca, Meta	80,20	1,02
Santanderes	79,60	1,01
Bogotá	79,00	1,00
AM Cali	78,90	1,00
Orinoquía-Amazonía	78,50	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.65. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por sub regiones y riesgo de ITS. Pruebas estadísticas.

Sub-región	OR	chi cuadrado	p
Litoral Pacífico	2,22	40,51	<0,001
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	1,92	28,70	<0,001
Antioquia (sin Medellín)	1,80	24,02	<0,001
Guajira, Cesar, Magdalena	1,75	22,16	<0,001
AM Barranquilla	1,71	20,40	<0,001
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	1,55	14,16	0,00
Tolima, Huila, Caquetá	1,38	7,78	0,00
AM Medellín	1,34	6,51	0,01
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	1,24	3,64	0,05
Caldas, Risaralda, Quindío	1,17	1,94	0,16
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	1,14	1,36	0,24
Boyacá, Cundinamarca, Meta	1,11	0,88	0,34
Santanderes	1,04	0,11	0,74
Bogotá	1,03	0,07	0,78
AM Cali	1,02	0,05	0,82
Orinoquía-Amazonía	1,00	0,00	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.66. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por número de habitantes y riesgo de ITS.

Población	%	Riesgo
20.000 a 50.000	85,9	1,1
50.000 a 100.000	84,5	1,1
10.000 a 20.000	84,3	1,1
100.000 a 200.000	82,1	1,0
Menos de 10.000	81,9	1,0
900.000 a 3'000.000	81,8	1,0
200.000 a 900.000	80,9	1,0
Bogotá	79,0	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.67. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por número de habitantes y riesgo de ITS.

Población	OR	chi cuadrado	p
20.000 a 50.000	1,6	16,5	0,0
50.000 a 100.000	1,5	10,1	0,0
10.000 a 20.000	1,4	9,4	0,0
100.000 a 200.000	1,2	3,1	0,1
Menos de 10.000	1,2	2,7	0,1
900.000 a 3'000.000	1,2	2,5	0,1
200.000 a 900.000	1,1	1,1	0,3
Bogotá	1,0	0,0	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.68. Porcentaje de relaciones sexuales sin condón en la primera relación sexual por régimen de afiliación y riesgo de ITS.

Régimen	%	Riesgo
Subsidiado	86,0	1,1
Vinculados	84,1	1,0
Contributivo	82,8	1,0
Excepción	81,9	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.69. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas y riesgo de ETV.

Área	%	Riesgo
Rural Disperso	46,00	11,20
Centro Poblado	21,50	5,20
Cabecera	4,10	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.70. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas por sub regiones y riesgo de ETV.

Sub-región	%	Riesgo
Litoral Pacífico	49,1	70,1
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	23,9	34,1
Antioquia (Sin Medellín)	18,6	26,6
Guajira, Cesar, Magdalena	17,4	24,9
Tolima, Huila, Caquetá	10,9	15,6
Orinoquía-Amazonía	9,5	13,6
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	7,3	10,4
Caldas, Risaralda, Quindío	5,9	8,4
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	4,3	6,1
AM Cali	2,8	4,0
Santanderes	2,7	3,9
AM Medellín	0,8	1,1
AM Barranquilla	0,7	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.71. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas en la subregión y riesgo de ETV.

Sub-región	Riesgo
Litoral Pacífico	17,5
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	2,6
AM Cali	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.72. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas en la subregión Atlántica y riesgo de ETV.

Sub-región	Riesgo
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	34,1
Guajira, Cesar, Magdalena	24,9
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	6,1
AM Barranquilla	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.73. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas en la subregión Central y riesgo de ETV.

Sub-región	Riesgo
Antioquia (Sin Medellín)	23,3
Caldas, Risaralda, Quindío	7,4
AM Medellín	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.74. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas en la subregión Oriental y riesgo de ETV.

Sub-región	Riesgo
Tolima, Huila, Caquetá	4,0
Santanderes	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.75. Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas por número de habitantes y riesgo de ETV.

Población	%	Riesgo
Menos de 10.000	6,50	21,70
10.000 a 20.000	6,20	20,70
20.000 a 50.000	8,30	27,70
50.000 a 100.000	5,80	19,30
100.000 a 200.000	7,20	24,00
200.000 a 900.000	2,50	8,30
900.000 a 3'000.000	0,30	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.76. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por área y riesgo de ETV.

Área	%	Riesgo
Cabecera	7,2	8,0
Centro Poblado	4,0	4,4
Rural Disperso	0,9	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.77. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por regiones y riesgo de ETV.

Región	%	Riesgo
Oriental	7,90	2,55
Atlántica	7,60	2,45
Pacífica	4,80	1,55
Central	3,60	1,16
Orinoquía-Amazonía	3,10	1,00

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.71. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por regiones y riesgo de ETV.

Sub-región	%	Riesgo
AM Barranquilla	21,1	35,2
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	12,1	20,2
AM Cali	11,4	19,0
Santanderes	7,9	13,2
Caldas, Risaralda, Quindío	6,7	11,2
Guajira, Cesar, Magdalena	4,9	8,2
Tolima, Huila, Caquetá	4,5	7,5
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	3,9	6,5
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	3,4	5,7
Orinoquía-Amazonía	3,1	5,2
AM Medellín	2,6	4,3
Antioquia (Sin Medellín)	1,5	2,5
Litoral Pacífico	0,6	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.72. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Atlántica y riesgo de ETV.

Sub-región	%	Riesgo
AM Barranquilla	21,1	5,4
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	12,1	3,1
Guajira, Cesar, Magdalena	4,9	1,3
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	3,9	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.73. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Pacífica y riesgo de ETV.

Sub-región	%	Riesgo
AM Cali	11,4	19,0
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	3,4	5,7
Litoral Pacífico	0,6	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.74. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Oriental y riesgo de ETV.

Sub-región	%	Riesgo
Santanderes	7,9	1,8
Tolima, Huila, Caquetá	4,5	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.75. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca en la región Oriental y riesgo de ETV.

Sub-región	%	Riesgo
Caldas, Risaralda, Quindío	6,7	4,5
AM Medellín	2,6	1,7
Antioquia (Sin Medellín)	1,5	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.76. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por número de habitantes y riesgo de ETV.

Población	%	Riesgo
Menos de 10.000	1,7	1,0
10.000 a 20.000	3,2	1,9
20.000 a 50.000	2,3	1,4
50.000 a 100.000	6,9	4,1
100.000 a 200.000	4,9	2,9
200.000 a 900.000	8,2	4,8
900.000 a 3'000.000	8,1	4,8

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.77. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por NBI y riesgo de ETV.

Población por NBI	%	Riesgo
NI pobreza NI Miseria	7,0	5,8
Pobreza y NO Miseria	4,4	3,7
Miseria	1,2	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.78. Porcentaje de viviendas que no lavan la alberca por área y riesgo de ETV.

Área	%	Riesgo
Centro Poblado	28,9	1,5
Rural Disperso	24,4	1,3
Cabecera	19,1	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.79. Porcentaje de viviendas con tanque adicional sin tapa por sub regiones y riesgo de ETV.

Sub-región	%	Riesgo
Tolima, Huila, Caquetá	33,9	3,5
Antioquia (Sin Medellín)	32,6	3,4
Orinoquía-Amazonía	28,7	3,0
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	25,7	2,6
Litoral Pacífico	24,5	2,5
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	18,4	1,9
Guajira, Cesar, Magdalena	18,4	1,9
AM Medellín	17,7	1,8
AM Cali	16,2	1,7
Caldas, Risaralda, Quindío	15,7	1,6
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	14,2	1,5
AM Barranquilla	11,9	1,2
Santanderes	9,7	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.80. Riesgo de ETV en la subregión Oriental.

Sub-región	%	Riesgo
Tolima, Huila, Caquetá	33,9	3,5
Santanderes	9,7	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.81. Riesgo de ETV en la subregión Central.

Sub-región	%	Riesgo
Antioquia (Sin Medellín)	32,6	2,1
AM Medellín	17,7	1,1
Caldas, Risaralda, Quindío	15,7	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Cuadro 4.82. Riesgo de ETV en la subregión Atlántica.

Sub-región	%	Riesgo
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	25,7	2,2
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	18,4	1,5
Guajira, Cesar, Magdalena	18,4	1,5
AM Barranquilla	11,9	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.83. Riesgo de ETV en la subregión Pacífica.

Sub-región	%	Riesgo
Litoral Pacífico	24,5	1,7
AM Cali	16,2	1,1
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	14,2	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.84. Porcentaje de viviendas con tanque adicional sin tapa por número de habitantes y riesgo de ETV.

Población	%	Riesgo
10.000 a 20.000	31,1	2,3
Menos de 10.000	29,3	2,2
20.000 a 50.000	28,2	2,1
50.000 a 100.000	21,1	1,6
900.000 a 3'000.000	18,2	1,4
100.000 a 200.000	17,2	1,3
200.000 a 900.000	13,5	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 4.85. Porcentaje de viviendas con tanque adicional sin tapa por NBI y riesgo de ETV.

Población porNBI	%	Riesgo
Pobreza y NO Miseria	27,6	1,5
Miseria	24,9	1,3
NI pobreza NI Miseria	18,8	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

TOMO VI

ANEXOS CAPÍTULO V:

ANÁLISIS DE DESIGUALDADES EN EL RIESGO DE LESIONES EXTERNAS. ACCIDENTES DE TRÁNSITO

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 5.2. Número de accidentes de tránsito en el 2006 reportados. Casos ponderados por factor final ajustado por estructura poblacional y no respuesta persona, ENS 2007.

Gráfico 5.3. Muertos y lesionados por accidente de tránsito según condición de la víctima. Colombia, 2007.

Gráfico 5.4. Accidente de tránsito según medio de transporte habitual al trabajo en relación con el medio de menor accidentalidad (bus, buseta, colectivo) 2005 a 2007, ENS 2007.

Gráfico 5.5. Diferencia de proporción entre accidentes en bicicleta y total accidentes por estrato socioeconómico, ENS 2007.

Gráfico 5.6. Lesiones informadas en el último accidente, de quienes reportaron haber sufrido un accidente de tránsito en los últimos tres años, ENS 2007.

Gráfico 5.7. Proporción de lesiones en último accidente de tránsito: golpes y heridas superficiales según estrato socioeconómico, ENS 2007.

Gráfico 5.8. Proporción de lesiones en último accidente de tránsito: fracturas y contusiones cráneo-encefálicas, según estrato socioeconómico, ENS 2007.

Gráfico 5.9. Proporción de lesiones en último accidente de tránsito: daño o pérdida de órganos, según estrato socioeconómico, ENS 2007.

Gráfico 5.10. Casos de accidentes de tránsito por razones por las cuales se encontraba en la calle al momento del accidente, ENS 2007.

Gráfico 5.11. Análisis de correspondencia múltiple para caracterización social de las personas.

Gráfico 5.12. Análisis de correspondencia múltiple para caracterización social de las personas.

LISTA DE CUADROS

Cuadro 5.1. Muertes violentas según manera 2006 - 2008.

Cuadro 5.2. Lesiones no fatales por 100.000, según etiología, 2006-2008.

Cuadro 5.3. Proporción de lesiones causadas por accidente o violencia.

Cuadro 5.4. Principal razón de la última consulta relacionada con la salud.

Cuadro 5.5. Causa de la última hospitalización.

Cuadro 5.6. En el 2005, ¿Tuvo usted algún accidente de tránsito?

Cuadro 5. 1. En el 2006 o en lo que va corrido del 2007, ¿Tuvo usted algún accidente de tránsito?

Cuadro 5. 2. Proporción de accidentes en motocicleta en Colombia, años 2005, 2006 y 2007 (parcial).

Cuadro 5. 9. Proporción de las principales razones por las cuales la persona se encontraba en la calle al momento del accidente, según sexo. ENS, 2007.

Cuadro 5.10. Proporción de las principales razones por las cuales la persona se encontraba en la calle al momento del accidente, según área. ENS, 2007.

Cuadro 5. 3. Proporción de las personas que han sufrido un accidente de tránsito alguna vez en la vida.

Cuadro 5.12. Proporción de las personas que afirmaron sufrir algún tipo de lesión (morados, dolores o pérdida de alguna parte del cuerpo) en alguno de los accidentes de tránsito que tuvo.

Cuadro 5.13. Proporción de personas que sufrieron una lesión o herida en el último accidente.

Cuadro 5.14. Proporción de las principales razones por las cuales la persona se encontraba en la calle al momento del accidente.

Cuadro 5.15. Proporción de las actividades realizadas la mayor parte del tiempo.


Cuadro 5. 4. Posición ocupacional de los individuos que sufrieron accidentes.

Cuadro 5. 5. Estrato socioeconómico de acuerdo con la tarifa de energía eléctrica.

Cuadro 5. 6. Proporción del medio de transporte utilizado para desplazarse.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

GRÁFICOS



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 5.1. Causa de la última hospitalización, ENS 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 5.2. Número de accidentes de tránsito en el 2006 reportados. Casos ponderados por factor final ajustado por estructura poblacional y no respuesta persona, ENS 2007.

Muertos


Lesionados



Fuente: Forero 2008. Muertes y Lesiones por Accidente de Tránsito Colombia, 2007.


Gráfico 5.3. Muertos y lesionados por accidente de tránsito según condición de la víctima. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 5.4. Accidente de tránsito según medio de transporte habitual al trabajo en relación con el medio de menor accidentalidad (bus, buseta, colectivo) 2005 a 2007, ENS 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 5.5. Diferencia de proporción entre accidentes en bicicleta y total accidentes por estrato socioeconómico, ENS 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 5.6. Lesiones informadas en el último accidente, de quienes reportaron haber sufrido un accidente de tránsito en los últimos tres años, ENS 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 5.7. Proporción de lesiones en último accidente de tránsito: golpes y heridas superficiales según estrato socioeconómico, ENS 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 5.8. Proporción de lesiones en último accidente de tránsito: fracturas y contusiones craneo-encefálicas, según estrato socioeconómico, ENS 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 5.9. Proporción de lesiones en último accidente de tránsito: daño o pérdida de órganos, según estrato socioeconómico, ENS 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Razón por la que se encontraba en la calle

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 5.10. Casos de accidentes de tránsito por razones por las cuales se encontraba en la calle al momento del accidente, ENS 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico5.11. Análisis de correspondencia múltiple para caracterización social de las personas.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico5.12. Análisis de correspondencia múltiple para caracterización social de las personas.

CUADROS

Cuadro 5.1. Muertes violentas según manera 2006 - 2008.

Manera	Casos		Variación	
	2006	2008	Absoluta	Relativa
Homicidio	16.274	15.250	-1.024	-6,29%
Accidente de Tránsito	5.486	5.670	184	3,35%
Otros accidentes	3.087	3.214	127	4,11%
Suicidio	1.751	1.840	89	5,08%
Violenta indeterminada	936	984	48	5,13%
Total	27.534	29.433	1.899	6,90%

Fuente: INML y CF. FORENSIS 2007 y 2008.

Cuadro 5.2. Lesiones no fatales por 100.000, según etiología, 2006-2008.

Etiología	Casos		Variación	
	2006	2008	Absoluta	Relativa
Violencia interpersonal	119.099	126.869	7.770	6,52%
Violencia intrafamiliar	72.849	89.803	16.954	23,27%
Accidente de tránsito	40.114	45.888	5.774	14,39%
Sexológicos	19.592	21.202	1.610	8,22%
Otras lesiones accidentales	6.602	8.394	1.792	27,14%
Total	258.256	292.156	33.900	13,13%

Fuente: INML y CF. FORENSIS 2007 y 2008.

Cuadro 5.3. Proporción de lesiones causadas por accidente o violencia.

Tuvo alguna lesión	No.	%
Si	1.167.822	3,2
No	35.472.071	96,8
Total	36.639.893	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 5.4. Principal razón de la última consulta relacionada con la salud.

Causa última consulta	No.	%
Enfermedad física no obstétrica	11.374.367	31,0
Enfermedad física o malestar obstétrico	513.494	1,4
Problema mental, emocional, de los nervios o de comportamiento	194.816	0,5
Disminución en capacidad para hacer cosas	120.979	0,3
Lesión por accidente o violencia	582.442	1,6
Problema o enfermedad de la boca o los dientes	536.124	1,5
Chequeo médico de persona sana	2.594.971	7,1
Cirugía Ambulatoria	161.354	0,4
Estética	21.972	0,1
Vacunación	21.455	0,1
Citología	236.274	0,6
Atención parto, puerperio o del recién nacido	157.413	0,4
Control post-operatorio	115.603	0,3
Control de planificación familiar	90.317	0,2
Control prenatal	188.001	0,5
Control de crecimiento y desarrollo	191.613	0,5
Atención preventiva en salud bucal	876.647	2,4
Otra atención preventiva	556.273	1,5
Total	18.534.114	50,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5.5. Causa de la última hospitalización.

Causa última hospitalización	No.	%
Enfermedad física no obstétrica	1.355.550	3,7
Enfermedad física o malestar obstétrico	234.435	0,6
Problema mental, emocional, de los nervios o de comportamiento	39.283	0,1
Lesión por accidente o violencia	226.563	0,6
Estética	3.254	0,0
Atención parto, puerperio o del recién nacido	344.542	0,9
Total	2.203.628	6,0

Fuente: INML y CF. FORENSIS 2007 y 2008.

Cuadro 5.6. En el 2005, ¿Tuvo usted algún accidente de tránsito?

Tuvo algún accidente de tránsito	No.	%
Si	616.375	1,7
No	36.023.165	98,3
Total	36.639.539	100,0

Fuente: INML y CF. FORENSIS 2007 y 2008.

Cuadro 5. 7. En el 2006 o en lo que va corrido del 2007, ¿Tuvo usted algún accidente de tránsito?

2006		
Tuvo algún accidente de tránsito	No.	%
Si	805.386	2,2
No	35.834.154	97,8
Total	36.639.539	100,0
2007		
Tuvo algún accidente de tránsito	No.	%
Si	794.080	2,2
No	35.845.460	97,8
Total	36.639.539	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5. 8. Proporción de accidentes en motocicleta en Colombia, años 2005, 2006 y 2007 (parcial).

Años	% Peatón	% Pasajero	% Conductor	% Ciclista	% Motociclista
2005	15,7	29,2	26,6	16,2	12,3
2006	12,1	28,2	26,8	14,4	18,6
2007	11,3	28,1	28,2	12,9	19,5

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5. 9. Proporción de las principales razones por las cuales la persona se encontraba en la calle al momento del accidente, según sexo. ENS, 2007.

Razón por la cual usted se encontraba en la calle en el momento del accidente	Sexo				Total	
	Hombre		Mujer			
	No.	%	No.	%	No.	%
Trasladándose desde o hacia el trabajo/estudio	333.915	25,4	185.436	26,9	519.351	26,0
Trabajando	252.530	19,2	28.008	4,1	280.538	14,0
Haciendo diligencias personales o familiares	343.820	26,2	260.371	37,8	604.191	30,2
En recreación o descanso	382.103	29,1	214.358	31,1	596.461	29,8
Total	1.312.368	100,0	688.173	100,0	2.000.541	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5.10. Proporción de las principales razones por las cuales la persona se encontraba en la calle al momento del accidente, según área. ENS, 2007.

Razón por la cual usted se encontraba en la calle en el momento del accidente	Área						Total	
	Cabecera		Centro poblado		Rural disperso			
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Trasladándose desde o hacia el trabajo/estudio	440.007	26,3	50.927	23,4	28.417	25,5	519.351	26,0
Trabajando	250.161	15,0	19.922	9,1	10.456	9,4	280.539	14,0
Haciendo diligencias personales o familiares	488.684	29,2	74.261	34,1	41.245	37,1	604.190	30,2
En recreación o descanso	492.333	29,5	72.981	33,5	31.147	28,0	596.461	29,8
Total	1.671.185	100,0	218.091	100,0	111.265	100,0	2.000.541	100,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5.9. Proporción de las personas que han sufrido un accidente de tránsito alguna vez en la vida.

Alguna vez en la vida, tuvo un accidente de tránsito	No.	%
Si	4.278.286	11,7
No	30.360.714	82,9
Total	34.639.000	94,5

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5.12. Proporción de las personas que afirmaron sufrir algún tipo de lesión (morados, dolores o pérdida de alguna parte del cuerpo) en alguno de los accidentes de tránsito que tuvo.

Sufrió alguna lesión	No.	%
Sí	3.132.734	8,5
No	1.088.587	3,0
No Recuerda	56.965	0,2
Total	4.278.286	11,7

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5.13. Proporción de personas que sufrieron una lesión o herida en el último accidente.

Sufrió alguna lesión o herida	No.	%
Sí	1.287.317	3,5
No	713.222	1,9
Total	2.000.539	5,5

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5.14. Proporción de las principales razones por las cuales la persona se encontraba en la calle al momento del accidente.

Razón por la cual se encontraba en la calle en el momento del accidente	No.	%
Trasladándose desde o hacia el trabajo/estudio	519.351	1,4
Trabajando	280.538	0,8
Haciendo diligencias personales o familiares	604.190	1,6
En recreación o descanso	596.460	1,6
Total	2.000.539	5,5

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5.15. Proporción de las actividades realizadas la mayor parte del tiempo.

Actividad desempeñada	No.	%
Trabajando	3.320.990	60,08
Busca trabajo	226.772	4,10
Estudiando	390.318	7,06
Oficios del hogar	1.437.820	26,01
Otra actividad	92.238	1,67
Incapacitado permanente	59.896	1,08

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Cuadro 5. 10. Posición ocupacional de los individuos que sufrieron accidentes.

Posición ocupacional	No.	%
Empleado u obrero del particular	1.792.428	48,43
Empleado u obrero del gobierno	187.836	5,08
Jornalero o peón	71.182	1,92
Empleado doméstico	169.012	4,57
Profesional independiente	116.855	3,16
Cuenta propia	1.255.440	33,92
Patrón o empleador	29.407	0,79
Trabajador de finca propia	12.531	0,34
Trabajador familiar sin remuneración	55.522	1,50
Ayudante sin remuneración	10.665	0,29

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 5. 11. Estrato socioeconómico de acuerdo con la tarifa de energía eléctrica.

Estrato	No.	%
Uno	923.695	18,40
Dos	2.173.580	43,30
Tres	1.590.995	31,69
Cuatro	238.407.3	4,75
Cinco y seis	93.316.05	1,86

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Cuadro 5. 12. Proporción del medio de transporte utilizado para desplazarse.

Medio de transporte	No.	%
Bus intermunicipal	243.590	8,43
Bus. urbano	933.867	32,33
A pie	904.769	31,32
Transmilenio	43.874	1,52
Taxi	71.003	2,46
Transporte de la empresa	69.267	2,40
Carro particular	148.877	5,15
Acuático	8.274.331	0,29
Transporte animal	4.619	0,16
Moto	319.923	11,07
Bicicleta	140.683	4,87

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

TOMO VI

ANEXOS CAPÍTULO VI:

ANÁLISIS DE DESIGUALDADES EN MORBILIDAD SENTIDA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 6.1. Proporción de personas que perciben su salud como buena o mala según la subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.2. Proporción de personas según la percepción de lesión causada por accidente o violencia, para cada uno de los sexos. Colombia, 2007.

Gráfico 6.3. Proporción de personas que percibieron una lesión causada por accidente o violencia, según la subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.4. Proporción de personas que percibieron una lesión causada por accidente o violencia, según la etnia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.5. Proporción de personas que percibieron un problema de salud mental, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.6. Proporción de personas que percibieron un problema de salud mental, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.7. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.8. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según nivel de pobreza. Colombia, 2007.

Gráfico 6.9. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.10. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según región de residencia, Colombia, 2007.

Gráfico 6.11. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.12. Proporción de personas que expresaron haber tenido días de incapacidad, según etnia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.13. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.14. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.15. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 6.16. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.17. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.18. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según subregión. Colombia, 2007.

Gráfico 6.19. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

Gráfico 6.20. Proporción de personas que expresaron haber demandado servicios de salud por problemas en salud en los últimos 30 días, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.21. Proporción de personas que expresaron haber demandado servicios de salud por los problemas en salud en los últimos 30 días, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.22. Proporción de personas que consultaron o pidieron ayuda de alguien por asuntos relacionados con la salud, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.23. Proporción de personas que consultaron o pidieron ayuda de alguien por asuntos relacionados con la salud en los últimos días, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 6.24. Proporción de personas que consultaron a un profesional la última vez que buscó ayuda por asuntos relacionados con la salud, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.25. Proporción de personas que consultaron a un profesional o a otra persona, la última vez que buscó ayuda por asuntos relacionados con la salud, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.26. Proporción de personas que consultaron a un profesional la última vez que buscó ayuda por asuntos relacionados con la salud, según subregión. Colombia, 2007.

Gráfico 6.27. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.28. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.29. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 6.30. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.31. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.32. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según subregión. Colombia, 2007.

Gráfico 6.33. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

Gráfico 6.34. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron atendidos, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.35. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron o no atendidos, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.36. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron o no atendidos, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 6.37. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron atendidos, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.38. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron atendidos, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.39. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron atendidos, según etnia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.40. Proporción de personas en cada uno de los lugares a donde fue la última vez para el tratamiento de las lesiones sufridas en un accidente, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.41. Proporción de personas en cada uno de los lugares a donde fue la última vez para el tratamiento de las lesiones sufridas en un accidente, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.42. Proporción de personas en cada uno de los lugares a donde fue la última vez para el tratamiento de las lesiones sufridas en un accidente, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.43. Proporción de personas en cada uno de los lugares a donde fue la última vez para el tratamiento de las lesiones sufridas en un accidente, según etnia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.44. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.45. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 6.46. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.47. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.48. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.49. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

Gráfico 6.50. Proporción de población en cada una de las personas consultadas para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.51. Proporción de población en cada una de las personas consultadas para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 6.52. Distribución relativa del tiempo del último control de hipertensión arterial, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.53. Proporción de personas con diagnóstico de hipertensión que asistieron a una consulta de control de hipertensión arterial en el último año, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.54. Proporción de personas que asistieron a una consulta de control de hipertensión arterial en el último año, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 6.55. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de los sexos. Colombia, 2007.

Gráfico 6.56. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de los niveles educativos. Colombia, 2007.

Gráfico 6.57. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de los regímenes de seguridad social. Colombia, 2007.

Gráfico 6.58. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de los NBI. Colombia, 2007

Gráfico 6.59. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de las áreas de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.60. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de las regiones donde reside la población. Colombia, 2007

Gráfico 6.61. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de las actividades que desempeñaba. Colombia, 2007.

Gráfico 6.62. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.63. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.64. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.

Gráfico 6.65. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 6.66. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.67. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.68. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.69. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año para control de la diabetes, según actividad económica. Colombia, 2007.

Gráfico 6.70. Distribución relativa del tiempo del último control médico de la diabetes, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.71. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.72. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 6.73. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.74. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.75. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.76. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

Gráfico 6.77. Proporción de personas con dolor de espalda, cuello o nuca, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.78. Proporción de personas con dolor de espalda, cuello o nuca, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.

Gráfico 7.79. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 6.80. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.

Gráfico 6.81. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según NBI. Colombia, 2007.


Gráfico 6.82. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.83. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 6.84. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según subregión de residencia. Colombia, 2007.


Gráfico 6.85. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

GRÁFICOS



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.1. Proporción de personas que perciben su salud como buena o mala según la subregión de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.2. Proporción de personas según la percepción de lesión causada por accidente o violencia, para cada uno de los sexos. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.3. Proporción de personas que percibieron una lesión causada por accidente o violencia, según la subregión de residencia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 6.4. Proporción de personas que percibieron una lesión causada por accidente o violencia, según la etnia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.5. Proporción de personas que percibieron un problema de salud mental, según región de residencia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.6. Proporción de personas que percibieron un problema de salud mental, según subregión de residencia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.7. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según sexo. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.8. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según nivel de pobreza. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.9. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.10. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según región de residencia, Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.11. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según subregión de residencia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.12. Proporción de personas que expresaron haber tenido días de incapacidad, según etnia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.13. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según sexo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.14. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según nivel educativo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.15. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según NBI. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.16. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.17. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según región de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.18. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según subregión. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.19. Proporción de personas que expresaron haber reducido su actividad diaria debido a un problema de salud, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.20. Proporción de personas que expresaron haber demandado servicios de salud por problemas en salud en los últimos 30 días, según sexo. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.21. Proporción de personas que expresaron haber demandado servicios de salud por los problemas en salud en los últimos 30 días, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.22. Proporción de personas que consultaron o pidieron ayuda de alguien por asuntos relacionados con la salud, según sexo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.23. Proporción de personas que consultaron o pidieron ayuda de alguien por asuntos relacionados con la salud en los últimos días, según NBI. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.24. Proporción de personas que consultaron a un profesional la última vez que buscó ayuda por asuntos relacionados con la salud, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.25. Proporción de personas que consultaron a un profesional o a otra persona, la última vez que buscó ayuda por asuntos relacionados con la salud, según región de residencia. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.26. Proporción de personas que consultaron a un profesional la última vez que buscó ayuda por asuntos relacionados con la salud, según subregión. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.27. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según sexo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.28. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según nivel educativo. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.29. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según NBI. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.30. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según sexo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.31. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según región de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.32. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según subregión. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.33. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que demandaron servicios de salud, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.34. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron atendidos, según sexo. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.35. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron o no atendidos, según nivel educativo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.36. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron o no atendidos, según NBI. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.37. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron atendidos, según región de residencia. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico6.38. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron atendidos, según subregión de residencia. Colombia,2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.39. Proporción de personas que sufrieron un accidente y que fueron atendidos, según etnia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.40. Proporción de personas en cada uno de los lugares a donde fue la última vez para el tratamiento de las lesiones sufridas en un accidente, según nivel educativo. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.41. Proporción de personas en cada uno de los lugares a donde fue la última vez para el tratamiento de las lesiones sufridas en un accidente, según área de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.42. Proporción de personas en cada uno de los lugares a donde fue la última vez para el tratamiento de las lesiones sufridas en un accidente, según región de residencia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.43. Proporción de personas en cada uno de los lugares a donde fue la última vez para el tratamiento de las lesiones sufridas en un accidente, según etnia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.44. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según sexo. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.45. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según NBI. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.46. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.47. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según región de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.48. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según subregión de residencia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.49. Proporción de personas que ha recibido aplicaciones o enjuagues de flúor en el último año, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.50. Proporción de población en cada una de las personas consultadas para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según sexo. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.51. Proporción de población en cada una de las personas consultadas para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según NBI. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.52. Distribución relativa del tiempo del último control de hipertensión arterial, según sexo. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.53. Proporción de personas con diagnóstico de hipertensión que asistieron a una consulta de control de hipertensión arterial en el último año, según nivel educativo. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.54. Proporción de personas que asistieron a una consulta de control de hipertensión arterial en el último año, según NBI. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.55. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de los sexos. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.56. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de los niveles educativos. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.57. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de los regímenes de seguridad social. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.58. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de los NBI. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.59. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de las áreas de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.60. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de las regiones donde reside la población. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.61. Proporción de personas según el número de veces que asistió a control de hipertensión arterial en el último año, para cada uno de las actividades que desempeñaba. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.62. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según sexo. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.63. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según nivel educativo. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.64. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.65. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según NBI. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.66. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.67. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según región de residencia. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.68. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.69. Proporción de personas que asistieron a consulta nutricional el último año para control de la diabetes, según actividad económica. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.70. Distribución relativa del tiempo del último control médico de la diabetes, según sexo. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.71. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según nivel educativo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.72. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según NBI. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.73. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.74. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según región de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.75. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según subregión de residencia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.76. Proporción de personas que asistieron a consulta médica de control de la diabetes en los últimos seis meses, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.77. Proporción de personas con dolor de espalda, cuello o nuca, según sexo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.78. Proporción de personas con dolor de espalda, cuello o nuca, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.79. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según sexo. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.80. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.81. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según NBI. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 6.82. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.83. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según región de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.84. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 6.85. Proporción de personas que buscaron consejo o tratamiento para el dolor de espalda, cuello o nuca sentido en los últimos 7 días, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

TOMO VI

ANEXOS CAPÍTULO VII:

ANÁLISIS DE DESIGUALDADES SOBRE BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 7.1. Proporción de personas en cada una de las razones expuestas para no demandar servicios de salud por problemas en salud en los últimos 30 días, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.2. Proporción de personas que demandaron servicios de salud, por problemas en salud en los últimos 30 días, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

Gráfico 7.3. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.4. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 7.5. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.6. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.7. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según actividad desempeñada por las personas. Colombia, 2007.

Gráfico 7.8. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según etnia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.9. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario por asistir a una consulta, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.10. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario por asistir a una consulta, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.11. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario por asistir a una consulta, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.12. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario por asistir a una consulta, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.13. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario por asistir a una consulta, según subregión de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.14. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.15. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.16. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 7.17. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según área. Colombia, 2007.

Gráfico 7.18. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.19. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según subregión. Colombia, 2007.

Gráfico 7.20. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.21. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.22. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.23. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.24. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según actividad que desempeñaba. Colombia, 2007.

Gráfico 7.25. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según etnia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.26. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.27. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.28. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.

Gráfico 7.29. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 7.30. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.31. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.32. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

Gráfico 7.33. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según etnia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.34. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no demandar servicios para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.35. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no demandar servicios para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 7.36. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no demandar servicios para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.37. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no demandar servicios para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.38. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no demandar servicios para atender alguno de los problemas dentales, que ha tenido en los últimos 30 días, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

Gráfico 7.39. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.40. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.

Gráfico 7.41. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 7.42. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según nivel del SISBEN. Colombia, 2007.

Gráfico 7.43. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.44. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según región. Colombia, 2007.

Gráfico 7.45. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según etnia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.46. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.47. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según nivel educativo, Colombia, 2007.

Gráfico 7.48. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 7.49. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.50. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según región. Colombia, 2007.

Gráfico 7.51. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según etnia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.52. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no asistir a control de la diabetes en los últimos seis meses, según NBI. Colombia, 2007.

Gráfico 7.53. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no asistir a control de la diabetes en los últimos seis meses, según área de residencia. Colombia 2007.

Gráfico 7.54. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no asistir a control de la diabetes en los últimos seis meses, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.55. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no asistir a control de diabetes en los últimos seis meses, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

Gráfico 7.56. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no demandar servicios de salud cuando sufren dolor de espalda, cuello o nuca, según sexo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.57. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no demandar servicios de salud cuando sufren dolor de espalda, cuello o nuca, según nivel educativo. Colombia, 2007.

Gráfico 7.58. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no demandar servicios de salud cuando sufren dolor de espalda, cuello o nuca, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.

Gráfico 7.59. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no demandar servicios de salud cuando sufren dolor de espalda, cuello o nuca, según NBI. Colombia, 2007.


Gráfico 7.60. Proporción de personas en cada una de las principales razones para no consultar a un profesional de la salud para el tratamiento del dolor de espalda, cuello o nuca que ha sentido, según área de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.61. Proporción de personas en cada una de las principales razones para no consultar a un profesional de la salud para el tratamiento del dolor de espalda, cuello o nuca que ha sentido, según región de residencia. Colombia, 2007.

Gráfico 7.62. Proporción de personas en cada una de las principales razones para no consultar a un profesional de la salud para el tratamiento del dolor de espalda, cuello o nuca que ha sentido, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

Gráfico 7.63. Proporción de personas en cada una de las principales razones para no consultar a un profesional de la salud para el tratamiento del dolor de espalda, cuello o nuca que ha sentido, según etnia. Colombia, 2007.


GRÁFICOS



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.1. Proporción de personas en cada una de las razones expuestas para no demandar servicios de salud por problemas en salud en los últimos 30 días, según región de residencia. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.2. Proporción de personas que demandaron servicios de salud, por problemas en salud en los últimos 30 días, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.3. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según nivel educativo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.4. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según NBI. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.5. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según región de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.6. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según subregión de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.7. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según actividad desempeñada por las personas. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.8. Proporción de personas para cada una de las entidades o personas que asumieron la mayor parte del gasto de la atención, según etnia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.9. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario por asistir a una consulta, según sexo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.10. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario por asistir a una consulta, según nivel educativo. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.11. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario por asistir a una consulta, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.12. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario por asistir a una consulta, según región de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.13. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario por asistir a una consulta, según subregión de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.14. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según sexo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.15. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según nivel educativo. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.16. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según NBI. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.17. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según área. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.18. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según región de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.19. Proporción de personas a quienes les descontaron el salario del tiempo no trabajado por asistir a la última hospitalización, según subregión. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.20. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según sexo. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.21. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según nivel educativo. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.22. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según área de residencia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.23. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según región de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.24. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según actividad que desempeñaba. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.25. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no buscar atención por las lesiones sufridas en el último accidente, según etnia. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.26. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según sexo. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.27. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según nivel educativo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.28. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.29. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según NBI. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.30. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.31. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según región de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.32. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.33. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerle aplicaciones o enjuagues de flúor en los últimos 12 meses al niño o niña, según etnia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.34. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no demandar servicios para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según nivel educativo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.35. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no demandar servicios para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según NBI. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.36. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no demandar servicios para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según área de residencia. Colombia, 2007.




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.37. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no demandar servicios para atender alguno de los problemas dentales, de la boca o de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según región. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

de las encías que ha tenido en los últimos 30 días, según región de residencia. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.38. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no demandar servicios para atender alguno de los problemas dentales, que ha tenido en los últimos 30 días, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.39. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según sexo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.40. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.41. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según NBI. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.42. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según nivel del SISBEN. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.43. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según sexo. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007




Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.44. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según región. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.45. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no hacerse vacunar contra la fiebre amarilla, según etnia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.46. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según sexo. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.47. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según nivel educativo, Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.48. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según NBI. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.49. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.50. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según región. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.51. Proporción de personas en cada una de las principales razones señaladas para no ir a control de la hipertensión arterial, según etnia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.52. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no asistir a control de la diabetes en los últimos seis meses, según NBI. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.53. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no asistir a control de la diabetes en los últimos seis meses, según área de residencia. Colombia 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.54. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no asistir a control de la diabetes en los últimos seis meses, según región de residencia. Colombia, 2007.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.55. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no asistir a control de diabetes en los últimos seis meses, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.56. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no demandar servicios de salud cuando sufren dolor de espalda, cuello o nuca, según sexo. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.57. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no demandar servicios de salud cuando sufren dolor de espalda, cuello o nuca, según nivel educativo. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.58. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no demandar servicios de salud cuando sufren dolor de espalda, cuello o nuca, según régimen de seguridad social. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.59. Proporción de personas en cada una de las razones dadas para no demandar servicios de salud cuando sufren dolor de espalda, cuello o nuca, según NBI. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.60. Proporción de personas en cada una de las principales razones para no consultar a un profesional de la salud para el tratamiento del dolor de espalda, cuello o nuca que ha sentido, según área de residencia. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Gráfico 7.61. Proporción de personas en cada una de las principales razones para no consultar a un profesional de la salud para el tratamiento del dolor de espalda, cuello o nuca que ha sentido, según región de residencia. Colombia, 2007.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.62. Proporción de personas en cada una de las principales razones para no consultar a un profesional de la salud para el tratamiento del dolor de espalda, cuello o nuca que ha sentido, según actividad desempeñada. Colombia, 2007.



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 7.63. Proporción de personas en cada una de las principales razones para no consultar a un profesional de la salud para el tratamiento del dolor de espalda, cuello o nuca que ha sentido, según etnia. Colombia, 2007.

TOMO VI

ANEXOS CAPÍTULO VIII:

**ANÁLISIS DE DESIGUALDADES EN LA
MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA,
AÑO 2006**

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico8.1. Tasas de mortalidad específicas por edad (por 1.000) según área de residencia. Colombia, 2006

Gráfico8.2. Relación entre las tasas de mortalidad específicas por edad de la población residente en la cabecera municipal y en el área rural. Colombia, 2006

Gráfico8.3. Tasas de mortalidad específicas por edad (por 1.000) según sexo. Colombia, 2006

Gráfico8.4. Relación entre tasas de mortalidad específicas por edad de la población masculina y femenina. Colombia, 2006

Gráfico8.5. Tasas de mortalidad específicas por edad (por 1.000) de la población femenina según área de residencia. Colombia, 2006.

Gráfico8.6. Relación entre tasas de mortalidad específicas por edad de la población femenina residente en la cabecera municipal y en el área rural. Colombia, 2006

Gráfico8.7. Tasas de mortalidad específicas por edad (por 1.000) de la población masculina según área de residencia. Colombia, 2006

Gráfico8.8. Relación entre tasas de mortalidad de la población masculina residente en la cabecera municipal y en el área rural. Colombia, 2006

Gráfica8.9. Tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad por regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud. Colombia, 2006

Gráfico 8.10. Tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad de los afiliados al Régimen Contributivo y Subsidiado del SGSSS, según sexo y área de residencia. Colombia, 2006

Gráfico 8.11. Tasas de mortalidad específicas de las mujeres por grupos quinquenales de edad según régimen de seguridad social y área de residencia. Colombia, 2006

Gráfico 8.12. Relación entre las tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad de las mujeres de los régimen contributivo, subsidiado y vinculado con respecto a las del régimen especial del área urbana. Colombia, 2006

Gráfico 8.13. Tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad de la población femenina residente en el área rural de todos los regímenes de seguridad social. Colombia, 2006

Gráfico 8.14. Relación de las tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de la población femenina residente en el área rural de todos los regímenes de seguridad social con respecto al régimen contributivo. Colombia, 2006

Gráfico 8.15. Tasas de mortalidad de los hombres, específicas para los grupos quinquenales de edad, según régimen de seguridad social y área de residencia. Colombia, 2006

Gráfico 8.16. Relación entre las tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad de los hombres de los regímenes contributivo, subsidiado y vinculado con respecto a las del régimen especial del área urbana. Colombia, 2006

Gráfico 8.17. Tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad de la población masculina residente en el área rural de todos los regímenes de seguridad social. Colombia, 2006

Gráfico 8.18. Relación de las tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de la población masculina residente en el área rural de todos los regímenes de seguridad social con respecto al régimen contributivo. Colombia, 2006

Gráfico 8.19. Tasas de mortalidad (más altas) específicas por grupos quinquenales de edad de la población masculina y femenina de todos los regímenes de seguridad social. Colombia, 2006

Gráfico 8.20. Tasas de mortalidad (más bajas) específicas por grupos quinquenales de edad de la población femenina de los regímenes especial y contributivo de seguridad social. Colombia, 2006

Gráfico 8.21. Tasas de mortalidad general estandarizadas por edad (por 1.000) según subregión. Colombia, 2006

Gráfico 8.22. Tasa total de mortalidad general por sexo estandarizadas por edad (por 1.000) según subregión. Colombia, 2006

Gráfico 8.23. Sobre-mortalidad masculina según tasas de mortalidad general estandarizadas por edad (por 1.000), según subregión. Colombia, 2006

Gráfico 8.24. Tasa de mortalidad general estandarizada por edad (por 1.000) por área de residencia, según subregión. Colombia, 2006

Gráfico 8.25. Tasa de mortalidad general estandarizada por edad (por 1.000) por régimen de seguridad social. Colombia, 2006

Gráfico 8.26. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada al régimen contributivo, por sexo, y sobre-mortalidad masculina por subregión en el área urbana. Colombia, 2006

Gráfico 8.27. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada al régimen contributivo, por área de residencia, y relación entre mortalidad del área rural y del área urbana por subregión del país. Colombia, 2006

Gráfico 8.28. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada al régimen subsidiado por sexo y sobre-mortalidad masculina por subregión del país, en el área urbana. Colombia, 2006

Gráfico 8.29. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada al régimen subsidiado, por sexo, y sobre-mortalidad masculina por subregión del país, en el área rural. Colombia, 2006

Gráfico 8.30. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada al régimen subsidiado, por área de residencia, y relación entre mortalidad del área rural y del área urbana por subregión del país, Colombia, 2006

Gráfico 8.31. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada a los regímenes especiales, por sexo, y relación entre mortalidad de los hombres y de las mujeres por subregión del país, área urbana. Colombia, 2006

Gráfico 8.32. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada a los regímenes especiales, por sexo, y relación entre la mortalidad de los hombres y la de las mujeres por subregión del país, área rural. Colombia, 2006

Gráfico 8.33. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada a los regímenes especiales, por área de residencia, y relación entre mortalidad del área rural y del área urbana por subregión del país. Colombia, 2006

Gráfico 8.34. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población de vinculados, por sexo, y relación entre mortalidad de los hombres y la de las mujeres por región del país, área urbana. Colombia, 2006

Gráfico 8.35. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población de vinculados, por sexo, y relación entre mortalidad de los hombres y la de las mujeres por subregión del país, área rural. Colombia, 2006

Gráfico 8.36. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población de vinculados, por área de residencia, y relación entre mortalidad del área rural del área urbana por subregión. Colombia, 2006.

Gráfico 8.37. Relación entre las tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población del país según régimen de seguridad social y las del régimen contributivo por subregión, área de residencia urbana. Colombia, 2006

Gráfico 8.38. Relación entre las tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población según régimen de seguridad social y las del régimen contributivo por subregión del país, área de residencia rural. Colombia, 2006


Gráfico 8.39. Relación entre las tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población femenina del país según régimen de seguridad social y las del régimen contributivo por subregión, cabecera municipal. Colombia, 2006

LISTA DE CUADROS

Cuadro 8.1. Tasas de mortalidad general por regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud. Colombia, 2006


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007

GRÁFICOS



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico8.1. Tasas de mortalidad específicas por edad (por 1.000) según área de residencia. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico8.2. Relación entre las tasas de mortalidad específicas por edad de la población residente en la cabecera municipal y en el área rural. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico8.3. Tasas de mortalidad específicas por edad (por 1.000) según sexo. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico8.4.Relación entre tasas de mortalidad específicas por edad de la población masculina y femenina. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico8.5. Tasas de mortalidad específicas por edad (por 1.000) de la población femenina según área de residencia. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico8.6. Relación entre tasas de mortalidad específicas por edad de la población femenina residente en la cabecera municipal y en el área rural. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico8.7. Tasas de mortalidad específicas por edad (por 1.000) de la población masculina según área de residencia. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico8.8. Relación entre tasas de mortalidad de la población masculina residente en la cabecera municipal y en el área rural. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfica8.9. Tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad por regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales, Registros de defunción.


Gráfico 8.10. Tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad de los afiliados al Régimen Contributivo y Subsidiado del SGSSS, según sexo y área de residencia. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico 8.11. Tasas de mortalidad específicas de las mujeres por grupos quinquenales de edad según régimen de seguridad social y área de residencia. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico 8.12. Relación entre las tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad de las mujeres de los régimen contributivo, subsidiado y vinculado con respecto a las del régimen especial del área urbana. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico 8.13. Tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad de la población femenina residente en el área rural de todos los regímenes de seguridad social. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico 8.14. Relación de las tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de la población femenina residente en el área rural de todos los regímenes de seguridad social con respecto al régimen contributivo. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico 8.15. Tasas de mortalidad de los hombres, específicas para los grupos quinquenales de edad, según régimen de seguridad social y área de residencia. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico 8.16. Relación entre las tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad de los hombres de los regímenes contributivo, subsidiado y vinculado con respecto a las del régimen especial del área urbana. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico 8.17. Tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de edad de la población masculina residente en el área rural de todos los regímenes de seguridad social. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales, Registros de defunción.


Gráfico 8.18. Relación de las tasas de mortalidad específicas por grupos quinquenales de la población masculina residente en el área rural de todos los regímenes de seguridad social con respecto al régimen contributivo. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.


Gráfico 8.19. Tasas de mortalidad (más altas) específicas por grupos quinquenales de edad de la población masculina y femenina de todos los regímenes de seguridad social. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.20. Tasas de mortalidad (más bajas) específicas por grupos quinquenales de edad de la población femenina de los regímenes especial y contributivo de seguridad social. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales, Registros de defunción.

Gráfico 8.21. Tasas de mortalidad general estandarizadas por edad (por 1.000) según subregión. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.22. Tasa total de mortalidad general por sexo estandarizadas por edad (por 1.000) según subregión. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales, Registros de defunción.


Gráfico 8.23. Sobre-mortalidad masculina según tasas de mortalidad general estandarizadas por edad (por 1.000), según subregión. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales, Registros de defunción.


Gráfico8.24. Tasa de mortalidad general estandarizada por edad (por 1.000) por área de residencia, según subregión. Colombia, 2006.



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales, Registros de defunción.

Gráfico8.25. Tasa de mortalidad general estandarizada por edad (por 1.000) por régimen de seguridad social.Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.26. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada al régimen contributivo, por sexo, y sobre-mortalidad masculina por subregión en el área urbana. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.27. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada al régimen contributivo, por área de residencia, y relación entre mortalidad del área rural y del área urbana por subregión del país. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.28. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada al régimen subsidiado por sexo y sobre-mortalidad masculina por subregión del país, en el área urbana. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.29. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada al régimen subsidiado, por sexo, y sobre-mortalidad masculina por subregión del país, en el área rural. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.30. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada al régimen subsidiado, por área de residencia, y relación entre mortalidad del área rural y del área urbana por subregión del país, Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.31. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada a los regímenes especiales, por sexo, y relación entre mortalidad de los hombres y de las mujeres por subregión del país, área urbana. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.32. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada a los regímenes especiales, por sexo, y relación entre la mortalidad de los hombres y la de las mujeres por subregión del país, área rural. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.33. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población afiliada a los regímenes especiales, por área de residencia, y relación entre mortalidad del área rural y del área urbana por subregión del país. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.34. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población de vinculados, por sexo, y relación entre mortalidad de los hombres y la de las mujeres por región del país, área urbana. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.35. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población de vinculados, por sexo, y relación entre mortalidad de los hombres y la de las mujeres por subregión del país, área rural. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.36. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población de vinculados, por área de residencia, y relación entre mortalidad del área rural del área urbana por subregión. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.37. Relación entre las tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población del país según régimen de seguridad social y las del régimen contributivo por subregión, área de residencia urbana. Colombia, 2006.


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.38. Relación entre las tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población según régimen de seguridad social y las del régimen contributivo por subregión del país, área de residencia rural. Colombia, 2006.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002 -2007



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción.

Gráfico 8.39. Relación entre las tasas de mortalidad estandarizadas por edad (por 1.000) de la población femenina del país según régimen de seguridad social y las del régimen contributivo por subregión, cabecera municipal. Colombia, 2006.

CUADROS

Cuadro 8.1. Tasas de mortalidad general por regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud. Colombia, 2006.

Régimen de Seguridad Social	Tasa X 1.000
Vinculado y Particular	5,2
Subsidiado	4,7
Contributivo	4,0
Otro Regímenes Especiales	2,7
Total	4,4

Fuente: DANE. Estadísticas Vitales, Registros de defunción.



ASIS
Análisis de Situación en Salud



Libertad y Orden

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia



UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

1803

Facultad Nacional de Salud Pública
"Héctor Abad Gómez"