



# Análisis de Situación de Salud según regiones Colombia

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA

GRUPO ASIS

2013





# Tabla de Contenido

Presentación	10
Caracterización sociodemográfica, económica y territorial	11
Región Caribe e insular	16
Región Central	16
Región Bogotá-Cundinamarca	16
Región Oriental	17
Región Pacífica	17
Región Amazonía-Orinoquía	18
Crecimiento poblacional por regiones	19
Descripción de algunos determinantes sociales de la salud	21
Pobreza	21
Educación	26
Condiciones de la vivienda	29
Viviendas con acceso a servicios	30
Sistema General de Seguridad Social de Salud	33
Dimensión Salud Sexual y Reproductiva	35
Fecundidad	35
Uso de métodos de planificación familiar	37
Natalidad	39
Esperanza de vida	41
Mortalidad materna	44
Violencia sexual	52
Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional	54
Bajo peso al nacer	54
	56
Obesidad	57
Desnutrición crónica en menores de cinco años	59



# PROSPERIDAD PARA TODOS

Dimensión de salud mental y convivencia social	62
Salud libre de condiciones transmisibles	64
Enfermedades inmunoprevenibles	64
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cin	co años69
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinc	o años76
Enfermedades transmitidas por vectores	80
Dimensión vida saludable libre de condiciones cronicas y discapacitante	s 82
Región Amazonía-Orinoquía	86
Región Bogotá-Cundinamarca	88
Región Caribe	90
Región Central	92
Región Oriental	94
Región Pacífica	96
Mortalidad infantil	98
Mortalidad en menores de cinco años	104
Morbilidad	108
Morbilidad atendida por regiones	109
Región Central	115
Región Bogotá-Cundinamarca	121
Región Oriental	127
Región Pacífica	133
Región Amazonía-Orinoquía	139
Priorización	145





# Lista de tablas

Tabla 1. Índices demográficos por regiones. Colombia 2005-2012	15
Tabla 2. Crecimiento poblacional por regiones. Colombia 2005-2020	
Tabla 3. Acceso a servicios públicos, privados o comunales, según área. Colombia 2011	32
Tabla 4. Violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes, según departamento. Colombia, 2009	5-
2006	
Tabla 5. Enfermedades transmitidas por vectores. Colombia, 2008-2010	81
Tabla 6. Tasas brutas de mortalidad según regiones. Colombia 2008-2010	82
Tabla 7. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Caribe, Colombia, 2011	109
Tabla 8. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Caribe, Colon	nbia,
2011	110
Tabla 9. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Central, Colombia, 2011	115
Tabla 10. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Central,	
Colombia, 2011	
Tabla 11. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Bogotá-Cundinamarca, Colombia	
2011	121
Tabla 12. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Bogotá-	
Cundinamarca, Colombia, 2011	
Tabla 13. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Oriental, Colombia, 2011	127
Tabla 14. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Oriental,	
Colombia, 2011	
Tabla 15. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Pacífica, Colombia, 2011	133
Tabla 16. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Pacífica,	
Colombia, 2011	134
Tabla 17. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Amazonía-Orinoquía, Colombia,	2011
	139
Tabla 18. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Amazonía-	
Orinoquía, Colombia, 2011	
Tabla 19. Indicadores. Colombia	147





# Lista de figuras

Figura 1. Pirámide poblacional. Colombia, 2005 - 2012 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 2. Pirámide poblacional de la región Caribe. Colombia, 2005-2020; Error! Marcador no
definido.
Figura 3. Pirámide poblacional de la región Central. Colombia, 2005-2020; Error! Marcador no
definido.
Figura 4. Pirámide poblacional de la región Bogotá-Cundinamarca. Colombia, 2005-2020¡Error!
Marcador no definido.
Figura 5. Pirámide poblacional de la región Centro-Oriente. Colombia, 2005-2020 ¡Error!
Marcador no definido.
Figura 6. Pirámide poblacional de la región Pacífico. Colombia, 2005-2020 ¡Error! Marcador no
definido.
Figura 7. Pirámide poblacional de la región Amazonía-Orinoquía. Colombia, 2005-2020 ¡Error!
Marcador no definido.
Figura 8. Tasas brutas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo por 1.000 habitantes.
Colombia, 19855 - 2020
Figura 9. Incidencia de pobreza por departamentos. Colombia, 2009-2011¡Error! Marcador no
definido.
Figura 10. Índice de Gini por departamentos. Colombia, 2010-2011 ¡Error! Marcador no
definido.
Figura 11. Índice de Gini, región Caribe e Insular*. Colombia, 2002-2011
Figura 12. Índice de Gini, región Central. Colombia, 2002-2011; Error! Marcador no definido.
Figura 13. Índice de Gini, región Bogotá-Cundinamarca. Colombia, 2002-2011¡Error! Marcador
no definido.
Figura 14. Índice de Gini, región Oriental*. Colombia, 2002-2011; Error! Marcador no definido.
Figura 15. Índice de Gini, región Central. Colombia, 2002-2011; Error! Marcador no definido.
Figura 16. Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años y mayores de 15 años.
Colombia, 2002-2011jError! Marcador no definido.
Figura 17. Tasas netas y brutas de coberturas de educación básica y media. Colombia, 2011
jError! Marcador no definido.
Figura 18. Años promedio de educación. Colombia, 2002-2011¡Error! Marcador no definido.
Figura 19. Condiciones inapropiadas de la vivienda*. Colombia, 2002-2011¡Error! Marcador no
definido.
Figura 20. Servicios adecuados*. Colombia, 2002-2011 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 21. Afiliación al Sistema General de Seguridad de Salud. Colombia, 2012* ¡Error!
Marcador no definido.
Figura 22. Evolución de la edad media de fecundidad en Colombia
Figura 23. Proporción de mujeres de 15 a 49 años sexualmente activas no unidas con uso de
métodos anticonceptivos. Colombia, 2005-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 24. Mujeres en unión que usan métodos anticonceptivos, según área. Colombia, 1990-
2010





Figura 25. Mujeres en unión que usan métodos anticonceptivos, según nivel educativo.  Colombia, 1990-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 26. Proporción de nacidos vivos en menores de 26 años. Colombia, 2005-2010¡Error! Marcador no definido.
Figura 27. Esperanza de vida total y por sexos. Colombia, 1985-2020 <b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Figura 28. Mortalidad materna. Colombia, 2005-2010
Figura 29. Mortalidad materna, según regiones. Colombia, 2005-2010
Figura 30. Cobertura de atención institucional del parto, según regiones. Colombia, 2005 y 2010
iError! Marcador no definido. Figura 31. Cobertura de atención institucional del parto, según nivel educativo. Colombia, 2010
iError! Marcador no definido.
Figura 32. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales, según regiones.
Colombia, 2005 y 2010
Figura 33. Curva de concentración, mortalidad materna relacionada con NBI. Colombia, 2010
¡Error! Marcador no definido.
Figura 34. Tasas de mortalidad materna departamental según NBI. Colombia, 2010 ¡Error!
Marcador no definido.
Figura 35. Curva de concentración, mortalidad materna relacionada con tasa neta de cobertura
de educación básica y media. Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 36. Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Colombia, 2012
¡Error! Marcador no definido.
Figura 37. Mujeres que manifestaron haber sufrido violencia física por parte del esposo o
compañero, según departamento. Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no definido. Figura 38. Porcentaje de bajo peso al nacer. Colombia, 2005-2010 ¡Error! Marcador no
definido.
Figura 39. Curva de concentración, bajo peso al nacer relacionado con NBI. Colombia, 2010
iError! Marcador no definido.
Figura 40. Porcentaje de bajo peso al nacer. Colombia, 2005-2010 ¡Error! Marcador no
definido.
Figura 41. Porcentaje de obesidad en la población de 18 a 64 años, según sexo. Colombia,
2005-2010iError! Marcador no definido.
Figura 42. Porcentaje de obesidad en la población de 18 a 64 años, según edad. Colombia,
2005-2010
Figura 43. Porcentaje de obesidad en la población de 18 a 64 años, según departamento.
Colombia, 2005-2010 ¡Error! Marcador no definido. Figura 44. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años, según área. Colombia, 2005-
2010
Figura 45. Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años, según departamento.
Colombia, 2005-2010
Figura 46. Prevalencia de anemia en niños menores entre 1 y 4 años, según departamento.
Colombia, 2010¡Error! Marcador no definido.



# PROSPERIDAD PARA TODOS

Figura 47. Tasas de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes, según departamento.  Colombia, 2010
Figura 48. Coberturas de vacunación por polio, DPT y SRP. Colombia, 1994-2011. ¡Error!
Marcador no definido.
Figura 49. Coberturas de vacunación por polio, DPT y SRP, según regiones. Colombia, 2011
Figura 50. Mortalidad por EDA en menores de cinco años. Colombia, 2005-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 51. Mortalidad en menores de cinco años por IRA, según regiones. Colombia, 2005-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 52. Mortalidad por EDA en menores de cinco años según porcentaje de personas que
habitan viviendas inadecuadas. Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 53. Curva de concentración, mortalidad por EDA en menores de cinco años relacionado
con porcentaje de población en viviendas inadecuadas*. Colombia, 2010¡Error! Marcador no definido.
Figura 54. Mortalidad por EDA en menores de cinco años según porcentaje viviendas con
servicios inadecuados. Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 55. Curva de concentración, mortalidad por EDA en menores de cinco años relacionado
con porcentaje de población con servicios inadecuados*. Colombia, 2010¡Error! Marcador no
definido.
Figura 56. Mortalidad por EDA en menores de cinco años según inasistencia escolar. Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 57. Curva de concentración, mortalidad por EDA en menores de cinco años relacionado
con porcentaje de población con inasistencia escolar*. Colombia, 2010¡Error! Marcador no
definido.
Figura 58. Mortalidad por IRA en menores de cinco años. Colombia, 2005-2010¡Error! Marcador
no definido.
Figura 59. Mortalidad por IRA en menores de cinco años, según regiones. Colombia, 2005-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 60. Índice Parasitario Anual (IPA), según departamento. Colombia, 2010; Error! Marcador
no definido.
Figura 61. Índice Parasitario Anual (IPA), según departamento. Colombia, 2010¡Error! Marcador
no definido.
Figura 62. Mortalidad general por sexo y edad. Colombia, 2010; Error! Marcador no definido.
Figura 63. Mortalidad general por régimen de afiliación. Colombia, 2010¡Error! Marcador no definido.
Figura 64. Mortalidad general según grandes causas. Colombia, 2008-2010; Error! Marcador no
definido.
Figura 65. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes
grupos de causas. Colombia, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 66. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes
grupos de causas. Colombia, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figure 67 Mortalidad por regiones Colombia 2010 :Frrort Marcador no definido



# PROSPERIDAD PARA TODOS

Figura 68. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de
causas. Colombia, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 69. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes
grupos de causas. Región Amazonía-Orinoquía, 2008-2010¡Error! Marcador no definido.
Figura 70. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes
grupos de causas. Región Amazonía-Orinoquía, 2008-2010; Error! Marcador no definido.
Figura 71. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de
causas. Región Bogotá-Cundinamarca, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 72. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes
grupos de causas. Región Bogotá-Cundinamarca, 2008-2010¡Error! Marcador no definido.
Figura 73. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes
grupos de causas. Región Bogotá-Cundinamarca, 2008-2010; Error! Marcador no definido.
Figura 74. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de
causas. Región Caribe, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 75. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes
grupos de causas. Región Caribe, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 76. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes
grupos de causas. Región Caribe, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 77. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de
causas. Región Central, 2008-2010¡Error! Marcador no definido.
Figura 78. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes
grupos de causas. Región Central, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 79. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes
grupos de causas. Región Central, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 80. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de
causas. Región Oriental, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 81. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes
grupos de causas. Región Oriental, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 82. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes
grupos de causas. Región Oriental, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 83. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de
causas. Región Pacífica, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 84. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes
grupos de causas. Región Pacífica, 2008-2010
Figura 85. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes
grupos de causas. Región Pacífica, 2008-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 86. Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Colombia, 2005-2010¡Error! Marcador no
definido.
Figura 87. Mortalidad infantil por sexo, según grupo de edad de la madre. Colombia, 2010 ¡Error!
Marcador no definido.
Figura 88. Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, según regiones. Colombia, 2005-2010
iError! Marcador no definido.





Figura 89. Tasas de mortalidad infantil según NBI, según regiones. Colombia, 2010 ¡Error!
Marcador no definido.
Figura 90. Curva de concentración, mortalidad infantil relacionado con NBI. Colombia, 2010
jError! Marcador no definido.
Figura 91. Mortalidad en menores de cinco años por 1.000 nacidos vivos. Colombia, 2005-2010
¡Error! Marcador no definido.
Figura 92. Mortalidad en menores de cinco años por 1.000 nacidos vivos, según regiones.
Colombia, 2005-2010 ¡Error! Marcador no definido.
Figura 93. Curva de concentración, mortalidad en menores de cinco años relacionado con NBI.
Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no definido.





# Lista de mapas

iviapa 1. Densidad poblacional por regiones. Colombia 2012 Error! Marcador no definido.
Mapa 2. Tasa global y general de fecundidad por departamentos. Colombia 2010-2015 36
Mapa 3. Tasas brutas de natalidad por departamento. Colombia, 2010-2015¡Error! Marcador no
definido.
Mapa 4. Esperanza de vida total y en hombres por departamentos. Colombia, 2010-2015¡Error!
Marcador no definido.
Mapa 5. Esperanza de vida total y en mujeres por departamentos. Colombia, 2010-201542
Mapa 6. Tasas de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según departamentos.
Colombia, 2010iError! Marcador no definido.
Mapa 7. Bajo peso al nacer, según departamentos. Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no
definido.
Mapa 8. Coberturas de polio por departamento. Colombia, 2011; Error! Marcador no definido.
Mapa 9. Coberturas DPT por departamento. Colombia, 2011; Error! Marcador no definido.
Mapa 10. Coberturas de SRP por departamento. Colombia, 201167
Mapa 11. Tasas de mortalidad por EDA en menores de cinco años por 100.000 menores de
cinco años, según departamentos. Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no definido.
Mapa 12. Tasas de mortalidad por IRA en menores de cinco años por 100.000 menores de cinco
años, según departamentos. Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no definido.
Mapa 13. Tasas de mortalidad en menores infantil por 1.000 nacidos vivos, según
departamentos. Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no definido.
Mapa 14. Tasas de mortalidad en menores de cinco años por 1.000 nacidos vivos, según
departamentos. Colombia, 2010 ¡Error! Marcador no definido.





#### Presentación

El presente documento Análisis de Situación de Salud por Regiones en Colombia resume la Situación de Salud de Colombia a partir de la síntesis realizada para cada una de las seis Regiones que en su orden correponden a la Región Caribe, Central, Bogotá, Oriental, Pacífica y Amazonía – Orinoquía, optimizando para cada unidad temática del documento las fuentes de información oficial del sistema de salud, citando a continuación las más relevantes para cada caso, la Encuesta Nacional de Salud del año 2007 (ENS 2007), las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud de 2005 y 2010 (ENDS 2005, ENDS 2010), las Encuestas Nacionales de Situación Nutricional de 2005 y 2010 (ENSIN 2005, ENSIN 2010), los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), los registros de vigilancia en salud pública SIVIGILA, la información censal y los registros vitales compilados por el DANE, y otras informaciones de salud disponibles en los cubos del Sistema Integral de Información del Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO. Cabe anotar que la información elaborada a partir de las fuentes oficiales de consulta concerniente a la mortalidad se realizó con corte al año 2010, la morbilidad y la información relacionada con el Programa Ampliado de Inmunización con corte al año 2011.

Su alcance, da cuenta de la caracterización sociodemográfica, económica y territorial, descripción de algunos determinantes sociales de la salud, y del análisis por cada una de las Dimensiones de Salud propuestas en el Plan Decenal de Salud Pública: Salud Sexual y Reproductiva, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Mental y Convivencia Social, Salud libre de Condiciones Transmisibles, Vida Saludable Libre de Condiciones Crónicas y Discapacitantes, del análisis de la Mortalidad Infantil y en menores de cinco años y de la morbilidad atendida, así como y del proceso de priorización por regiones e indicadores; para lo cual se recrea la presentación de los temas mediante tablas, figuras y mapas.





#### Caracterización sociodemográfica, económica y territorial

La región de América Latina y el Caribe ha entrado en la etapa de transición demográfica y como consecuencia los países que la componen están experimentando cambios en las estructuras poblacionales por edad evidenciándose principalmente una reducción en la población infantil y un aumento en la población de personas mayores. En la región, se estima que la tasa global de fecundidad disminuya de 5,9 hijos por mujer en el quinquenio 1950-1955 a 1,9 en el quinquenio 2045-2050; además, se estima que en este periodo la esperanza de vida pase de 51,8 años a 79,6 y que la mortalidad infantil pase de 127,7 muertes a 7,9 por cada 1.000 nacidos vivos. Se proyecta que la población entre 0 y 14 años se reduzca en un 22%, la población entre 15 y 59 años aumente en un 4% y la población mayor de 60 años crezca en un 18%. (Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe. Panorama Social de America Latina y el Caribe. cap 3 El bono demográfico

En el año 2012 Colombia conforma un país de 46.581.823 habitantes, un 7,92% (3.693.231 habitantes) más poblado que en el año 2005; el 49,36% (22.997.087) de la población son mujeres y el 50,63% (23.584.736) son hombres. La relación hombre: mujer se ha mantenido estable entre el año 2005 y 2012, por cada 97 hombres hay 100 mujeres. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. DANE, Estimaciones de población 1985-2005 y proyección 2005 -2020. junio 2012.) (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. DANE, Estimaciones de población 1985-2005 y proyección 2005 -2020. junio 2012). El 75,95% de la población habita en el área urbana y en el área rural el 24,05%.

Colombia, como el resto de los países de la región, experimenta la transición demográfica con tasas de natalidad en descenso y tasas de mortalidad que se mantienen de moderadas a bajas. Para el año 2005 por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) había 38,03 niños entre 0 y 4 años, para el año 2012 esta cifra descendió a 34,78. Para el año 2012 la población menor de 15 años corresponde al 27.74% de toda la población, un 3,27% menos que para el año 2005 cuando aportaba el 31,01% del total. Mientras tanto, la población mayor de 65 años representa el 7,00% de toda la población mostrando un incremento del 0,75% con respecto al año 2005 cuando aportaba un 6,25%.


El índice de dependencia demográfica muestra un descenso en los últimos siete años. En el 2005 de cada 100 personas entre 15 y 64 años dependían 59,41 personas menores de 15 años o mayores de 65 años, en el año 2012 el número de dependientes es de 53,23. Mientras que el índice de dependencia infantil ha disminuido pasando de 49,44 menores de 15 años por cada 100 personas entre 15 y 64 años en el año 2005 a 42,51 en el año 2012, el índice de dependencia de mayores ha aumentado pasando de 9,97 personas mayores de 65 años por cada 100 personas entre 15 y 64 años en el año 2005 a 10,72 en el año 2012. Se estima que por un periodo de 44 años comprendido entre 1998 y 2042, la relación de dependencia se mantendrá por debajo de dos dependientes por cada tres personas en edades activas.





(Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe. Panorama Social de America Latina y el Caribe. cap 3 El bono demográfico). Aunque el índice de Friz ha pasado de 156,9 en el año 2005 a 142,9 en el año 2012, la población colombiana aún se considera joven.

La pirámide poblacional de Colombia es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2012 comparado con el año 2005, los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los intermedios y a medida que se avanza, se evidencia el estrechamiento que representa a la población adulta mayor, además del descenso en la mortalidad. (Figura 1)



Fuente: DANE, Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. Información a junio 30 de 2012.


Figura 1. Pirámide poblacional. Colombia, 2005 - 2012

Colombia está dividida políticamente por 1126 municipios, cuatro distritos y 32 departamentos. Se han conformado seis regiones así: Región caribe e linsular: Atlántico, Cesar, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Guajira, San Anfdrés Islas y Sucre. Región Central: Antioquía, Caquetá, Caldas, Huila, Tolima, Risaralda y Quindío. Región Bogotá-Cundinamarca: Bogotá D.C., Cundinamarca. Región Oriental: Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Norte de Santander, Santander y Vichada. Región Pacífica: Choco, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Región Amazonía-Orinoquía: Amazonas, Vaupés, Guaviare, Putumayo y Guainía.

Cada región muestra una dinámica demográfica diferente, influenciada por factores propios del territorio como características climáticas, políticas, organizativas, oportunidades educativas y laborales entre otras. La región más poblada es Bogotá-Cundinamarca, seguida de la región caribe, mientras que la menos poblada es amazonía-orinoquía (Mapa 1).







Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística eEstimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. Información a junio 30 de 2012..}

Mapa 1. Densidad poblacional por regiones. Colombia 2012





Para el año 2012, las regiones del caribe y amazonía-orinoquía están en fase progresiva, con alta fecundidad, alta mortalidad, gran cantidad de población menor de 15 años y poca mayor de 65 años; las demás regiones regiones se encuentran en fase regresiva, evidenciándose disminución en la fecundidad y en la mortalidad y gran cantidad de población en edades intermedias.

Entre los años 2005-2012 se evidencia que en todas las regiones, la razón niño:mujer y el índice de infancia han disminuido, mientras que el índice de juventud, de vejez y de envejecimiento han aumentado, Lo que provoca índices de dependencia demográfica con tendencia a la baja (Tabla 1)



Tabla 1. Índices demográficos por regiones. Colombia 2005-2012

Índice Demográfico	R	egión Carit	е	Re	egión Centra	al	Región Bo	ogotá-Cund	dinamarca	Re	gión Orier	ntal	Re	gión Pacíl	ica	U	ón Amaz Orinoquía	
	2005	2012	2020	2005	2012	2020	2005	2012	2020	2005	2012	2020	2005	2012	2020	2005	2012	2020
Poblacion total	9091023	10023072	10582620	10879820	11663270	12100668	9120274	10128968	10701512	5823512	6187858	6395274	7426045	7983357	8318153	547918	595298	625473
Poblacion Masculina	4535881	5005794	5017278	5363257	5739156	5924114	4424352	4929922	5199046	2901984	3082550	3105308	3661904	3935518	4047839	282457	304147	291151
Poblacion femenina	4555142	5017278	5565342	5516563	5924114	6176554	4695922	5199046	5502466	2921528	3105308	3289966	3764141	4047839	4270314	265461	291151	334322
Relación hombres:mujer	99,58	99,77	90,15	97,22	96,88	95,91	94,22	94,82	94,49	99,33	99,27	94,39	97,28	97,23	94,79	106,40	104,46	87,09
Razón ninos:mujer	45,07	41,10	37,64	36,03	33,18	32,39	31,74	29,63	29,12	40,39	36,16	33,98	37,77	34,11	32,45	58,22	50,80	45,07
Indice de infancia	34,22	31,26	29,87	29,85	26,50	25,51	28,10	24,91	23,82	31,96	28,64	27,26	30,94	27,38	26,13	40,27	36,67	35,15
Indice de juventud	26,55	26,94	26,62	25,47	26,29	25,59	26,80	25,95	24,98	26,07	26,20	25,72	26,62	26,68	25,91	27,27	28,87	28,99
Indice de vejez	5,59	6,15	6,66	6,78	7,56	8,21	5,87	6,90	7,73	6,58	7,24	7,75	6,69	7,38	7,87	3,83	4,34	4,74
Indice de envejecimiento	16,33	19,67	22,31	22,72	28,54	32,18	20,90	27,69	32,45	20,59	25,28	28,45	21,63	26,94	30,11	9,51	11,85	13,49
Indice demografico de dependencia	66,14	59,78	57,57	57,80	51,65	50,87	51,45	46,64	46,09	62,70	55,97	53,87	60,35	53,26	51,52	78,90	69,52	66,38
Indice de dependencia infantil	56,86	49,95	47,07	47,10	40,18	38,49	42,56	36,52	34,80	52,00	44,67	41,94	49,62	41,96	39,60	72,05	62,16	58,48
Indice de dependencia mayores	9,28	9,82	10,50	10,70	11,47	12,38	8,89	10,11	11,29	10,71	11,29	11,93	10,73	11,31	11,92	6,85	7,36	7,89
Indice de Friz	181,71	169,08	159,26	149,22	138,94	131,46	132,49	118,64	111,86	165,80	149,79	140,54	161,19	141,78	131,42	236,38	222,50	212,58

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. Información a junio 30 de 2012.






## Región Caribe e insular

La Región caribe e insular, con un población de 10.023.072 habitantes para el año 2012 resulta ser la tercera región más habitada del país y un 9,29% más poblada que en el año 2005. El 49,94% está compuesto por hombres y el restante 50,06% por mujeres lo que indica una relación hombre:mujer prácticamente de 1:1. Entre el año 2005 y 2012 se evidencia un descenso en el índice de infancia y un incremento en el de juventud, vejez y envejecimiento; por lo los índices de dependencia demográfica e infantil han decrecido, mientras que el de dependencia en mayores se ha incrementado. (Figura 2).

El 73,56% de la población habita el área urbana y el 26,44% el área rural o resto.


#### **Región Central**

La Región central, con una población de 11.663.270 habitantes para el año 2012 es la región más habitada del país y un 6,72% más poblada que en el año 2005. El 49,21% está compuesto por hombres y el restante 50,79% por mujeres, es decir que por cada 100 mujeres hay 97 hombres. Entre el año 2005 y 2012 se evidencia un descenso en el índice de infancia y un incremento en el de juventud, vejez y envejecimiento; por lo los índices de dependencia tanto, demográfica e infantil han decrecido, mientras que el de dependencia en mayores se ha incrementado. comportamiento se mantendrá para el año 2020 (Figura 3)El 73,96% de la población habita el área urbana y el 26,04% el área rural o resto.



Fuente: DANE, Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 nacional, departamental y municipal por sexo, grupos quinquenales de edad. Información a junio 30 de 2012.

Figura 2. Pirámide poblacional de la región caribe e insular. Colombia, 2005-2020



Fuente: DANE, Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020

Figura 3. Pirámide poblacional de la región central. Colombia, 2005-2020

Región Bogotá-Cundinamarca






La Región Bogotá-Cundinamarca, con una población de 10.128.968 habitantes para el año 2012 es la segunda región más habitada del país. Para el año 2012 muestra un incremento del 9,96% con respecto al año 2005. El 48,67% está compuesto por hombres y el restante 51,33% por mujeres, es decir que por cada 100 mujeres hay 94,82 hombres. Entre el año 2005 y 2012 se evidencia un descenso en el índice de infancia y un incremento en el de juventud, vejez y envejecimiento; por lo tanto, los índices de dependencia demográfica e infantil han decrecido, mientras que el dependencia en mayores ha incrementado. Este comportamiento se mantendrá para el año 2020. (Figura 4)

El 91,38% de la población habita el área urbana y el 8,62% el área rural o resto.


#### **Región Oriental**

La Región centro oriente, con una población de 6.187.858 para el año 2012 muestra un incremento del 5,89% con respecto al año 2005. El 49,82% está compuesto por hombres y el restante 50,18% por mujeres, con una relación hombre:mujer prácticamente de 1:1. Entre el año 2005 y 2012 se evidencia un descenso en el índice de infancia y un incremento en el de juventud, vejez y envejecimiento; por lo tanto, los índices de dependencia demográfica e infantil han decrecido, mientras que el dependencia en mayores incrementado. Este comportamiento se mantendrá para el año 2020. (Figura 5).El 70,55% de la población habita el área urbana y el 29,45% el área rural o resto.



Fuente: DANE, Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 Información a junio 30 de 2012.

Figura 4. Pirámide poblacional de la región Bogotá-Cundinamarca. Colombia, 2005-2020



Fuente: DANE, Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 Información a junio 30 de 2012.

Figura 5. Pirámide poblacional de la región oriental. Colombia, 2005-2020

#### Región Pacífica

La Región pacífico, con una población de 7.983.357 para el año 2012 muestra un incremento del 6,98% con respecto al año






2005. El 49,30% está compuesto por hombres y el restante 50,70% por mujeres, es decir que por cada 100 mujeres hay 97,23 hombres. Entre el año 2005 y 2012 se evidencia un descenso en el índice de infancia y un incremento en el de juventud, vejez y envejecimiento; por lo tanto, los índices de demográfica e infantil dependencia decrecido, mientras que el de dependencia en incrementado. mayores se ha Este comportamiento se mantendrá para el año 2020. (Figura 6)

El 68,66% de la población habita el área urbana y el 31,34% el área rural o resto.

## Región Amazonía-Orinoquía

La Región Amazonía-Orinoquía es la menos habitada del país, con una densidad poblacional de 595.298 para el año 2012 muestra un incremento del 7,96% con respecto al año 2005. El 51,09% está compuesto por hombres y el restante 48,91% por mujeres, es decir que por cada 100 mujeres hay 106,31 hombres. Entre el año 2005 y


2012 se evidencia un descenso en el índice de infancia y un incremento en el de juventud, vejez y envejecimiento; por lo tanto, los índices de dependencia demográfica e infantil han decrecido, mientras que el de dependencia en mayores se ha incrementado. Este comportamiento se mantendrá para el año 2020. (Figura 7)



Fuente: DANE, Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020 Información a junio 30 de 2012.

Figura 6. Pirámide poblacional de la región pacífico. Colombia, 2005-2020

El 46,18% de la población habita el área urbana y el 53,82% el área rural o resto.



Fuente: DANE, Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de población 2005-2020. Información a junio 30 de 2012

Figura 7. Pirámide poblacional de la región amazonía-orinoquía. Colombia, 2005-2020





## **Crecimiento poblacional por regiones**

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de indicadores demograficos 1985-2020 del DANE, para el quinquenio 2010-2015, se espera que la población de Colombia se incremente en 13,07 personas por cada 1000 habitantes, un 6,97% menos que el crecimiento natural del quinquenio 2005-2010. La tendencia del crecimiento poblacional por regiones en Colombia es similar; para el quinquenio 2010-2015 se estima un crecimiento poblacional menor que el del quinquenio anterior en todos los departamentos y seguira disminuyendo entre 2015-2020. (Tabla 2)

Tabla 2. Crecimiento poblacional por regiones. Colombia 2005-2020

Departamento		iento natu mil)		Tasa de crecimiento (exponencial)				
Departamento	2005- 2010	2010- 2015	2015- 2020	2005- 2010	2010- 2015	2015- 2020		
Región Caribe								
Atlántico	14,40	12,98	11,62	13,24	12,28	11,07		
Bolívar	17,02	15,46	14,28	10,45	11,51	11,34		
Cesar	19,62	18,03	16,63	13,51	12,53	11,50		
Córdoba	18,44	17,14	15,75	14,99	15,43	14,55		
La Guajira	26,08	24,41	21,92	36,66	31,39	26,54		
Magdalena	19,33	17,79	16,51	8,76	9,47	10,32		
Sucre	16,41	15,25	14,11	9,77	9,84	9,90		
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	13,40	12,22	10,93	7,69	8,34	8,33		
Región Central								
Antioquia	11,69	11,20	10,48	13,08	12,47	11,70		
Caldas	10,46	9,42	8,27	1,98	1,96	1,99		
Quindío	10,25	9,64	8,77	5,56	5,61	5,67		
Risaralda	10,66	9,81	8,76	6,06	5,72	5,44		
Caquetá	19,51	18,02	16,92	12,62	12,93	12,54		
Huila	16,24	15,16	14,21	13,71	12,80	11,84		
Tolima	12,09	11,18	10,26	3,24	2,95	2,70		
Región Bogotá-Cundinan	narca							
Bogotá, D. C.	12,43	11,40	10,33	14,75	13,52	12,35		
Cundinamarca	13,36	12,60	11,74	16,57	15,75	14,88		
Región Oriental								
Boyacá	12,77	10,90	9,71	1,95	1,38	1,66		
Meta	15,86	14,65	13,42	21,23	19,76	18,39		
Norte de Santander	14,33	13,19	12,42	8,48	8,73	8,42		
Santander	11,67	10,69	9,60	5,30	4,98	4,75		






Departamento	Crecim	iento natu mil)	ral (por	Tasa de crecimiento (exponencial)				
Берапатенто	2005- 2010	2010- 2015	2015- 2020	2005- 2010	2010- 2015	2015- 2020		
Arauca	23,76	21,89	19,80	12,87	11,59	10,04		
Casanare	17,35	16,24	15,19	19,50	18,10	16,88		
Región Pacífico								
Cauca	14,51	13,93	13,41	7,74	8,91	8,25		
Chocó	24,05	22,71	21,05	9,52	9,80	9,93		
Nariño	15,50	14,04	13,08	12,28	12,38	11,95		
Valle del Cauca	10,82	10,37	9,72	10,37	10,25	10,12		
Región Amazonía-Orinoc	quía							
Grupo Amazonia*	24,78	23,58	22,28	16,46	15,43	15,19		
Putumayo	20,64	19,29	18,44	10,04	11,39	13,51		
Total								
Colombia	14,05	13,07	12,08	11,78	11,48	10,94		

Fuente: DANE, Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020.

Según las estimaciones del DANE la natalidad al igual que la mortalidad en Colombia sigue una tendencia al descenso entre los años 1985 y 2010 y se espera que este comportamiento se mantenga hasta el 2020. El crecimiento natural por su parte se muestra más estable aunque entre los primeros dos quinquenios se puede apreciar un leve descenso. (Figura 8)



Fuente: DANE, Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020.

Figura 8. Tasas brutas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo por 1.000 habitantes. Colombia, 19855 - 2020

<sup>\*</sup>Según clasificación del DANE, el grupo Amazonía esta conformado por los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada.






#### Descripción de algunos determinantes sociales de la salud

#### **Pobreza**

La incidencia de pobreza en Colombia para el año 2011 fue de 34,1%, un 6,2% menos que en el año 2009. Se evidencia gandes diferencias entre los departamentos; Chocó es el departamento que presenta mayor pobreza con un 64,0% y casi quintuplica al distrito capital que representa la entidad terrritorial con menor pobreza con un 13,1%. En todos los departamentos se evidencia que la pobreza ha disminuido entre los años 2009 y 2010. El departamento de Bolívar redujo la pobreza en un 13,5% pasando de 57,1% a 43,7% y fue el que mayor disminución experimentó en el trienio, seguido de Sucre, con un 13,1% y Cesar con un 11,4%. Los departamentos donde menos reducción de pobreza hubo fueron Córdoba y Magdalena, con un 0,3 y 0,8% respectivamente. (Figura 9)








Fuente: DANE, Datos de pobreza monetaria generados con base en Encuesta Continua de Hogares - ECH y Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH.

Figura 9. Incidencia de pobreza por departamentos. Colombia, 2009-2011

En cuanto a la desigualdad de ingresos, el índice de Gini para Colombia en el año 2011 fue de 0,548 con una reducción de 0,009 puntos con respecto al año 2009; en general se observa una tendencia constante a través del tiempo. Por departamentos se observa que las diferencias son menos marcadas que lo descrito en pobreza. Los departamentos con mayor desigualdad para el año 2011 fueron Chocó, La Guajira, Córdoba, Huila y Cauca, cuyos índices oscilaron entre 0,554 y 0,567. Los departamentos con menor desiguadad fueron Cundinamarca, Caquetá, Atlántico, Risaralda y Meta con índices entre 0,458 y 0,492. Los departamentos que mayor reducción de desigualdad presentaron entre los años 2009 y 2010 fueron Cesar, Cauca y Bolívar con una reducción de 0,047, 0,035 y 0,033 puntos respectivamente. (Figura 10).








Fuente: DANE, Datos de pobreza monetaria generados con base en Encuesta Continua de Hogares - ECH y Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH.

Figura 10. Índice de Gini por departamentos. Colombia, 2010-2011

Por regiones se puede observar que el comportamiento de la desiguadad varía en cada departamento. En la región Caribe e Insular se evidencia que la desigualdad de ingresos ha aumentado en la Guajira entre los años 2002 y 2011; mientras que en el departamento del Atlántico ha sido constante al descenso. (Figura 11)








Fuente: DANE, Datos de pobreza monetaria por departamentos \*No incluye San Andres.

Figura 11. Índice de Gini, región Caribe e insular\*. Colombia, 2002-2011

En la región Central los departamentos de Antioquía, Risaralda y Caquetá han disminuido la desigualdad de ingresos mientras que los demás departamentos han tendido al incremento. (Figura 12)




Fuente: DANE, Datos de pobreza monetaria por departamentos

Figura 12. Índice de Gini, región Central. Colombia, 2002-2011

En la región Bogotá-Cundinamarca, tanto el departamento como el distrito han disminuido la desigualdad de ingresos durante el periodo de tiempo estudiado. (Figura 13)








Fuente: DANE, Datos de pobreza monetaria por departamentos

Figura 13. Índice de Gini, región Bogotá-Cundinamarca. Colombia, 2002-2011

En la región Oriental el departamento de Boyacá muestra una tendencia al descenso en la desigualdad de ingresoso mientras que los demás departamentos se mantienen estables. (Figura 14)




Fuente:DANE, Datos de pobreza monetaria por departamentos \*No incluye Arauca, Casanare, Vichada

Figura 14. Índice de Gini, región Oriental\*. Colombia, 2002-2011

En la región Pacífica los departamentos de Cauca y Chocó mostraron una elevación de las desigualdades de ingreso entre los años 2004 y 2008, luego empezaron el descenso, para alcanzar un índice de 0,5669 y 0,5536 respectivamente para el año 2011. Los demás departamentos muestran una tendencia constante a través del tiempo. (Figura 15)







Fuente: DANE, Datos de pobreza monetaria por departamentos

Figura 15. Índice de Gini, región Central. Colombia, 2002-2011

La fuente consultada no contiene datos del índice de Gini para la región Amazonía-Orinoquía por lo tanto no se incluye en esta parte del análisis.


#### Educación

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, para el año 2011 la proporción de analfabetismo en las personas mayores de 15 años ha disminuido en Colombia un 0,5% pasando de 6,3% a 5,8%. Se Observagrandes diferencias entre cabecera municipal y resto, el porcentaje de analafabetismo en mayores de 15 años es casi 4 veces mayor en el resto que en la cabecera municipal y entre los años 2010 y 2011 disminuyo un 0,3% mientras que en la cabecera municipal disminuyó un 0,6%.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares – DANE que usa el Ministerio de Educación Nacional entre los años 2002 y 2010 la tasa de analfabetismo ha descendido un 0,80% en la población entre 15 y 24 años y un 1,20% en los mayores de 15 años. (Figura 16)



# PROSPERIDAD PARA TODOS



Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares –publicada en la página web del Ministerio de Educación Nacional

Figura 16. Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años y mayores de 15 años. Colombia, 2002-2011

Las tasas de cobertura neta<sup>1</sup> y cobertura bruta<sup>2</sup> de educación básica y media han ido en incremento durante los años 2002 y 2011 pasando de 84,39% a 90,54% y de 90,57 a 103,44%

Por departamentos se evidencia variación entre las tasa de cobertura de educación para el año 2011. Las tasas netas han oscilado entre 62,18% para Vaupés y 103,30% para Sucre. Las tasas brutas han oscilado entre 72,29 para 123,04% respectivamente para los departamentos mencionados. (Figura 17)


\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tasa de Cobertura Neta (TCN): Es la relación entre los estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica correspondiente al nivel y el total de la población en ese rango de edad. Su cálculo se realiza de la siguiente manera para cada nivel educativo

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tasa de cobertura bruta: Es la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico, independiente de la edad que estos tengan y el total de población en el rango de edad teórico correspondiente a dicho nivel. Su cálculo se realiza de la siguiente manera para cada nivel educativo








Fuente: Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, Datos de Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 – 2011. MEN

Figura 17. Tasas netas y brutas de coberturas de educación básica y media. Colombia, 2011

Los años promedio de educación en Colombia se han incrementado entre los años 2002 y 2011 pasando de 8,55 a 9,41 en la población entre 15 y 24 años y de 7,52 a 8,25 en la población mayor de 15 años. (Figura 18)







Fuente: – DANE , Datos de la Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares –publicados en la página web del Ministerio de Educación Nacional.

Figura 18. Años promedio de educación. Colombia, 2002-2011


#### Condiciones de la vivienda

De acuerdo con la definicón del DANE, las condiciones de la vivienda se refiere a las condiciones físicas que poseen las viviendas que habitan las personas. Se consideran inapropiadas aquellas viviendas móviles o ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, o sin paredes o con paredes de tela o de materiales de desecho o con pisos de tierra, en la zona rural el piso de tierra debe estar asociado a paredes de material semipermanente o perecedero.

Según el censo del año 2005 para ese año en colombia el 10,4% de la población habitaba una vivienda inadecuada. El porcentaje de población que vivía en esas condiciones varía en todos los departamentos, siendo mayor en Vichada, La Guajira y Córdoba con un 47,74%, un 46,26 y un 41,56% respectivamente. Así mismo, lo departamentos con menor porcentaje de personas que habitaban viviendas inadecuadas son Bogotá, Caldas, San Andrés y Quíndio donde el porcentaje no supera el 1,5%. (Figura 19)







Fuente: DANE. Censo 2005, Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012.

Figura 19. Condiciones inapropiadas de la vivienda\*. Colombia, 2002-2011

#### Viviendas con acceso a servicios


De acuerdo con la definicón del DANE, el porcentaje de personas que viven con servicios inadecuados se refiere al no acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas. En las cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de acueducto se provean de agua en río, nacimiento, carrotanque o de la lluvia. En el resto, dadas las condiciones del medio rural, se incluye las viviendas que carezcan de sanitario y acueducto y que se aprovisionen de agua en río, nacimiento o de la lluvia.

Según el censo del año 2005 para ese año en Colombia el 7,4% de la población habitaba una vivienda con servicios inadecuados. El porcentaje que vive con estas condiciones varia entre los departamentos siendo mayor en Chocó, Vichada, y Guainía con un 71,13%, un 39,14% y un





35,34% respectivamente. Así mismo, lo departamentos con menor porcentaje de personas que no acceden a servicios adecuados son Bogotá, Quindío, y Caldas, donde el porcentaje no supera el 1,5%. (Figura 20)



Fuente: DANE, Datos de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012. DANE \*Censo 2005.

Figura 20. Servicios adecuados\*. Colombia, 2002-2011

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Calidad de Vida para el año 2011, en Colombia el 87,3% de la población tiene acceso a acueducto y el 72,3% a alcantarillado. El acceso a servicios es mayor en el área rural o cabecera que en el área rural o resto. (Tabla 3)





Tabla 3. Acceso a servicios públicos, privados o comunales, según área. Colombia 2011

Servicio	Cabecera	Resto	Total
Energía eléctrica	99,5	89,9	97,4
Gas natural	65,6	4,0	52,1
Acueducto	96,0	56,3	87,3
Alcantarillado	89,1	12,3	72,3
Recolección de basuras	97,2	18,3	80,0
Teléfono	46,2	3,3	36,9
Ningún servicio	0,1	8,2	1,9

Fuente DANE ECV 2010 - ECV 2011

Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005





## Sistema General de Seguridad Social de Salud

Según datos del BDUA, el 92,02% de la población Colombiana se encuentra afiliado al sistema. El 48,34% pertenece al régimen subsidiado, el 42,84% de encuentra afiliado al régimen contributivo, el 0,83% pertenece al régimen especial y el restante 7,98% de la población no se encuentra afiliada.

El porcentaje de afiliación de la región Caribe es del 100%. Alrededor del 70% de la población esta afiliada al régimen subsidiado, cerca del 29% al contributivo el 0,58% al especial.


En la región Central el porcentaje de afiliación al sistema es del 89,48%. El 44,43% de la población esta afiliada al régimen subsidiado, el 43,92% al contributivo, el 1,12% al especial y el restante 10,52% no esta afiliado al sistema.

En la región Bogotá-cundinamarca el porcentaje de afiliación al sistema es del 86,41%. El 21,54% de la población esta afiliada al régimen subsidiado, el 64,39% al contributivo, el 0,48% al especial y el restante 13,59% no esta afiliado al sistema.

En la región Oriental el porcentaje de afiliación al sistema es del 91,73%. El 51,60% de la población esta afiliada al régimen subsidiado, el 38,80% al contributivo, el 1,33% al especial y el restante 8,27% no esta afiliado al sistema.

En la región Pacífica el porcentaje de afiliación al sistema es del 90,69%. El 54,42% de la población esta afiliada al régimen subsidiado, el 35,51% al contributivo, el 0,76% al especial y el restante 9,31% no esta afiliado al sistema.

En la región Amazonía-Orinoquía el porcentaje de afiliación al sistema es del 87,50%. El 73,85% de la población esta afiliada al régimen subsidiado, el 12,13% al contributivo, el 1,51% al especial y el restante 12,50% no esta afiliado al sistema. (Figura 21)



Fuente: Base de Datos Única de Afiliados BDUA dispuestos en la ficha de indicadores del Ministerio de Salud y Protección Social. Disponible enhttp://www.minsalud.gov.co/estadisticas/Paginas/Indicadores.aspx



Figura 21. Afiliación al sistema general de seguridad de salud. Colombia, 2012\*

El Distrito Capital tiene la mayor cantidad personas afiliadas al régimen contributivo en todo el país con un 72,5%, y es seguido del departamento de Antioquía donde el 51,8% de su población afiliada lo esta a este regimen. Los departamentos donde menos del 10% de su población está afiliada al régimen contributivo son Vaupés, Guainía y Vichada. De acuerdo con lo anterior los departamentos donde la proporción de afiliación al régimen subsidiado es superior al 90% son Vichada, Sucre y Guainía.






## **Dimensión Salud Sexual y Reproductiva**

#### **Fecundidad**

Se estima que en Colombia durante el quinquenio 2010-2015 cada mujer tendrá alrededor de 2 hijos y habrá un total de 71,5 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años. En este período, en la región Caribe, el departamento de La Guajira aportará la mayor cantidad de nacimientos 117 por cada mil mujeres entre 15 y 49 años. En la región del Central se presentarán entre 63 y 98 nacimientos por cada mil mujeres en edad reproductiva. En la región Bogotá-Cundinamarca, en el Distrito se espera la tasa global de fecundidad más baja del país, con 57 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. En la región Oriental, sobresale el departamento de Arauca y en la región pacífica el departamento del Chocó por sus altas tasas generales de fecundidad, 117 y 122 respectivamente. En la región Amazonía-Orinoquía la tasa general del departamento de Putumayo será de 98 y para el resto de la región estará al rededor de 124 nacimientos por cada 1000 mujeres. (Mapa 2)

La edad media de fecundidad para en el país ha ido en incremento a partir del año 2000. Para el quinquenio 2010-2015 se espera que sea de 27,7 años. (Figura 22)


Por departamentos se estima que la edad media de fecundidad oscile entre los 26 y los 29 años.



Fuente: DANE. Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020.

Figura 1. Evolución de la edad media de fecundidad en Colombia.





Fuente: DANE, Elaborado a partir de los indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020.

Mapa 2. Tasa global y general de fecundidad por departamentos. Colombia 2010-2011


<sup>\*</sup>Según clasificación del DANE, el grupo Amazonía esta conformado por los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada.





### Uso de métodos de planificación familiar

Según la ENDS, el conocimiento de los métodos de planificación es universal entre las mujeres encuestadas, el 81% de las mujeres entre 15 y 49 años sexualmente activas no unidas hacían uso de métodos anticonceptivos, para el año 2010 la proporción se incrementó en un 0,6%. Entre las mujeres no unidas entre 20 y 29 son las que con mayor frecuencia usan estos métodos. (Figura 23)




Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS, 2010.

Figura 23. Proporción de mujeres de 15 a 49 años sexualmente activas no unidas con uso de métodos anticonceptivos. Colombia, 2005-2010

El uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en unión ha ido en incremento tanto en el área urbana como en el área rural. En el año 1990 se observa que el uso de estos métodos era más bajo en la población rural que en la urbana pero con el tiempo esta brecha ha desaparecido a tal punto que para el año 2010, el uso de métodos anticonceptivos en el área urbana es de 79,0 y en el área rural es de 79,2. (Figura 24)








Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2010

Figura 24. Mujeres en unión que usan métodos anticonceptivos, según área. Colombia, 1990-2010

Según el nivel educativo se observa que las mujeres unidas sin educación, con educación primaria y con educación secundaria hacen uso de los métodos anticonceptivos con mayor frecuencia. Se observa como la brecha entre las mujeres sin educación y con educación superior se ha ido reduciendo a través del tiempo, para el año 2010 por encima del 72% de las mujeres unidas hacen uso de los métodos, independientemente de su nivel educativo. (Figura 25)



Fuente: Encuesta Nacional de de Demografía y Salud. 2010

Figura 25. Mujeres en unión que usan métodos anticonceptivos, según nivel educativo. Colombia, 1990-2010






#### **Natalidad**

La tendencia de la natalidad en Colombia ha sido decreciente, pasando de una tasa bruta de 28,80 en el quinquenio 1985-1990 a una tasa estimada de 18,88 en el quinquenio 2010-2015.

Durante los años 2005 y 2010 alrededor del 62% de los nacimientos ocurrieron en mujeres menores de 26 años. La proporción de nacimientos en mujeres menores de 14 años es del 0,2%, entre mujeres de 14 y 17 años es del 11% y entre mujeres de 18 a 26 años esta alrededor del 51%. (Figura 26)




Fuente: DANE, Sistema Información en Salud del Ministerio de Salud y Protección Soical – SISPRO, Cubo de indicadores. 2005 a 2010

Figura 26. Proporción de nacidos vivos en menores de 26 años. Colombia, 2005-2010

Por departamentos se espera que para entre 2010 y 2015 la tasa bruta de natalidad oscile entre 15,87 y 29,35 nacidos vivos por cada 1000 habitantes, siendo esta más alta en los departamentos como chocó, La Guajira, Arauca y en el grupo Amazonía y más baja en los departamentos del interior como Caldas, Quindio, Risaralda, Santander, Antioquía y Valle del Cauca. (Mapa 3)







Fuente: DANE, Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020.

## Mapa 3. Tasas brutas de natalidad por departamento. Colombia, 2010-2015


\*Según clasificación del DANE, el grupo Amazonía esta conformado por los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada.





### Esperanza de vida

En Colombia la esperanza de vida ha tenido un comportamiento al incremento de manera sostenida pasando de un estimado de 67,99 años en el quinquenio 1985-1990 a 75,22 años en el quinquenio 2010-2015. Entre 2010 y 2015 se espera un incremento de 1,22 años con respecto al quinquenio inmediatamente anterior. Por sexos se observa que la esperanza de vida tiende a ser más alta en las mujeres que en los hombres, para los años 2010-2015 se espera un incremento de 1,03 y 1,40 años respectivamente, con una ganancia media anual de 0,28 años en los hombres y 0,21años en las mujeres. (Figura 27).




Fuente: DANE. Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020.

Figura 27. Esperanza de vida total y por sexos. Colombia, 1985-2020

Para el quinquenio 2010-2015 se estima que en el Distrito de Bogotá la Esperanza de Vida en los hombres sea de 75,94 años y represente la más alta del país, seguido de los departamentos de Atlántico y Boyacá con 72,82 y 72,72 años respectivamente. En las mujeres, el Distrito de Bogotá también tiene la Esperanza de Vida más alta del país siendo esta de 80,19 años, seguida de los departamentos de Valle del Cauca y Caldas con 79,96 y 79,29 respectivamente (Mapas 4 y 5).








Fuente:DANE, Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020. \*Según clasificación del DANE, el grupo Amazonía esta conformado por los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada.

Mapa 4. Esperanza de vida total y en hombres por departamentos. Colombia, 2010-2015







Fuente:DANE, Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020. \*Según clasificación del DANE, el grupo Amazonía esta conformado por los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Vichada.

Mapa 5. Esperanza de vida total y en mujeres por departamentos. Colombia, 2010-2015






#### Mortalidad materna

La razón de mortalidad materna hasta los 42 días post parto para el año 2005 fue de 69,73 y su comportamiento tendía al incremento hasta el año 2007 cuando llego a 71,34; se evidencia un decremento de 10,96 muertes por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2008 para luego iniciar un incremento progresivo que la posiciona en 71,64 para el año 2010.

Del mismo lado la mortalidad materna tardía, (Mhyrre J. Maternal mortality. Current opinión in anesthesiology. 2012:25(3)), muestra un comportamiento general al incremento que ha pasado de 73,06 en el año 2005 a 75,31 en el año 2010. Se observa un descenso de la razón durante el año 2008 llegando a 62,34 y posteriormente un incremento llevando a 75,31 la razón de mortalidad materna para el año 2010. (Figura 28)



Fuente: DANE. Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO, Cubo de indicadores- 2005 a 2010.


Figura 28. Mortalidad materna. Colombia, 2005-2010

Durante el año 2010 ocurrieron 485 muertes maternas en el país. El 40,41% (196 muertes) se deben a afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte, el 21,44% (104 muertes) a edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio y el 16,70% (81) a complicaciones del trabajo de parto y del parto.

La mortalidad materna hasta los 42 días y la tardía han mostrado un comportamiento similar en todas las regiones. En el caso de la segunda, la región Amazonía-Orinoquía mostró un particular comportamiento durante el periodo 2005 a 2010. En el año 2006 presentó un pico alcanzando una razón de 152,94 y otro en el año 2009 subiendo a 160,83 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, el valor de la razón para el año 2010 fue de 138,16. La mortalidad materna en la región Bogotá-Cundinamarca en general, ha tendido al descenso aunque se evidencia una elevación en al año 2009 alcanzando una razón de 55,30 lo cual significó 16,59 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos más que en el año 2008 y 13,38 menos que en el año 2010. (Figura 29)








Fuente: DANE, Sistema de Información en Salud del Ministerio de la Protección Social, SISPRO, Cubo de indicadores-2005 a 2010.

Figura 29. Mortalidad materna, según regiones. Colombia, 2005-2010

En el departamento de Putumayo la razón de mortalidad materna hasta los 42 días es significativamente más alta que la del país en un 36%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la razón nacional y las de los departamentos de La Guajira, Chocó y Caquetá. Los departamentos de San Andrés Islas, Amazonas, Guainía y Vaupés no presentaron muertes maternas durante el año 2010. Los demás departamentos y el distrito de Bogotá D.C, no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre sus razones de mortalidad materna departamentales y la nacional. (Mapa 6)








Fuente: DANE y Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, Cubo de indicadores- 2010.

Mapa 6. Tasas de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos, según departamentos. Colombia, 2010






Dentro de las causas de la mortalidad materna se han descrito debilidades en el acceso a servicios de salud de calidad, (Naciones Unidas. Informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio. 2010)<sup>1</sup>. En Colombia la atención institucional del parto aumento un 2,01% entre los años 2005 y 2010. Aunque todas las regiones han incrementado la cobertura de atención es más notable en las regiones Oriental y Pacífica donde el incremento fue de 3,43% y 3,06% respectivamente. La región que menor porcentaje de incremento experimento fue la región Bogotá-Cundinamarca con un 0,22%. (Figura 30)



Fuente: DANE y Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, Cubo de indicadores- 2010.

Figura 30. Cobertura de atención institucional del parto, según regiones. Colombia, 2005 y 2010

De acuerdo con la ENDS, el 95,4% de las mujeres encuestadas manifestaron haber tenido atención de parto institucional. El porcentaje de atención es más bajo entre las mujeres con nivel educativo más bajo o sin educación quienes manifiestan haber tenido el parto en la casa o en otro sitio. (Figura 31)



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2010

Figura 31. Cobertura de atención institucional del parto, según nivel educativo. Colombia, 2010






Según la ENDS 2010, el 91,7% de las mujeres encuestadas que habían tenido nacimientos en los 5 años previos a la encuesta recibieron atención prenatal de un profesional médico, lo cual representa un 4,6% más que lo encontrado en la ENDS 2005. El 5,3% de las atenciones prenatales fueron brindadas por un profesional de enfermería, un 1,5% menos que lo encontrado en la ENDS 2005. Un 3,0% de las mujeres no recibieron atención prenatal lo cual es un 3,4% menos que lo encontrado en el año 2005.

De la misma manera la cobertura de control prenatal también se ha incrementado en Colombia un 3,86% durante el quinquenio 2005-2010. Todas las regiones han aumentado el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales a excepción de Amazonía-Orinoquía donde la cobertura descendió en un 6,30%. Las regiones que mayor aumento han experimentado son Central, Pacífica y Oriental con un 5,76%, 4,99% y 4,23% respectivamente. (Figura 32)

Según la ENDS, el 77,0% de las mujeres encuestadas refirieron haber iniciado sus controles prenatales antes del cuarto mes de embarazo, el 15,0% lo hizo entre el 4 y el 5 mes y el restante 8% % lo hizo pasados los 5 meses.




Fuente: DANE, y Sistema de Información en Salud del Ministerio de la Protección Social, SISPRO, Cubo de indicadores- 2005 a 2010.

Figura 32. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales, según regiones. Colombia, 2005 y 2010

En Colombia la pobreza genera desigualdades en la distribución de la mortalidad materna. El 50% de la población más pobre soporta aproximadamente el 69% de la mortalidad produciendo desigualdad a favor de los más favorecidos en la sociedad, con un índice de concentración de -0,2258. (Figura 33)








Fuente: DANE y Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud y protección Social SISPRO. Cubo de indicadores-SISPRO y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012.

Figura 33. Curva de concentración, mortalidad materna relacionada con NBI. Colombia, 2010

Los departamentos de Chocó, La Guajira y Córdoba están dentro de los que tienen mayor proporción de personas en Necesidades Básicas Insatisfechas y a la vez experimentan alta mortalidad materna. Llama la atención los departamentos de Putumayo y Caquetá donde a pesar de que el porcentaje de personas en Necesidades Básicas Insatisfechas no es de los más altos, las razones de mortalidad materna si lo son. (Figura 34)








Fuente: DANE y SISPRO, Cubo de indicadores- y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012.

Figura 34. Tasas de mortalidad materna departamental según NBI. Colombia, 2010

De la misma manera en Colombia la educación se comporta como determinante de la mortalidad materna, la mitad de la población menos educada experimenta el 53% de la mortalidad materna con un índice de concentración de -0,0487. (Figura 35)







Fuente: DANE y SISPRO, Cubo de indicadores- y las estadísticas del sector educativo del Ministerio de Educación Nacional.

Disponible

en:

<a href="http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/principal.php?seccion=9&id\_categoria=2&nivel=9&dpto=2&mun=&ins=&et=&sede=&consulta\_detalle=total&consulta=cobertura.">detalle=total&consulta=cobertura.</a>


Figura 35. Curva de concentración, mortalidad materna relacionada con tasa neta de cobertura de educación básica y media. Colombia, 2010





#### Violencia sexual

En Colombia la violencia sexual es un evento de baja denuncia y notificación y de gran importancia para la salud pública. Según los casos notificados al Sivigila, el 55,13% (9.039 casos) corresponde a violencia física, el 19,31% (3.166 casos) a abuso sexual y el 12,65% (2.074 casos) a violencia psicológica. El restante 12,82% de los casos corresponden a causas como privación y negligencia, asalto y acoso sexual, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (NNA), trata de personas para explotación sexual, pornografía con NNA y turismo sexual. (Figura 36)




Fuente: Instituto Nacional de Salud – INS, SIVIGILA, semana epidemiológica 48 de 2012.

Figura 36. Porcentaje de casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual. Colombia, 2012

Según la ENDS 2010 el 37,4% de las mujeres encuestadas que alguna vez estuvieron casadas o unidas manifestaron haber recibido agresiones físicas por parte de su compañero, este tipo de agresiones resultó ser más común en las mujeres mayor de 45 años y que viven en el área urbana. Aunque las mujeres con educación superior y nivel de riqueza más alto manifiestan con menor frecuencia agresión física. En los departamentos de Chocó, Meta, Amazonas y Boyacá más del 45% de las mujeres alguna vez unidas manifestaron haber sufrido agresiones. Sucre y La Guajira son los departamentos donde menos agresiones manifestaron las encuestadas con un 26,1% y un 23,1% respectivamente. (Figura 37).







Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2010

Figura 37. Mujeres que manifestaron haber sufrido violencia física por parte del esposo o compañero, según departamento. Colombia, 2010






# Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional

### Bajo peso al nacer


La prevalencia de bajo peso al nacer constituye uno de los principales factores de riesgo para la mortalidad neonatal. En Colombia ha tenido una tendencia constante al incremento durante el quinquenio 2005-2010. Alrededor del 9% de los niños nacen con un peso inferior a 2.500 gramos. (Figura 38)



Fuente: DANE y SISPRO, Cubo de indicadores-

Figura 38. Porcentaje de bajo peso al nacer. Colombia, 2005-2010

La pobreza es determinante del bajo peso al nacer. En Colombia el 80% de la población más pobre concentra el 76% del bajo peso al nacer con un índice de concentración de 0,096. (Figura 39).




Fuente: Elaborado a partir de los datos del DANE dispuestos en el Cubo de indicadores-SISPRO y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012. DANE **Figura 39. Curva de concentración, bajo peso al nacer relacionado con NBI. Colombia, 2010** 





El bajo peso al nacer es un 43% más alto en el distrito de Bogotá comparado con el indicador nacional; de la misma forma, es un 18% más alto en el departamento de Cundinamarca y un 0,8% en el departamento de Chocó. (Mapa 7).

De acuerdo con los datos de ENDS 2010, el bajo peso al nacer es más frecuente en los hijos de mujeres con nivel educativo superior. Entre las mujeres sin educación el 25,3% manifiestan que sus hijos no fueron pesados al nacer. (Figura 40)




Fuente Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2010

Figura 40. Porcentaje de bajo peso al nacer. Colombia, 2005-2010







Fuente:Ministerio de Salud y Protección Social. Elaborado a partir de los datos del DANE dispuestos en el Cubo de indicadores-SISPRO


Mapa 7. Bajo peso al nacer, según departamentos. Colombia, 2010





#### **Obesidad**


En Colombia la obesidad se concentra más en las mujeres que en los hombres. De acuerdo con los datos de la ENSIN, entre 2005 y 2008 la obesidad aumento un 2,7% en los hombres y un 3,5% en las mujeres. (Figura 41)



Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia. 2010.

Figura 41. Porcentaje de obesidad en la población de 18 a 64 años, según sexo. Colombia, 2005-2010

La obesidad es más frecuente en los adultos entre 53 a 57 y 58 a 64 años, se observa que en este grupo de edad la obesidad aumento un 2,70% para cada grupo durante el quinquenio 2005-2010. Las personas entre 33 y 37 experimentaron un incremento del 3,20% en los cinco años siendo el grupo con más rápido crecimiento. Los jóvenes de 18 a 22 años, también sufrieron un incremento del 1,80% durante el quinquenio. (Figura 42)



Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia. 2010.


Figura 42. Porcentaje de obesidad en la población de 18 a 64 años, según edad. Colombia, 2005-2010





La obesidad es un 2,85 más común en el área urbana que el área rural, y a través del tiempo se ha incrementado en un 2,8% y un 2,9% respectivamente.

Los departamentos donde mayor obesidad entre 18 y 64 años se observa son San Andrés, Guaviare, Caquetá, Tolima Guainía, Chocó, Casanare y Arauca, sobrepasando el 20% de las personas encuestadas. Durante el quinquenio 2005-2010 se observa descenso en el porcentaje de obesidad en algunos departamentos como Vichada, Putumayo y Amazonas; los demás departamentos tienden al incremento. (Figura 43)



Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia. 2010.


Figura 43. Porcentaje de obesidad en la población de 18 a 64 años, según departamento. Colombia, 2005-2010





#### Desnutrición crónica en menores de cinco años

Según datos de la ENSIN entre los años 2005 y 2010 la desnutrición crónica en niños menores de cinco aumento un 2,10% en el área urbana y disminuyó un 0,10% en el área rural. La desnutrición crónica es un 5,4% más común en el área rural que en el área urbana. (Figura 44)




Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia. 2010.

Figura 44. Desnutrición crónica en niños menores de cinco años, según área. Colombia, 2005-2010

Según la ENDS 2010. En los departamentos de Vaupés, Amazonas, La Guajira, Guainía y Cauca la desnutrición crónica supera el 20% de los niños incluidos en la encuesta y es significativamente más alta que el indicador nacional. San Andrés y Providencia es la única entidad territorial cuyo porcentaje de desnutrción crónica es un 71% menor estadísticamente significativo al nacional. (Figura 45)








Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia. 2010.

Figura 45. Desnutrición crónica en niños menores de cinco años, según departamento. Colombia, 2005-2010

Para el año 2010 la prevalencia de anemia según concentración de hemoglobina en niños de 1 a 4 años (hb < 12 g/dl) es de 29,4%. Por departamento se observa que se presenta con mayor frecuencia en los departamentos de Amazonas, Meta, Nariño, La Guajira, Córdoba, Cundinamrca y Chocó, donde más del 35% de los niños entre 1 y 4 años que hicieron parte de la encuesta presentan anemia. La anemia es un 49% y un 45% más frecuente en los departamewntos de Amazonas y Meta comparados con el indicador nacional; así mismo, el porcentaje de anemia es significativamente más bajo en los departamentos de Sucre y Santander un 46% y un 50% respectivamente. (Figura 46)







Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia. 2010.

Figura 46. Prevalencia de anemia en niños menores entre 1 y 4 años, según departamento. Colombia, 2010





## Dimensión de salud mental y convivencia social

Uno de los indicadores importantes para medir la salud mental en Colombia esta relacionada con el uso de sustancias psicoactivas. Según datos del II Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Escolares 2011, en Colombia el consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilicitas en niños y niñas empieza a los 12 años.

Otro de los puntos importantes para la salud mental esta relacionada con la violencia intrafamiliar, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la tasa de violencia intrafamilar entre 2005 y 2006 en colombia disminuyo en 1 muerte por cada 100.000 habitantes. El comportamiento del evento fue variable entre los departamentos como se muestra a continuación. (Tabla 4)

Tabla 4. Violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes, según departamento. Colombia, 2005-2006


Tasa de violencia	2005	2006	• • • • • •
intrafamiliar por 100.000	F27.00		Comportameinto
Amazonas	537,00		\ <u>\</u>
Antioquia	116,00	127,00	7
Arauca	197,00	258,00	7
Atlántico	138,00	126,00	7
Bogotá	257,00	258,00	7
Bolívar	91,00	96,00	7
Boyacá	344,00	356,00	7
Caldas	124,00	,	7
Caquetá	85,00	80,00	7
Casanare	206,00	328,00	7
Cauca	113,00	82,00	7
Cesar	91,00	108,00	7
Chocó	77,00	59,00	7
Córdoba	59,00	56,00	7
Cundinamarca	366,00	398,00	7
Guaviare	144,00	84,00	7
Huila	162,00	148,00	7
La guajira	68,00	61,00	7
Magdalena	100,00	92,00	7
Meta	236,00	262,00	7
Nariño	80,00	83,00	7
Norte de Santander	224,00	206,00	7
Putumayo	30,00	41,00	7
Quindío	150,00		7
Risaralda	115,00	123,00	7
San Andrés	478,00	486,00	
Santander	196,00	170,00	` <u>`</u>
Sucre	150,00	124,00	<u> </u>
Tolima	208,00	130,00	` <u>`</u>
Valle del cauca	127,00	138,00	7
Vichada	85,00	76,00	```

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - DRIP -Forensis - violencia intrafamiliar - Impacto social de la Violencia Intrafamiliar. 2006





La mortalidad por suicidio tambien constituye uno de los indicadores de salud mental. En Colombia las tasas de suicidio indican que durante el año 2010 en el departamento del Quindio se produjeron 8 muertes por cada 100.000 habitantes, en los departamentos de Boyaca, Huila, Risaralda, Caldas, Arauca, Meta, Antioquia y Norte de Santander se produjeron entre 5 y 6 muertes por cada 100.000 habitantes. Llama la atención de Guainía y Amazonas donde no se produjo ningun suicidio para el año 2010. (Figura 47)



Fuente: DANE. EEVV, Registro de defunciones, 2010. Datos por residencia

Figura 47. Tasas brutas de mortalidad por suicidio por 100.000 habitantes, según departamento. Colombia, 2010






### Salud libre de condiciones transmisibles

## **Enfermedades inmunoprevenibles**

Para el año 2011 en Colombia las coberturas de vacunación se encuentran alrededor del 85% en todos los biológicos. Las tendencias de cobertura de polio, DPT y SRP han seguido un comportamiento similar para los tres biológicos; entre los años 1996 y 1998 experimentaron un descenso alcanzando coberturas alrededor del 75%, luego se observa un incremento constante hasta el año 2003 donde se ubicaron por encima del 92% y se mantuvieron constantes hasta el año 2009 cuando empezaron un descenso en las coberturas que representan el 7,3% para polio, el 6,9% para DPT y el 7,6% para SRP. (Figura 48)



Fuente, Ministerio de Salud y Protección Social – Programa Ampliado de Inmunización.

Figura 48. Coberturas de vacunación por polio, DPT y SRP. Colombia, 1994-2011


Por regiones se observa que las coberturas de vacunación por polio más altas se producen en las regiones Oriental y Caribe con un 90,13% y un 89,06% respectivamente. Las coberturas más bajas se encuentran en las regiones Amazonía-Orinoquía y Central alcanzando un 70,55% y un 75,42% respectivamente.

Las coberturas de vacunación por DPT más altas se encuentran en las regiones Oriental y Caribe con un 90,01% y un 89,30% respectivamente. Las coberturas más bajas se encuentran en las regiones Amazonía-Orinoquía y Central alcanzando un 70,58% y un 75,18% respectivamente.

Las coberturas de vacunación por SRP más altas se encuentran en las regiones Oriental y Caribe con un 91,72% y un 89,98% respectivamente. Las coberturas más bajas se encuentran en las regiones Amazonía-Orinoquía y Central alcanzando un 74,65% y un 80,70% respectivamente. (Figura 49)







Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – Programa Ampliado de Inmunización.

Figura 49. Coberturas de vacunación por polio, DPT y SRP, según regiones. Colombia, 2011


Por departamentos se observa que San Andrés, Guainía y Caldas tienen las coberturas de vacunación inferiores a 65% siendo las más bajas del país. Mientras tanto, los departamentos de Cesar y Valle y los distritos de Barranquilla y Cartagena superan el 100% en coberturas. (Mapa 8)

En cuanto a la vacunación por DPT, San Andrés, Vichada, Guainía y Caldas no superan el 65% en las coberturas; mientras tanto, los departamentos de Cesar y Valle y el distrito de Barranquilla superan el 100% en coberturas. (Mapa 9)

Las coberturas de vacunación por SRP, San Andrés, Vichada, Guainía y Caldas no superan el 65% en las coberturas; mientras tanto, los departamentos de Cesar y Valle y el distrito de Barranquilla superan el 100% en coberturas. (Mapa 10)








Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, Módulo Geográfico.

Mapa 8. Coberturas de polio por departamento. Colombia, 2011








Fuente: Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, Módulo Geográfico.

Mapa 9. Coberturas DPT por departamento. Colombia, 2011







Fuente: Mapa generado por el Módulo geográfico SISPRO-MSPS Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, Módulo Geográfico.


Mapa 10. Coberturas de SRP por departamento. Colombia, 2011





## Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años

La mortalidad por EDA en menores de cinco años ha mostrado una clara tendencia al descenso durante el quinquenio, se observa una elevación en el año 2007 alcanzándose una tasa de 10,68 para luego descender sostenidamente. En el año 2010 la tasa es de 5,26 muertes por cada 100.000 menores de cinco años. (Figura 50)




Fuente: DANE y SISPRO Cubo de indicadores- 2005 a 2010

Figura 50. Mortalidad por EDA en menores de cinco años. Colombia, 2005-2010

La región Amazonía-Orinoquía mostró un descenso en la mortalidad por EDA durante los años 2005 y 2009, para el año 2010 se evidencia un incremento de 20 muertes por cada 100.000 menores de cinco años en comparación con el año 2009. En la región Caribe la mortalidad ha ido en descenso alcanzando una tasa de 5,78 en el año 2010. Las tasas más bajas de mortalidad por EDA se encuentran en la región Bogotá-Cundinamarca donde se ha observado una tendencia constante al descenso pasando de una tasa de 2,91 en el año 2005 a 1,33 en el año 2010. (Figura 51)








Fuente DANE y SISPRO, Cubo de indicadores- 2005 a 2010.

Figura 51. Mortalidad en menores de cinco años por EDA, según regiones. Colombia, 2005-2010

Los departamentos con tasas de EDA significativamente más altas que las del país son Vaupés: 43,7 veces más alta; Guainía: 10,4 veces más alta; Amazonas: 6,5 veces más veces más alta; Choco: 4,2 veces más alta; Vichada: 3,1 veces más alta; Caquetá: 1,5 veces más alta; La Guajira: 1,2 veces más alta y Cauca: una vez más alta que la nacional. De otro lado, Casanare y San Andrés Islas no reportaron casos de mortalidad por EDA en menores de cinco años durante el año 2010. (Mapa 11)







Fuente: DANE y Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO, Cubo de indicadores- 2010


Mapa 11. Tasas de mortalidad por EDA en menores de cinco años por 100.000 menores de cinco años, según departamentos. Colombia, 2010





El estado de las viviendas donde habitan las personas se comporta como determinante de la mortalidad por EDA en menores de cinco años. Según el censo del año 2005, para ese año el 10,4% de la población colombiana habitaba <sup>3</sup>una vivienda inadecuada para el alojamiento humano.

A medida que el porcentaje de personas que habita viviendas inadecuadas aumenta, la tasa de mortalidad por EDA también lo hace en algunos territorios. (Figura 52)



Fuente: DANE, Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO Cubo de indicadores y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012.

Figura 52. Mortalidad por EDA en menores de cinco años según porcentaje de personas que habitan viviendas inadecuadas. Colombia, 2010


Las personas que presentan peores condiciones de vivienda experimentan el 70% de la enfermedad con un índice de concentración de -0,2721 (Figura 53)

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Según el DANE, viviendas inadecuadas se define como Viviendas móviles, o ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, o sin paredes o con paredes de tela o de materiales de desecho o con pisos de tierra, en la zona rural el piso de tierra debe estar asociado a paredes de material semipermanente o perecedero.



## PROSPERIDAD PARA TODOS



Fuente: DANE y Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO, y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012


Figura 53. Curva de concentración, mortalidad por EDA en menores de cinco años relacionado con porcentaje de población en viviendas inadecuadas\*. Colombia, 2010

De la misma manera, carecer de servicios sanitarios adecuados es determínate de la mortalidad por EDA, para el año 2005, el 7,36% de la población en Colombia habitaba viviendas con servicios inadecuados<sup>4</sup>. De acuerdo con los anteriores datos censales disponibles se puede observar que a medida que aumenta el porcentaje de viviendas con servicios inadecuados, aumenta la mortalidad por EDA. (Figura 54)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En las cabeceras, comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de acueducto se provean de agua en río, nacimiento, carrotanque o de la lluvia. En el resto, dadas las condiciones del medio rural, se incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y acueducto y que se aprovisionen de agua en río, nacimiento o de la lluvia.








#### Fuente:

DANE y Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 de junio de 2012.

Figura 54. Mortalidad por EDA en menores de cinco años según porcentaje viviendas con servicios inadecuados. Colombia, 2010

El 50% de la población que vive con servicios inadecuados soporta el 72% de la mortalidad con un índice de concentración de -0,3655. (Figura 55)




Fuente: DANE y SISPRO y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012.

Figura 55. Curva de concentración, mortalidad por EDA en menores de cinco años relacionado con porcentaje de población con servicios inadecuados\*. Colombia, 2010

La inasistencia educativa de la población de niños entre 7 y 11 años también se comporta como determinante de la mortalidad por EDA, a medida que aumenta el porcentaje de inasistencia escolar la tasa de mortalidad por EDA también lo hace. (Figura 56)








Fuente: DANE y SISPRO, y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012.

Figura 56. Mortalidad por EDA en menores de cinco años según inasistencia escolar. Colombia, 2010

Aquellos lugares donde la inasistencia escolar es más alta soportan el 72% de la mortalidad con un índice de concentración de -0,3287. (Figura 57)



Fuente: DANE y SISPRO, y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012.

Figura 57. Curva de concentración, mortalidad por EDA en menores de cinco años relacionado con porcentaje de población con inasistencia escolar\*. Colombia, 2010






#### Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de cinco años

En Colombia la tendencia de la mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (IRA), ha ido al descenso durante el quinquenio 2005-2010 con una notable aceleración entre los últimos dos años. La tasa pasó de 22,81 muertes por cada 100.000 menores de cinco años en el año 2005 a 16,49 en el año 2010. Esto corresponde a una disminución de 6,32 muertes por cada 100.000 menores de cinco años durante el quinquenio. (Figura 58)

La región Amazonía-Orinoquía mostró un incremento constante durante los años 2005 y 2009 cuando alcanzó su pico máximo con una tasa de 42,91 muertes por cada 100.000 menores de cinco años, para el año 2010 se aprecia un descenso en la mortalidad de la región con una tasa de 32,16. En general la mortalidad por IRA ha tendido al descenso en las demás regiones durante el quinquenio. (Figura 59)




Fuente: DANE y SISPRO, cubo de indicadores 2005 a 2010.

Figura 58. Mortalidad por IRA en menores de cinco años. Colombia, 2005-2010








Fuente: DANE y SISPRO, Cubo de indicadores- 2005 a 2010

Figura 59. Mortalidad por IRA en menores de cinco años, según regiones. Colombia, 2005-2010

Los departamentos con tasas de IRA significativamente más altas que las del país son Guainía: 7,49 veces más alta; Vaupés: 2,05 veces más alta; Chocó: 1,56 veces más alta; Amazonas: 1,38 veces más veces más alta; Risaralda y vichada: 97% y 96% más alta que la nacional. De otro lado, Huila, Guaviare, Sucre y Quindío tienen tasas alrededor de un 55% más bajas que la nacional con un nivel de confianza del 95%. (Mapa 12)







Fuente:. DANE y Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO.

Mapa 12. Tasas de mortalidad por IRA en menores de cinco años por 100.000 menores de cinco años, según departamentos. Colombia, 2010





A diferencia de lo que ocurre en la mortalidad por EDA en menores de cinco años, la inasistencia escolar, las viviendas con servicios inadecuados y el porcentaje de personas con viviendas inadecuadas no se comportan como determinantes de la mortalidad por IRA en los menores de cinco años, con índices de concentración de -0,0001, -0,0008 y 0,0271 respectivamente.






#### **Enfermedades transmitidas por vectores**

La incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores como malaria, leishmaniasis y dengue han tendido al incremento durante los años 2008-2010. En los tres años la incidencia de malaria vivax y falciparum aumentó en 3,64 casos y en 1,58 casos por cada 1000 habitantes respectivamente. (Tabla 5)

Según los datos del Sivigila durante el trienio, el Índice Parasitario Anual (IPA) pasó de 6,2 a 11,5. Los departamentos con mayores IPA durante el año 2011fueron Guaviare y Choco. (Figura 60)



Fuente: , Instituto Nacional de Salud - INS. Sivigila, 2010.

Figura 60. Índice Parasitario Anual (IPA), según departamento. Colombia, 2010

La incidencia de leishmaniasis cutánea y mucosa se incrementó en 46,15, 0,71 por cada 10.000 habitantes respectivamente. (Tabla 5)






Tabla 5. Enfermedades transmitidas por vectores. Colombia, 2008-2010

Enfermedades transmitidas por vectores	2008	2009	2010	Comportamiento
Incidencia de malaria vivax (por 1.000 habitantes)	4,49	5,67	8,13	<i>71</i>
Incidencia de malaria falciparum (por 1.000 habitantes)	1,63	2,13	3,21	<i>71</i>
Mortalidad por malaria	0,20	0,10	0,21	$\searrow \nearrow$
Incidencia de leismaniasis cutanea (por 10.000 habitantes)	84,77	137,20	130,92	<b>₹</b> \
Incidencia de leishmaniasis mucosa (por 10.000 habitantes)	0,75	0,97	1,46	<i>71</i>
Incidencia de leishmaniasis viceral (por 10.000 habitantes)	0,30	0,48	0,30	<b>₹</b> \
Incidencia de dengue (por 10.000 habitantes)	114,22	190,80	624,49	<i>77</i>
Letalidad por dengue (por 100 habitantes)	0,52	0,71	2,26	11

Fuente: Instituto Nacional de Salud - INS. Sivigila, 2008 a 2010.

Entre los años 2008 y 2010 la incidencia de dengue aumento en 480,27 casos por cada 10.000 habitantes y alcanzó una letalidad de 2,26 muertes por cada 100 personas diagnosticadas con la enfermedad para el año 2010.

La tendencia del dengue en Colombia tuvo un comportamiento estable hasta el año 2010 cuando se presentaron 157.202 casos, 101.610 más que los reportados durante el año 2010. Los departamentos de Antioquía, Santander y Valle fueron los que mayor cantidad de casos por dengue presentaron aportando un 16,97%, 13,46% y 13,41% del total de casos presentados en el país. (Figura 61)



Fuente: Instituto Nacional de Salud - INS. Sivigila, 2010.

Figura 61. Índice Parasitario Anual (IPA), según departamento. Colombia, 2010





#### Dimensión vida saludable libre de condiciones cronicas y discapacitantes

La mortalidad general en Colombia disminuyo durante los años 2008 y 2009 en un 1,6%, pero para el año 2010 se produjeron 8 muertes más por cada 100.000 habitantes que durante el año 2009.

Por regiones se puede ver que en la región Caribe e insular presentó 15,18 muertes menos por cada 100.000 habitantes para el año 2010 comparado con el año anterior; las regiones Central, Bogotá-Cundinamarca y Oriental disminuyeron su mortalidad en 8, 31 y 32 muertes por cada 100.000 habitantes respectivamente; la región pacífica muestra una tendencia al descenso durante los años 2008 a 2010 a diferencia de la región Amazonía-Orinoquía donde la mortalidad ha tendido al incremento. (Tabla 6)

Tabla 6. Tasas brutas de mortalidad según regiones. Colombia 2008-2010


Tasa bruta de mortalidad	2008	2009	2010	Comportamiento
Región Caribe e insular	386,09	392,79	377,62	<i>/</i> \
Región Central	612,76	593,55	602,06	<b>\</b> ∕
Región Bogotá-Cundinamarca	508,76	485,83	516,94	$\searrow \nearrow$
Región Oriental	656,37	646,90	679,05	<b>\1</b>
Región Pacífica	1633,85	507,14	504,21	77
Región Amazonía-Orinoquía	294,37	309,19	326,18	77
Total Colombia	514,11	506,02	513,98	$\searrow \nearrow$

Fuente DANE y Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO, Cubo de Estadísticas Vitales - EEVV 2008 a 2010.

Para el año 2010 el comportamiento de la mortalidad por edad y sexo muestra que la población de los hombres describe una curva trifásica, donde un 4,85% del total de las muertes ocurren en los hombres menores de 5 años, la mortalidad en la población escolar es relativamente baja hasta los 14 años. Se evidencia un incremento progresivo en la mortalidad de los adolescentes para alcanzar un pico máximo entre los jóvenes de 20 a 29 años cuyo descenso máximo se alcanza la población de 35 a 39 y a partir de los 40 años empieza a aumentar progresivamente la mortalidad para acelerarse entre las edades de 75 años en adelante. En las mujeres el 5,01% de las muertes ocurren en las menores de 5 años y aumenta progresivamente a partir de la adolescencia hasta los 79 donde se acelera para las edades superiores. (Figura 62)








Fuente: DANE y SISPRO, Cubo de Estadísticas Vitales-EEVV

Figura 62. Mortalidad general por sexo y edad. Colombia, 2010

Por régimen de afiliación durante el año 2010, el régimen subsidiado experimentó el 43,55% de la mortalidad general seguido del contributivo con un 34,31%. La población no asegurada aportó un 13,58% de las defunciones. (Figura 63)




Fuente: DANE, Estadísticas de Mortalidad, 2010.

Figura 63. Mortalidad general por régimen de afiliación. Colombia, 2010

Durante el periodo 2008-2010 las enfermedades del sistema circulatorio fueron responsables de cerca del 25% de la mortalidad general, seguida de las demás enfermedades y las neoplasias con un 22,04% y un 15,42% respectivamente. (Figura 64)




# PROSPERIDAD PARA TODOS



Fuente: DANE y SISPRO, Cubo de EEVV 2008 a 2010.

Figura 64. Mortalidad general según grandes causas. Colombia, 2008-2010

Durante el año 2010 las enfermedades del sistema circulatorio representaron la causa más frecuente de mortalidad en hombres produciendo 30.510 muertes, lo cual corresponde al 25,63% de la mortalidad en este sexo y el 13,04% de la mortalidad total. Entre los años 2008 y 2010 la tasa de mortalidad ajustada por edad mostro un descenso pasando de 66,64 a 63,21. La segunda causa de mortalidad en hombres para el año 2010 fueron las causas externas, que produjeron 28.952 muertes; es decir, un 24,32% del total de la mortalidad en los hombres y un 12,38% de la mortalidad general. (Figura 65)



Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV- 2008 a 2010.


Figura 65. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes grupos de causas. Colombia, 2008-2010

Durante el año 2010 las enfermedades del sistema circulatorio representaron la causa más frecuente de mortalidad en mujeres produciendo 28.888 muertes, lo cual corresponde al 32,24%





de la mortalidad en este sexo y el 12,35% de la mortalidad total. Entre los años 2008 y 2010 la tasa de mortalidad ajustada por edad muestro un descenso pasando de 61,16 a 57,11. La segunda causa de mortalidad en mujeres para el año 2010 fueron las demás enfermedades seguidas de las neoplasias; estas últimas produjeron 18.412 muertes que corresponden al 20,55% de la mortalidad en las mujeres y al 7,87% de la mortalidad general. (Figura 66)




Fuente: DANE y SISPRO Cubo EEVV-2008 A 2010.

Figura 66. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes grupos de causas. Colombia, 2008-2010

La mortalidad general se presentó porcentualmente diferente en todas las regiones, aunque entre las primeras cuatro causas de muerte se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio, las causas externas, las enfermedades del periodo perinatal y las neoplasias en todas las regiones. (Figura 67)



## PROSPERIDAD PARA TODOS




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV- 2010.

Figura 67. Mortalidad por regiones. Colombia, 2010

### Región Amazonía-Orinoquía

En la región Amazonía-Orinoquía se produjo el 0,82% (1.896 muertes) de la mortalidad del país durante el año 2010. Las causas externas causaron el 25,42% (482 muertes) de la mortalidad de la región y alcanzaron una tasa ajustada de 87,82, seguidas del grupo de las demás enfermedades con un 20,94% (397 muertes) y una tasa de 87,38 y de las enfermedades del sistema circulatorio con un 15,35% (291 muertes) y una tasa de 75,45. (Figura 68)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV- 2008 A 2010.





Figura 68. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de causas. Colombia, 2008-2010

Para el año 2010 al 61,81% (1.172 muertes) de las defunciones ocurridas en la Amazonía-Orinoquía corresponde al grupo de los hombres, durante este año las causas externas causaron el 35,49% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre el año 2008 y 2010 con tasas ajustadas por edad entre 73,27 y 76,89. El grupo de las demás enfermedades y las enfermedades del sistema circulatorio son la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 49,57 y 45,74 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. (Figura 69)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010.

Figura 69. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes grupos de causas. Región Amazonía-Orinoquía, 2008-2010

Para el año 2010 el 32,28% (612 muertes) de las defunciones ocurridas en la Amazonía-Orinoquía corresponde al grupo de las mujeres, durante este año el grupo de las demás causas causaron el 28,27% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre el año 2008 y 2010. El grupo de las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias son la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 29,71 y 24,19 respectivamente para el año 2010. (Figura 70)








Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV- 2008 A 2010.

Figura 70. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes grupos de causas. Región Amazonía-Orinoquía, 2008-2010

#### Región Bogotá-Cundinamarca

En la región Bogotá-Cundinamarca se produjo el 22,06% (50.871 muertes) de la mortalidad del país durante el año 2010. La principal causa de muerte está relacionada con las enfermedades del sistema circulatorio que produjeron el 23,47% (11.940 muertes) de las defunciones de la región y alcanzaron una tasa ajustada de 114,49; seguidas del grupo de las demás enfermedades y de las neoplasias con tasas ajustadas de 106,19 y 80,33 respectivamente. (Figura 71)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 A 2010.

Figura 71. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de causas. Región Bogotá-Cundinamarca, 2008-2010.





Para el año 2010 el 43,80% (22.284 muertes) de las defunciones ocurridas en la región Bogotá-Cundinamarca corresponde al grupo de los hombres, durante este año las enfermedades del sistema circulatorio causaron el 26,24% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre los años 2008 y 2010 aunque las tasas ajustadas muestran un descenso pasando de 61.79 a 57.23. El grupo de las demás enfermedades y las neoplasias constituyen la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 52,62 y 38,76 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. (Figura 72)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010

Figura 72. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes grupos de causas. Región Bogotá-Cundinamarca, 2008-2010

Para el año 2010 el 37,41% (19.033 muertes) de las defunciones ocurridas en la región Bogotá-Cundinamarca ocurrieron en el grupo de las mujeres, durante este año las enfermedades del sistema circulatorio causaron el 32,01% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre los años 2008 y 2010 con tasas ajustadas entre 63,41 y 54,55. El grupo de las demás enfermedades y las neoplasias constituyen la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 53,56 y 41,57 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. (Figura 73)








Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010.

Figura 73. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes grupos de causas. Región Bogotá-Cundinamarca, 2008-2010

### Región Caribe

La región Caribe aporto el 15,96% (36.810 muertes) de la mortalidad del país durante el año 2010. La principal causa de muerte está relacionada con las enfermedades del sistema circulatorio que produjeron el 26,11% (9.612 muertes) de las defunciones de la región y alcanzaron una tasa ajustada de 100,56; seguidas del grupo de las demás enfermedades y de las neoplasias con tasas ajustadas de 88,04 y 57,37 respectivamente. (Figura 74)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV- 2008 a 2010.

Figura 74. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de causas. Región Caribe, 2008-2010





Para el año 2010 el 51,46% (18.943 muertes) de las defunciones ocurridas en la región Caribe corresponde al grupo de los hombres, durante este año las enfermedades del sistema circulatorio causaron el 26,33% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre los años 2008 y 2010 aunque las tasas ajustadas muestran un descenso pasando de 58,11 a 53.39. El grupo de las demás enfermedades y las neoplasias constituyen la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 43,88 y 39,42 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. (Figura 75)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010.

Figura 75. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes grupos de causas. Región Caribe, 2008-2010

Durante el 2010 el 39,84% (14.664 muertes) de las defunciones ocurridas en la región Caribe corresponde al grupo de las mujeres, durante este año las enfermedades del sistema circulatorio causaron el 31,53% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre los años 2008 y 2010 aunque las tasas ajustadas muestran un descenso pasando de 52,90 a 47.16. El grupo de las demás enfermedades y las neoplasias constituyen la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 44,14 y 28,75 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. (Figura 76)








Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010.

Figura 76. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes grupos de causas. Región Caribe, 2008-2010

### **Región Central**

Durante el año 2010 la región Central aporto el 29,86% (68.862 muertes) de la mortalidad del país. La principal causa de muerte fueron las causas externas que aportaron un 15,50% (10.672 muertes) de las defunciones de la región y alcanzaron una tasa ajustada de 73,23; seguidas del grupo de las enfermedades del sistema circulatorio y de las demás enfermedades con tasas ajustadas de 69,93 y 54,80 respectivamente. (Figura 77)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010

Figura 77. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de causas. Región Central, 2008-2010





Para el año 2010 el 50,99% (18.943 muertes) de las defunciones ocurridas en la región Central corresponde al grupo de los hombres, durante este año las causas externas causaron el 26,29% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre los años 2008 y 2010 con tasas ajustadas entre 73,39 y 83,85. El grupo de las enfermedades del sistema circulatorio y las demás enfermedades constituyen la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 69,93 y 54,80 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. (Figura 78)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010

Figura 78. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes grupos de causas. Región Central, 2008-2010

El 37,49% (25.814 muertes) de las defunciones ocurridas en la región Central durante el año 2010 corresponde al grupo de las mujeres; durante este año, las enfermedades del sistema circulatorio causaron el 33,16% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre los años 2008 y 2010 con tasas ajustadas entre 65,02 y 60,86. El grupo de las demás enfermedades y las neoplasias constituyen la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 54,18 y 45,28 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. (Figura 79)








Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010.

Figura 79. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes grupos de causas. Región Central, 2008-2010

#### **Región Oriental**

Durante el año 2010 la región Central aporto el 14,20% (32.736 muertes) de la mortalidad del país. La principal causa de muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio que aportaron un 28,22% (9.239 muertes) de las defunciones de la región y alcanzaron una tasa ajustada de 184,53; seguidas del grupo de las demás enfermedades y de las neoplasias con tasas ajustadas de 155,65 y 106,39 respectivamente. (Figura 80)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV- 2008 a 2010.





Figura 80. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de causas. Región Oriental, 2008-2010

Para el año 2010 el 52,63% (17.228 muertes) de las defunciones ocurridas en la región Oriental corresponde al grupo de los hombres, durante este año las enfermedades del sistema circulatorio causaron el 28,46% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre los años 2008 y 2010 con tasas ajustadas entre 103,17 y 95,86. El grupo de las demás enfermedades y las causas externas constituyen la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 82,54 y 69,44 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. Llama la atención la tendencia al descenso que muestra la mortalidad por causas externas (Figura 81)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010.

Figura 81. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes grupos de causas. Región Oriental, 2008-2010

El 38,93% (12.744 muertes) de las defunciones ocurridas en la región Oriental durante el año 2010 corresponde al grupo de las mujeres; durante este año, las enfermedades del sistema circulatorio causaron el 34,02% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre los años 2008 y 2010 con tasas ajustadas entre 89,70 y 82,15. El grupo de las demás enfermedades y las neoplasias constituyen la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 73,10 y 53,10 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. (Figura 82)








Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010

Figura 82. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes grupos de causas. Región Oriental, 2008-2010

#### Región Pacífica

Durante el año 2010 la región Pacífica aporto el 17,09% (39.420 muertes) de la mortalidad del país. La principal causa de muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio que aportaron un 25,59% (10.089 muertes) de las defunciones de la región y alcanzaron una tasa ajustada de 114,09; seguidas del grupo de las demás enfermedades y de las causas externas con tasas ajustadas de 99,02 y 93,19 respectivamente. (Figura 83)




Fuente: Elaborado a partir de los datos de mortalidad del DANE dispuestos en el Cubo EEVV-SISPRO





## Figura 83. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, según grandes grupos de causas. Región Pacífica, 2008-2010

Para el año 2010 el 55,74% (21.971 muertes) de las defunciones ocurridas en la región Pacífica corresponde al grupo de los hombres, durante este año las causas externas provocaron el 30,71% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre los años 2008 y 2010 con tasas ajustadas entre 80,82 y 83,86. Las enfermedades del sistema circulatorio y el grupo de las demás enfermedades y las constituyen la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 59,30 y 49,40 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. (Figura 84)




Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV- 2008 a 2010.

Figura 84. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en hombres, según grandes grupos de causas. Región Pacífica, 2008-2010

Para el año 2010 el 40,29% (15.882 muertes) de las defunciones ocurridas en la región Pacífica corresponde al grupo de las mujeres, durante este año las enfermedades del sistema circulatorio provocaron el 31,19% de las muertes en este sexo para la región y han sido la primera causa de muerte entre los años 2008 y 2010 con tasas ajustadas entre 57,90 y 54,79. El grupo de las demás enfermedades y las neoplasias constituyen la segunda y tercera causa de muerte más frecuente de mortalidad con tasas ajustadas de 49,62 y 42,25 por cada 100.000 habitantes respectivamente para el año 2010. (Figura 85)








Fuente: DANE y SISPRO, Cubo EEVV 2008 a 2010.

Figura 85. Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 habitantes, en mujeres, según grandes grupos de causas. Mujeres Región Pacífica, 2008-2010

#### **Mortalidad infantil**

En Colombia la mortalidad infantil ha tenido una tendencia al descenso entre los años 2005 y 2010, partiendo de una tasa de 15,91 a una de 12,76 por cada 1.000 nacidos vivos, lo cual indica una reducción de 3 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2010 comparado con el año 2005. Dentro de la mortalidad infantil la mortalidad neonatal ocupa un gran porcentaje, cerca del 63% de los casos se producen durante los primeros 28 días luego del nacimiento (Asi Vamos en Salud. 2010)<sup>2</sup>. (Figura 86)




Fuente DANE y SISPRO, Cubo de indicadores- 2005 a 2010.





Figura 86. Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Colombia, 2005-2010

Para el año 2010 se registraron un total de 8.355 muertes de niños menores de un año, el 56,79% (4.745 muertes) correspondió a los hombres y el 43,17% (3.607 muertes) a las mujeres. El 50% de las muertes eran hijos de mujeres entre 15 y 24 años. Las mujeres menores de 14 años experimentaron el 1,4% de la mortalidad infantil. (Figura 87)



Fuente: DANE. 2010.


Figura 87. Mortalidad infantil por sexo, según grupo de edad de la madre. Colombia, 2010

Durante el año 2010, el 21,62% (1.806) de las muertes en menores de un año fueron causados por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, el 13,23% (1.105 muertes) a malformaciones congénitas del sistema circulatorio y el 11,84% (989 muertes) a las demás malformaciones congénitas, deformidades y anomalías.

Por regiones, la región Amazonía-Orinoquía tiene las tasas de mortalidad infantil más altas, en el año 2005 la tasa fue de 20,85 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, tuvo un incremento alcanzando un valor de 23,76 en el año 2006 para luego seguir un descenso sostenido que la posiciona en 19,72 para el año 2010. La región pacífica ha seguido una tendencia constante durante el quinquenio analizado con tasas que se han mantenido alrededor de 15 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Las demás regiones siguen un patrón de descenso. (Figura 88)







Fuente: DANE y SISPRO, Cubo de indicadores- 2005 a 2010.


Figura 88. Mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, según regiones. Colombia, 2005-2010

Por departamentos la mortalidad infantil es más alta en Guainía, Vichada, Choco, Amazonas y San Andrés donde se producen más de 20 muertes en menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos las tasas de mortalidad son significativamente más altas que las del país<sup>5</sup>. Las tasa de mortalidad infantil de Guainía y de Amazonas son un 71% y un 80% más altas que las de Colombia respectivamente. Las tasas de Choco, vichada y Guainía son 1,64, 1,97 y 2,05 veces más altas que las de Colombia respectivamente. Ningún departamento tiene tasas significativamente más bajas que la de Colombia. (Mapa 13)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Se calcularon razones de tasas y sus intervalos de confianza al 95%...








Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO y DANE Cubo de indicadores 2010.

Mapa 13. Tasas de mortalidad en menores infantil por 1.000 nacidos vivos, según departamentos. Colombia, 2010





Los departamentos como Choco, Vichada y Guainía, con mayor proporción de personas en necesidades básicas insatisfechas experimentan mayor mortalidad infantil. (Figura 89)




Fuente: DANE y-SISPRO y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012.

Figura 89. Tasas de mortalidad infantil según NBI, según regiones. Colombia, 2010

Sin embargo, la pobreza parece no generar grandes desigualdades en la distribución de la mortalidad infantil, puesto que tan solo el 53% de la mortalidad se concentra en la población más pobre con un índice de concentración de -0,0635. Aun así, se puede interpretar como que el número de muertes esperadas supera a las que cabría esperar en una situación de plena igualdad. (Figura 90)







Fuente: DANE y SISPRO y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012.


Figura 90. Curva de concentración, mortalidad infantil relacionado con NBI. Colombia, 2010





#### Mortalidad en menores de cinco años

La mortalidad en menores de cinco años ha tendido al descenso entre los años 2005 y 2010 pasando de una tasa de 19,42 a 15,69 lo cual ha generado una reducción de 3,79 muertes por cada 1.000 nacidos vivos durante el quinquenio. (Figura 91)



Fuente: DANE y SISPRO, Cubo de indicadores 2005 a 2010


Figura 91. Mortalidad en menores de cinco años por 1.000 nacidos vivos. Colombia, 2005-2010

Alrededor del 82% de las muertes en niños menores de cinco años ocurren durante el primer año de vida y se atribuyen a malformaciones congénitas, trastornos respiratorios y otras afecciones del periodo perinatal, infecciones respiratorias agudas y sepsis bacteriana. En los niños de 1 a 5 años dentro de las causas de mortalidad más frecuentes están la infección respiratoria aguda y la enfermedad diarreica aguda.

Al igual que lo descrito anteriormente para la mortalidad infantil la región Amazonía-Orinoquía tiene las tasas de mortalidad en menores de cinco años más altas del país, en el año 2005 la tasa fue de 26,23 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, tuvo un pico en el año 2007 donde alcanzo una tasa de 30,99 y luego descendió hasta 25,85 en el año 2009, para el año 2010 se ubica en 27,13. La región Pacífica muestra una tendencia constante en el quinquenio con tasas que oscilan entre 17,22 y 20,29. Las demás regiones han mostrado tendencia al descenso. (Figura 92)








Fuente: DANE y SISPRO, Cubo de indicadores 2005 a 2010

Figura 92. Mortalidad en menores de cinco años por 1.000 nacidos vivos, según regiones. Colombia, 2005-2010

Los departamentos con las tasas de mortalidad en menores de cinco años significativamente más altas que la nacional son Amazonas: 2,16 veces más alta que la nacional; Guainía: 1,58 veces más alta que la de Colombia, Chocó y Vichada: 1,37 y 1,33 veces más alta que la nacional respectivamente y por último Caquetá y Amazonas con tasas 77% y 66% más altas que la del total país. En todos estos departamentos las tasas superan las 29 por cada 1.000 nacidos vivos. (Mapa 14)








Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, SISPRO, DANE Cubo de indicadores - 2010.

Mapa 14. Tasas de mortalidad en menores de cinco años por 1.000 nacidos vivos, según departamentos. Colombia, 2010





Al igual que en la mortalidad infantil la pobreza parece no generar grandes desigualdades en la distribución de la mortalidad infantil, puesto que tan solo cerca del 53% de la mortalidad se concentra en la población más pobre con un índice de concentración de -0,0729. Aun así, se puede interpretar como que el número de muertes esperadas supera a las que cabría esperar en una situación de plena igualdad. (Figura 93)



Fuente: DANE y SISPRO, Cubo de indicadores y Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012

Figura 93. Curva de concentración, mortalidad en menores de cinco años relacionado con NBI. Colombia, 2010





#### Morbilidad

En Colombia la morbilidad atendida es registrada a través de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) de manera periódica al Ministerio de Salud y Protección Social y estos datos se han puesto a disposición de los usuarios a través del Cubo RIPS-SISPRO.

Durante el año 2011 en Colombia se registraron 80.048.565 atenciones, el 93,62% (74.939.878) fueron consultas, el 4,56% (3.648.566) urgencias y el 1,82% (1.460.121) hospitalizaciones. Así mismo, se atendieron un total de 19.212.629 personas, el 84,97% (16.324.516) fueron consultas, el 10,17% (1.953.988) urgencias y el 4,86% (934.125) hospitalizaciones. La diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, la parasitosis intestinal y la hipertensión esencial son los diagnósticos por los que con mayor frecuencia consultan las personas. De la misma forma estos diagnósticos encabezan las causas de urgencias y hospitalizaciones más frecuentes.

A continuación se presenta la consulta de los 10 primeros diagnósticos por los que fueron atendidas las personas durante el año 2011, el número de atenciones registradas y la concentración, que es el cociente entre el número de personas atendidas y el número de atenciones. Estos datos se presentan por regiones y por edades. (Tablas 7 a la 14).





### Morbilidad atendida por regiones

### Región Caribe

Tabla 7. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Caribe, Colombia, 2011

Tino do otomoión	Código	Diagrafatica	Total	Total	Canaantrasián
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	atenciones	personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	118.629	83.101	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	125.149	95.117	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	980.941	269.268	4
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	360.518	244.938	1
	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	102.475	74.971	1
Consultas	K021	Caries de la dentina	378.230	160.368	2
	K051	Gingivitis crónica	170.722	98.741	2
	M545	Lumbago no especificado	171.513	110.901	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	246.737	161.427	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	101.535	72.345	1
		Total consultas	3.976.244	1.503.512	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	37.225	26.204	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	19.600	12.964	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	28.613	22.689	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	12.580	9.787	1
	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	14.024	10.950	1
Urgencias	J459	Asma, no especificada	15.864	10.940	1
	M545	Lumbago no especificado	21.943	15.123	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	18.688	13.239	1
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	13.793	9.562	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	24.159	17.708	1
		Total urgencias	378.636	226.662	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4.867	3.777	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	3.182	2.237	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	6.696	5.080	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	2.786	2.197	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	6.823	5.167	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3.126	2.646	1
	R509	Fiebre, no especificada	6.200	5.033	1
	R51x	Cefalea	2.800	2.237	1
		Total hospitalizaciones	71.255	53.751	1



Tabla 8. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Caribe, Colombia, 2011

	011			De 0 a 4 años		D	e 05 a 09 añ	OS	D	e 10 a 14 año	s	De	e 15 a 19 añ	ios
Tipo de atención	Código CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas Con	centración A	Atenciones	Personas C	oncentración A	Atenciones	Personas Co	ncentración A	Atenciones I	Personas C	oncentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	35.054	22.646	2	11.990	8.760	1	4.721	3.609	1	3.627	2.817	,
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	18.799	14.095	1	36.058	27.127	1	22.763	17.491	1	10.228	8.097	
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	334	279	1	534	343	1	836	429	2	1.262	651	:
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	109.241	65.178	2	64.380	44.172	1	26.577	19.807	1	16.746	12.668	
Consultas	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	32.486	22.310	1	19.295	14.143	1	6.871	5.306	1	4.074	3.242	
Oorisallas	K021	Caries de la dentina	3.943	2.151	2	35.471	18.110	2	26.650	13.143	2	29.182	12.937	
	K051	Gingivitis crónica	2.092	1.681	1	9.669	7.182	1	10.282	6.966	1	13.698	8.822	
	M545	Lumbago no especificado	412	342	1	695	555	1	1.489	1.114	1	4.564	3.381	
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	15.087	8.908	2	14.776	9.898	1	9.723	7.041	1	11.624	8.507	
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3.315	2.522	1	7.123	5.255	1	7.141	5.247	1	7.963	5.865	
		Total consultas	560.526	195.218	3	461.331	205.095	2	202.125	106.485	2	161.485	85.046	:
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9.655	6.495	1	3.064	2.231	1	1.204	915	1	1.193	862	
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	12	12	1	7	7	1	21	8	3	55	40	
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	10.586	7.588	1	3.587	2.868	1	1.172	999	1	833	714	
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	2.919	2.121	1	2.495	1.958	1	1.008	865	1	721	569	•
	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	5.908	4.162	1	2.268	1.814	1	627	515	1	336	290	
Urgencias	J459	Asma, no especificada	4.744	3.364	1	2.932	2.041	1	1.324	964	1	559	418	
		Lumbago no especificado	44	34	1	65	50	1	120	99	1	468	348	
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.597	1.096	1	1.133	719	2	553	415	1	1.144	794	
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	19	16	1	160	108	1	272	204	1	541	384	
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	601	476	1	960	736	1	1.434	1.045	1	1.950	1.488	
		Total urgencias	65.728	34.418	2	35.271	21.438	2	17.133	11.676	1_	18.762	12.506	
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.069	1.523	1	551	412	1	184	150	1	126	110	
	110x	Hipertensión esencial (primaria)	11	7	2	2	2	1	9	6	2	17	14	
		Bronconeumonía, no especificada	4.275	3.238	1	1.061	765	1	213	167	1	136	90	
	K359	Apendicitis aguda, no especificada Infección de vías urinarias, sitio no	34	34	1	107	94	1	310	243	1	429	336	•
Hospitalizaciones	N390	especificado	1.450	1.044	1	568	407	1	207	161	1	279	233	
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	71	63	1	211	178	1	226	187	1	278	235	
		Fiebre, no especificada	2.531	1.977	1	1.062	818	1	365	313	1	291	251	
	R51x	Cefalea	18	18	1	73	55	1	95	78	1	181	156	·
		Total hospitalizaciones	10.548	7.538	1	3.678	2.644	1	1.665	1.308	1	4.690	3.870	



			De	e 20 a 24 años		De	25 a 29 años		De	e 30 a 34 años		De	e 35 a 39 añ	OS
Tipo de atención	Código CIE10		Atenciones F	Personas Conce	ntración A	tenciones l	Personas Conce	entración A	Atenciones I	Personas Conce	entración A	Atenciones F	Personas C	oncentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5.975	4.578	1	9.718	6.987	1	10.149	7.167	1	7.564	5.445	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	4.393	3.622	1	4.719	3.673	1	4.590	3.446	1	3.812	2.869	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	2.143	1.126	2	4.526	2.086	2	9.672	4.025	2	17.863	6.474	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	14.481	11.095	1	17.207	12.641	1	16.550	11.987	1	13.991	10.088	1
Consultas	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	3.552	2.813	1	4.294	3.342	1	4.428	3.442	1	3.720	2.826	1
Consultas	K021	Caries de la dentina	24.705	11.993	2	34.654	15.163	2	43.567	17.246	3	37.667	14.837	3
	K051	Gingivitis crónica	14.136	9.218	2	18.589	11.290	2	21.622	12.101	2	18.410	9.998	2
	M545	Lumbago no especificado	7.354	5.432	1	13.132	8.923	1	17.849	11.580	2	18.389	11.736	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	15.701	11.389	1	20.896	14.577	1	23.045	15.410	1	20.453	13.684	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8.500	6.348	1	10.443	7.673	1	10.757	7.598	1	8.675	6.139	1
		Total consultas	155.518	78.499	2	197.506	92.779	2	214.369	95.491	2	192.411	82.420	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.329	1.955	1	3.876	2.873	1	3.992	2.667	1	2.649	1.784	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	120	91	1	290	208	1	514	358	1	785	534	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	1.725	1.519	1	2.640	2.276	1	2.243	1.878	1	1.422	1.201	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	831	728	1	1.211	967	1	1.070	813	1	739	546	1
	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	550	510	1	777	681	1	791	654	1	502	427	1
Urgencias	J459	Asma, no especificada	541	426	1	711	512	1	733	434	2	543	373	1
	M545	Lumbago no especificado	1.295	1.076	1	2.749	1.958	1	3.223	2.137	2	2.888	1.879	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.755	1.458	1	2.518	1.812	1	2.243	1.578	1	1.605	1.109	1
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	625	501	1	978	682	1	1.285	835	2	1.226	803	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	2.422	1.971	1	2.921	2.208	1	2.835	1.962	1	2.032	1.441	1
		Total urgencias	27.245	18.976	1	38.497	23.458	2	37.621	21.100	2	26.811	15.343	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	160	153	1	259	217	1	274	219	1	181	143	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	24	22	1	49	38	1	72	58	1	74	60	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	111	107	1	118	100	1	110	89	1	70	55	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	361	315	1	402	306	1	374	280	1	231	177	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	419	366	1	555	454	1	479	369	1	342	266	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	258	236	1	304	262	1	345	281	1	235	195	1
	R509	Fiebre, no especificada	225	215	1	271	236	1	232	189	1	181	148	1
	R51x	Cefalea	302	249	1	368	298	1	360	271	1	312	236	1
		Total hospitalizaciones	9.780	8.237	1	12.204	9.399	1	10.627	7.615	1	5.570	4.006	1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO, Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud- RIPS, 2011 dispuestos en el Cubo RIPS-SISPRO



	Cádica		D	e 40 a 44 a	ños		e 45 a 49 a	iños		e 50 a 54 año	os	D	e 55 a 59 añ	os
Tipo de atención	Código CIE10		Atenciones	Personas	Concentración A	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas Co	oncentración	Atenciones	Personas C	oncentració
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6.108	4.380	1	5.176	3.651	1	4.203	3.013	1	3.308	2.358	
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	3.560	2.706	1	3.409	2.542	1	3.122	2.279	1	2.437	1.798	
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	35.629	11.975	3	66.732	20.695	3	101.006	29.363	3	120.545	33.340	
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	13.029	9.424	1	12.854	9.281	1	12.098	8.618	1	10.120	7.085	
Consultas	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	3.493	2.707	1	3.678	2.715	1	3.389	2.520	1	2.993	2.204	
Corisuitas	K021	Caries de la dentina	36.223	13.976	3	32.838	12.420	3	25.880	9.607	3	17.430	6.600	
	K051	Gingivitis crónica	16.284	8.532	2	13.940	7.218	2	10.573	5.330	2	7.655	3.696	
	M545	Lumbago no especificado	20.169	12.679	2	20.559	12.832	2	18.244	11.477	2	14.050	8.818	
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	19.932	13.255	2	19.450	12.658	2	17.226	11.014	2	13.466	8.365	
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	7.909	5.628	1	7.098	4.924	1	5.723	3.949	1	4.234	2.868	
		Total consultas	202.321	81.788	2	231.071	85.598	3	244.323	81.307	3	230.088	69.650	
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.933	1.337	1	1.575	1.081	1	1.337	941	1	986	700	
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	1.100	737	1	1.728	1.158	1	2.215	1.476	2	2.205	1.468	
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	1.152	945	1	848	706	1	717	590	1	455	396	
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	486	383	1	361	281	1	300	231	1	187	130	
	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	446	376	1	366	308	1	318	270	1	234	200	
Urgencias	J459	Asma, no especificada	610	390	2	531	350	2	526	339	2	461	277	
	M545	Lumbago no especificado	2.809	1.831	2	2.429	1.642	1	1.829	1.279	1	1.248	860	
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.235	882	1	970	700	1	774	563	1	557	422	
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	1.344	906	1	1.391	938	1	1.273	890	1	1.142	784	
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	1.824	1.272	1	1.668	1.170	1	1.397	973	1	937	694	
		Total urgencias	21.966	13.151	2	19.068	11.639	2	16.435	10.153	2	12.510	7.700	
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	148	120	1	154	125	1	113	98	1	100	83	
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	122	85	1	202		1	245	188	1	257	198	
	J180	Bronconeumonía, no especificada	76	56	1	50	41	1	46	41	1	49	38	
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	174	125	1	131	100	1	77	60	1	48	40	
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	240	191	1	251	194	1	199	154	1	244	187	
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	230	197	1	232	197	1	145	123	1	128	100	
	R509	Fiebre, no especificada	137	123	1	118	100	1	108	89	1	119	101	
	R51x	Cefalea	238	195	1	224	182	1	185	137	1	157	124	
		Total hospitalizaciones	2.527	1.889	1	1.494	1.141	1	1.170	899	1	1.126	848	



			De	e 60 a 64 años		De	e 65 a 69 años		De	70 a 74 años		De	e 75 a 79 añ	os
Tipo de atención	Código CIE10		Atenciones F	Personas Conce	ntración A	Atenciones I	Personas Conc	entración A	tenciones F	Personas Conc	entración /	Atenciones F	Personas C	oncentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.705	1.901	1	2.080	1.458	1	2.010	1.403	1	1.727	1.174	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	2.029	1.519	1	1.588	1.202	1	1.400	1.044	1	994	724	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	137.357	35.757	4	126.553	32.535	4	125.136	31.612	4	103.116	25.953	4
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	8.871	6.043	1	6.921	4.817	1	6.416	4.447	1	4.940	3.388	1
Consultas	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	2.624	1.932	1	2.093	1.516	1	1.916	1.426	1	1.535	1.076	1
Consultas	K021	Caries de la dentina	12.312	4.644	3	7.645	3.034	3	4.879	2.017	2	2.557	1.151	2
	K051	Gingivitis crónica	5.419	2.622	2	3.655	1.724	2	2.286	1.122	2	1.194	590	2
	M545	Lumbago no especificado	11.303	7.131	2	7.952	5.017	2	6.430	4.107	2	4.291	2.811	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	11.655	7.168	2	9.254	5.635	2	8.243	5.044	2	6.719	3.795	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3.433	2.338	1	2.533	1.725	1	2.194	1.477	1	1.888	1.166	2
		Total consultas	226.452	63.038	4	191.501	50.787	4	180.713	46.380	4	145.237	36.443	4
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	784	538	1	578	411	1	586	414	1	579	391	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	2.235	1.489	2	2.026	1.248	2	1.949	1.297	2	1.747	1.162	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	354	294	1	235	190	1	208	173	1	147	124	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	109	87	1	48	43	1	31	22	1	16	12	1
	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	212	177	1	176	144	1	127	112	1	157	126	1
Urgencias	J459	Asma, no especificada	425	241	2	280	180	2	307	215	1	248	155	2
	M545	Lumbago no especificado	971	658	1	553	386	1	474	349	1	325	221	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	645	353	2	437	304	1	415	286	1	360	259	1
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	919	654	1	701	501	1	652	450	1	503	361	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	772	551	1	561	420	1	587	423	1	518	348	1
		Total urgencias	10.563	6.308	2	7.659	4.646	2	7.279	4.513	2	6.291	3.779	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	99	81	1	87	67	1	109	79	1	75	59	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	345	269	1	271	201	1	313	223	1	364	262	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	44	37	1	62	41	2	62	51	1	62	47	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	40	31	1	21	17	1	19	16	1	11	10	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	275	193	1	213	160	1	206	157	1	286	201	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	116	95	1	74	67	1	79	61	1	82	71	1
	R509	Fiebre, no especificada	105	86	1	99	80	1	93	80	1	93	80	1
	R51x	Cefalea	85	73	1	50	38	1	54	44	1	37	30	1
		Total hospitalizaciones	1.130	855	1	900	650	1	952	692	1	1.020	728	1



	٠		D	e 80 años d	o más		Total	
Tipo de atención	Código CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.474	1.728	1	118.629	83.101	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	1.192	838	1	125.149	95.117	•
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	127.516	32.559	4	980.941	269.268	
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	5.960	4.105	1	360.518	244.938	•
Consultas	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	1.986	1.414	1	102.475	74.971	
Consultas	K021	Caries de la dentina	2.499					
	K051	Gingivitis crónica	1.164					
	M545	Lumbago no especificado	4.607	2.951	2	171.513	110.901	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	9.424	5.025	2	246.737	161.427	. 2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2.577	1.598	2	101.535	72.345	; 1
		Total consultas	177.994	46.791	4	3.976.244	1.503.512	: 3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	890	601	1	37.225	26.204	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	2.585	1.665	2	19.600	12.964	
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	283	-				
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	45	28	2	12.580	9.787	<u> </u>
	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	227	182	1	14.024	10.950	1
Urgencias	J459	Asma, no especificada	384	258				
	M545	Lumbago no especificado	451	314	1	21.943	15.123	3
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	743	485	2	18.688	13.239	1
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	762	545	1	13.793	9.562	! 1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	728	518	1	24.159	17.708	3 1
		Total urgencias	9.692	5.781	2	378.636	226.662	. 2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	178	138	1	4.867	3.777	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	805					
	J180	Bronconeumonía, no especificada	151					
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	17	13	1	2.786	2.197	' 1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	610	430	1	6.823	5.167	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	111	97	1	3.126	2.646	<b>i</b> 1
	R509	Fiebre, no especificada	169	146	1	6.200	5.033	3 1
	R51x	Cefalea	60	52	1	2.800	2.237	' 1
		Total hospitalizaciones	2.158	1.419	2	71.255	53.751	1





### **Región Central**

Tabla 9. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Central, Colombia, 2011

Tipo de atención	Código CIE10	Diagnóstico	Total atenciones	Total personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	252.947	178.122	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	1.596.113	514.689	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	280.745	203.335	1
	K021	Caries de la dentina	539.582	295.690	2
	K051	Gingivitis crónica	381.233	234.814	2
Consultas	M545	Lumbago no especificado	257.375	159.097	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	243.260	152.550	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	216.092	143.271	1
		Cefalea	197.063	138.142	1
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	293.132	176.380	2
		Total consultas	5.927.763	2.205.483	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	41.578	31.821	1
	B349	Infección viral, no especificada	15.189	12.356	1
	G439	Migraña, no especificada	11.334	8.107	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	18.325	15.227	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	12.718	10.865	1
Urgencias	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	18.732	15.080	1
e.gee.ae	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	12.731	10.497	1
	J459	Asma, no especificada	29.370	15.832	2
	M545	Lumbago no especificado	13.341	10.089	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	23.569	17.032	1
		Total urgencias	340.736	214.726	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4.142	3.519	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	2.565	2.158	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	4.664	3.779	1
	J189	Neumonía, no especificada	6.138	4.881	1
Hospitalizaciones	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada	3.211	2.453	1
	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	2.906	2.164	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	5.453	4.761	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	12.069	9.254	1
	N939	Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	2.635	2.221	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4872	4160	1
		Total hospitalizaciones	80188	62796	1



Tabla 10. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Central, Colombia, 2011

Tino do otonoión	Código	) Diagnástica		De 0 a 4 años		[	De 05 a 09 a	años		De 10 a 14 a	años	[	De 15 a 19 ai	ĭos
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas Cor	ncentració	n Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas (	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	53.249	34.987	2	24.492	18.094	1	12.106	9.465	1	10.212	8.036	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	229	163	1	364	186	2	484	201	2	1.574	780	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	83.694	55.072	2	42.570	31.315	1	16.203	12.732	1	11.993	9.561	1
		Caries de la dentina	10.178	6.266	2	63.221	38.464	2	43.368	27.796	2	44.576	27.610	2
		Gingivitis crónica	4.986	3.519	1	26.207	18.241	1	27.506	18.534	1	31.779	21.167	2
	M545	Lumbago no especificado	272	215	1	527	401	1	2.102	1.552	1	7.770	5.559	1
Consultas	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	15.197	8.134	2	14.462	8.770	2	7.893	5.495	1	11.782	8.445	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	7.029	4.957	1	16.566	11.373	1	16.895	11.449	1	16.696	11.554	1
	R51x	Cefalea	1.077	806	1	7.762	5.428	1	14.260	10.211	1	17.935	13.088	1
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	15.480	8.818	2	24.976	15.868	2	18.269	11.915	2	18.041	12.145	1
		Total consultas	506.527	210.165	2	417.691	205.816	2	217.594	121.824	2	259.347	138.079	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9.127	6.705	1	4.040	3.165	1	1.880	1.502	1	1.557	1.245	1
	B349	Infección viral, no especificada	4.274	3.301	1	1.980	1.635	1	911	752	1	687	558	1
		Migraña, no especificada	1	1	1	59	39	2	266	221	1	776	549	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	7.309	5.591	1	2.262	1.908	1	692	621	1	488	424	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	2.460	1.954	1	1.713	1.439	1	726	660	1	569	508	1
Urgencias	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	3.467	2.666	1	3.434	2.707	1	1.373	1.120	1	1.086	897	1
Orgencias	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	5.274	4.074	1	1.833	1.507	1	536	455	1	351	303	1
	J459	Asma, no especificada	4.504	2.333	2	4.661	2.741	2	2.242	1.448	2	1.823	1.032	2
	M545	Lumbago no especificado	11	7	2	21	18	1	74	58	1	310	241	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.916	1.419	1	1.269	936	1	596	460	1	1.066	817	1
		Total urgencias	52.524	29.628	2	31.806	20.480	2	17.072	11.811	1	18.024	12.111	1
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.419	1.168	1	510	428	1	210	187	1	153	135	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	750	642	1	313	254	1	77	63	1	55	46	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	2.602	2.069	1	730	565	1	144	127	1	77	68	1
	J189	Neumonía, no especificada	2.068	1.638	1	767	583	1	161	127	1	100	83	1
	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada	13	12	1	3	3	1	2	2	1	3	3	1
Hospitalizaciones	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	24	22	1	12	11	1	3	3	1			
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	41	41	1	299	256	1	692	599	1	891	773	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.703	1.292	1	722	537	1	254	201	1	478	385	1
	N939	Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	1	1	1	1	1	1	16	15	1	42	39	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	136	118	1	276	246	1	357	300	1	443	374	1
		Total hospitalizaciones	10.146	7.571	1	4.213	3.196	1	2.196	1.794	1	6.336	5.266	1



Tipo de atención	Código	Diagnóstico		De 20 a 24 ai			De 25 a 29			De 30 a 34 a			De 35 a 39 añ	
ripo de aterición	CIE10	Diagnostico	Atenciones	Personas (	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas (	Concentración	Atenciones	Personas C	oncentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	21.003	15.009	1	28.598	19.533	1	25.984	17.640	1	16.424	11.583	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	3.490	1.689	2	9.010	3.636	2	19.232	7.189	3	30.592	10.855	3
		0 0 1	14.566	11.361	1	18.936	13.810	1	18.388	13.259	1	12.844	9.399	1
		Caries de la dentina	33.798	21.743	2	42.358	24.432	2	51.884	27.525	2	45.333	23.619	2
	K051	Gingivitis crónica	31.125	20.414	2	37.568	23.795	2	41.577	25.502	2	35.227	20.925	2
0	M545	Lumbago no especificado	13.116	8.942	1	20.088	12.652	2	26.394	15.943	2	24.987	15.108	2
Consultas	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	16.199	11.901	1	18.951	12.933	1	20.211	13.482	1	17.514	11.347	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16.675	12.176	1	20.354	13.808	1	21.222	13.918	2	16.417	10.773	2
	R51x	Cefalea	18.419	13.612	1	21.606	15.121	1	21.988	15.018	1	17.201	11.854	1
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	18.872	12.539	2	22.801	14.682	2	23.431	14.807	2	19.521	12.235	2
		Total consultas	299.034	140.692	2	355.631	153.318	2	377.838	157.133	2	315.215	127.800	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3.942	3.197	1	5.003	3.865	1	4.003	3.021	1	2.358	1.810	1
	B349	Infección viral, no especificada	1.306	1.126	1	1.499	1.252	1	1.259	1.041	1	802	679	1
	G439	Migraña, no especificada	1.870	1.402	1	2.391	1.674	1	2.070	1.444	1	1.232	883	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	1.424	1.268	1	1.598	1.399	1	1.293	1.144	1	778	675	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	1.267	1.108	1	1.516	1.327	1	1.188	1.019	1	745	632	1
Urgencias	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	1.823	1.536	1	2.162	1.751	1	1.903	1.533	1	1.089	908	1
Orgencias	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	739	669	1	842	747	1	774	686	1	453	406	1
	J459	Asma, no especificada	1.853	1.230	2	2.378	1.330	2	2.779	1.229	2	1.873	886	2
	M545	Lumbago no especificado	1.035	838	1	1.717	1.345	1	1.822	1.336	1	1.448	1.069	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	2.302	1.775	1	2.605	1.970	1	2.198	1.598	1	1.589	1.126	1
		Total urgencias	31.926	20.967	2	38.361	24.055	2	34.041	20.918	2	22.629	14.264	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	163	155	1	182	159	1	194	162	1	129	109	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	39	36	1	65	55	1	71	55	1	43	33	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	58	55	1	61	52	1	53	44	1	44	34	1
	J189	Neumonía, no especificada	103	96	1	112	96	1	128	100	1	101	84	1
	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada	3	2	2	5	5	1	5	5	1	7	5	1
Hospitalizaciones	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	6	6	1	5	5	1	11	8	1	5	5	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	672	630	1	681	603	1	587	487	1	394	331	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	643	567	1	703	568	1	686	521	1	443	342	1
	N939	Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	54	52	1	89	79	1	189	159	1	287	245	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	300	280	1	455	386	1	426	353	1	316	268	1
		Total hospitalizaciones	9.683	8.499	1	9.357	7.708	1	8.042	6.187	1	4.634	3.646	1



Tipo de atención	Código	Diagnóstico		De 40 a 44 añ			e 45 a 49			De 50 a 54 a			De 55 a 59 añ	
ripo de aterición	CIE10	Diagnostico	Atenciones	Personas C	oncentraciór	n Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas (	Concentración	Atenciones	Personas C	oncentraciór
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13.308	9.474	1	11.390	8.275	1	9.276	6.798	1	6.883	5.100	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	59.473	20.574	3	110.242	36.955	3	169.273	55.246	3	203.662	65.851	3
		0 0 1	11.578	8.564	1	10.907	8.135	1	9.879	7.374	1	7.886	6.096	1
		Caries de la dentina	47.094	23.759	2	46.349	22.617	2	38.131	18.109	2	27.139	12.498	2
	K051	Gingivitis crónica	33.674	19.891	2	34.618	19.738	2	27.157	15.281	2	18.275	10.295	2
	M545	Lumbago no especificado	28.826	17.040	2	31.282	18.489	2	28.631	17.109	2	22.284	13.585	2
Consultas	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	16.576	11.014	1	16.797	11.106	2	15.151	9.909	2	13.503	8.419	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	15.768	10.449	1	15.348	9.946	2	12.894	8.300	2	9.811	6.447	2
	R51x	Cefalea	16.677	11.414	1	15.981	11.009	1	13.594	9.384	1	9.390	6.467	1
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	21.284	12.935	2	23.065	13.731	2	20.547	11.931	2	16.658	9.266	2
		Total consultas	338.985	130.063	3	404.180	141.606	3	431.760	136.642	3	416.108	121.363	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.921	1.479	1	1.793	1.367	1	1.423	1.067	1	1.096	829	1
	B349	Infección viral, no especificada	569	473	1	542	457	1	381	311	1	272	220	1
	G439	Migraña, no especificada	1.029	712	1	761	547	1	461	334	1	220	152	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	619	540	1	508	461	1	410	356	1	290	263	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	641	565	1	580	514	1	420	366	1	297	257	1
Urgonoico	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	821	665	1	565	457	1	425	360	1	243	198	1
Urgencias	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	350	305	1	385	334	1	318	273	1	268	223	1
	J459	Asma, no especificada	1.411	661	2	1.404	655	2	1.108	540	2	942	486	2
		Lumbago no especificado	1.570	1.169	1	1.525	1.146	1	1.245	947	1	858	623	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.308	971	1	1.158	878	1	1.104	774	1	1.079	747	1
		Total urgencias	19.344	12.392	2	18.096	11.651	2	14.750	9.478	2	10.917	7.118	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	125	97	1	126	115	1	145	118	1	108	98	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	55	44	1	83	71	1	75	62	1	63	57	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	40	33	1	61	52	1	76	68	1	85	73	1
	J189	Neumonía, no especificada	110	87	1	133	112	1	188	150	1	193	148	1
	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada	14	7	2	43	33	1	103	81	1	206	139	1
Hospitalizaciones	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	11	9	1	33	30	1	101	78	1	160	127	1
,	K359	Apendicitis aguda, no especificada	311	264	1	254	218	1	183	154	1	131	115	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	432	336	1	380	294	1	450	337	1	508	376	1
	N939	Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	533	446	1	744	604	1	408	349	1	125	104	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	310	259	1	350	295	1	249	213	1	229	195	1
		Total hospitalizaciones	3.019	2.415	1	2.403	1.940	1	2.086	1.637	1	1.919	1.415	1



· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Código	) <u> </u>	С	e 60 a 64 a	años	С	e 65 a 69	años		De 70 a 74 a	años		De 75 a 79 ai	ĭos
Tipo de atención	CIE10		Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas C	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5.122	3.766	1	3.897	2.897	1	3.546	2.448	1	2.793	1.925	1
		Hipertensión esencial (primaria)	223.848	70.929	3	211.294	66.457	3	194.034	61.018	3	157.043	48.893	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	6.281	4.922	1	4.725	3.688	1	3.912	3.057	1	2.889	2.251	1
	K021	Caries de la dentina	17.976	8.280	2	11.783	5.425	2	7.686	3.570	2	4.213	1.905	2
		Gingivitis crónica	13.055	7.246	2	8.016	4.445	2	4.870	2.698	2	2.495	1.403	2
	M545	Lumbago no especificado	16.444	10.285	2	11.808	7.638	2	9.133	5.701	2	6.330	4.093	2
Consultas	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	12.053	7.274	2	10.512	6.173	2	9.570	5.491	2	9.331	4.759	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	7.710	5.050	2	6.529	3.868	2	5.565	3.188	2	4.237	2.409	2
	R51x	Cefalea	6.783	4.763	1	4.816	3.336	1	3.621	2.546	1	2.560	1.764	1
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	13.991	7.458	2	11.084	5.728	2	8.988	4.466	2	6.679	3.228	2
		Total consultas	399.970	108.655	4	348.979	91.516	4	301.595	78.588	4	233.879	60.632	4
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	778	606	1	643	484	1	586	440	1	472	349	1
	B349	Infección viral, no especificada	190	149	1	135	106	1	108	90	1	87	68	1
	G439	Migraña, no especificada	89	74	1	40	33	1	26	12	2	17	13	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	198	179	1	119	101	1	117	105	1	97	83	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	213	183	1	125	109	1	96	82	1	69	60	1
Urgencias	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	141	115	1	69	60	1	49	45	1	16	15	1
Orgencias	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	153	139	1	122	108	1	110	89	1	79	67	1
	J459	Asma, no especificada	581	308	2	475	265	2	374	209	2	366	190	2
	M545	Lumbago no especificado	567	440	1	347	271	1	254	190	1	185	136	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	881	588	1	815	559	1	823	545	1	881	588	1
		Total urgencias	7.816	5.114	2	5.971	3.911	2	5.186	3.285	2	4.220	2.624	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	117	101	1	93	87	1	115	95	1	126	105	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	102	84	1	108	94	1	152	131	1	130	112	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	70	59	1	81	68	1	104	89	1	86	75	1
	J189	Neumonía, no especificada	189	157	1	229	183	1	320	262	1	333	272	1
	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada	336	242	1	387	304	1	528	384	1	486	380	1
Hospitalizaciones	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	254	197	1	333	255	1	398	299	1	498	365	1
,	K359		105	95	1	61	58	1	51	48	1	37	33	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	544	406	1	537	415	1	592	480	1	779	604	1
	N939	Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	48	40	1	37	30	1	24	22	1	9	9	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	241	199	1	157	135	1	165	147	1	163	132	1
		Total hospitalizaciones	2.086	1.539	1	2.089	1.544	1	2.528	1.862	1	2.722	1.942	1



Tine de etempión	Código	Diamefatica	De	e 80 años o	más		Total	
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4.631	3.068	2	252.947	178.122	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	202.109	64.012	3	1.596.113	514.689	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	3.465	2.711	1	280.745	203.335	1
	K021	Caries de la dentina	4.404	2.008	2	539.582	295.690	2
	K051	Gingivitis crónica	3.044	1.683	2	381.233	234.814	2
	M545	Lumbago no especificado	7.366	4.770	2	257.375	159.097	2
Consultas	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	17.517	7.867	2	243.260	152.550	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	6.342	3.578	2	216.092	143.271	1
	R51x	Cefalea	3.363	2.297	1	197.063	138.142	1
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	9.429	4.614	2	293.132	176.380	2
		Total consultas	302.673	81.201	4	5.927.763	2.205.483	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	954	688	1	41.578	31.821	1
	B349	Infección viral, no especificada	182	135	1	15.189	12.356	1
	G439	Migraña, no especificada	25	16	2	11.334	8.107	1
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	121	107	1	18.325	15.227	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	93	82	1	12.718	10.865	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	62	45	1	18.732	15.080	1
Urgencias	J069	Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada	144	112	1	12.731	10.497	1
	J459	Asma, no especificada	588	285	2	29.370	15.832	2
		Lumbago no especificado	352	255	1	13.341	10.089	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.978	1.280	2	23.569	17.032	1
		Total urgencias	8.023	4.897	2	340.736	214.726	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	227	200	1	4.142	3.519	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	384	319	1	2.565	2.158	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	291	247	1	4.664	3.779	1
	J189	Neumonía, no especificada	903	703	1	6.138	4.881	1
	J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada	1.067	846	1	3.211	2.453	1
Hospitalizaciones	J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	1.052	744	1	2.906	2.164	1
,	K359	Apendicitis aguda, no especificada	61	54	1	5.453	4.761	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	2.215	1.593	1	12.069	9.254	1
	N939	Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada	28	26	1	2.635	2.221	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	299	260	1	4.872	4.160	1
		Total hospitalizaciones	6.722	4.628	1	80.188	62.796	1





### Región Bogotá-Cundinamarca

Tabla 11. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Bogotá-Cundinamarca, Colombia, 2011

Tipo de atención	Código	Diagnóstico	Total	Total	Concentración
Tipo do dionoion	CIE10	<u> </u>	atenciones	personas	Concontidation
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	317.223	218.888	1
	l10x	Hipertensión esencial (primaria)	1.136.467	385.019	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	445.698	313.465	1
	K021	Caries de la dentina	1.063.122	478.056	2
	K050	Gingivitis aguda	206.963	139.845	1
Consultas	M545	Lumbago no especificado	336.121	176.325	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	256.324	160.074	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	247.549	169.035	1
	R51x	Cefalea	260.640	173.997	1
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	355.016	173.883	2
		Total consultas	6.634.712	2.448.184	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	44.095	37.417	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	30.624	26.738	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	10.474	9.579	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	19.257	16.537	1
	J209	Bronquitis aguda, no especificada	10.167	8.604	1
Urgencias	J219	Bronquiolitis aguda, no especificada	10.771	8.981	1
•	M545	Lumbago no especificado	12.876	10.309	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	21.850	17.625	1
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	8.611	6.839	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	10.944	8.890	1
		Total urgencias	285.741	207.132	1
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	21.031	19.082	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	15.062	13.713	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	6.877	6.598	1
	J030	Amigdalitis estreptocócica	4.636	4.395	1
Hospitalizaciones	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	7.930	7.400	1
	J209	Bronquitis aguda, no especificada	5.367	4.964	1
	J219	Bronquiolitis aguda, no especificada	6.980	5.778	1
	M545	Lumbago no especificado	5.001	4.487	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	11.719	9.822	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	4443	3847	1
		Total hospitalizaciones	124697	96986	1



Tabla 12. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Bogotá-Cundinamarca, Colombia, 2011

	Código			De 0 a 4 año	S	]	De 05 a 09 añ	ňos	]	De 10 a 14 ai	ños	[	De 15 a 19 añ	os
Tipo de atención	CIE10		Atenciones	Personas C	oncentració	on Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas 0	Concentración	n Atenciones	Personas C	oncentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	66.894	43.773	2	26.273	18.846	1	15.132	11.018	1	12.588	9.422	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	400	305	1	1.001	650	2	727	429	2	1.415	794	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	148.534	91.801	2	73.383	51.534	1	26.431	20.122	1	17.821	13.993	1
	K021	Caries de la dentina	34.422	15.311	2	146.536	64.179	2	82.544	41.014	2	85.212	41.708	2
	K050	Gingivitis aguda	7.126	5.243	1	20.098	13.831	1	20.754	14.157	1	22.764	15.653	1
	M545	Lumbago no especificado	484	417	1	598	469	1	2.470	1.679	1	8.945	5.567	2
Consultas	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	18.714	9.984	2	16.984	9.904	2	8.278	5.401	2	10.335	7.384	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9.637	7.446	1	18.416	13.274	1	19.620	13.664	1	19.479	13.627	1
	R51x	Cefalea	1.523	1.178	1	9.231	6.469	1	19.097	13.258	1	24.253	17.099	1
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	34.253	16.240	2	30.322	15.364	2	20.438	10.862	2	18.977	10.492	2
		Total consultas	780.148	265.533	3	570.718	224.001	3	317.420	148.541	2	329.503	154.194	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	12.218	10.109	1	4.520	3.901	1	2.297	2.067	1	1.807	1.565	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	13.728	11.505	1	4.928	4.356	1	1.445	1.330	1	763	692	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	2.701	2.446	1	2.050	1.891	1	799	750	1	466	423	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	4.270	3.658	1	4.651	3.974	1	1.782	1.596	1	1.122	960	1
	J209		2.118	1.780	1	1.347	1.171	1	489	431	1	242	222	1
Urgencias		Bronquiolitis aguda, no especificada	9.976	8.256	1	379	340	1	40	38	1	44	42	1
Orgonolao	M545	Lumbago no especificado	22	15	1	25	22	1	90	81	1	284	224	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	2.536	2.064	1	1.491	1.226	1	607	528	1	1.055	922	1
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	12	11	1	57	48	1	160	123	1	306	243	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	288	259	1	570	475	1	715	611	1	863	717	1
		Total urgencias	64.243	43.217	1	30.188	22.722	1	15.088	12.042	1	14.011	10.911	1
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6.244	5.440	1	2.424	2.231	1	1.206	1.151	1	849	797	1
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	6.291	5.387	1	2.610	2.416	1	844	805	1	415	402	1
			1.766	1.652	1	1.373	1.309	1	520	506	1	288	283	1
			1.212	1.126	1	1.449	1.348	1	494	473	1	261	249	1
			1.823	1.668	1	2.081	1.915	1	751	720	1	473	448	1
Hospitalizaciones		1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.209	1.091	1	715	687	1	247	232	1	146	144	1
p		Bronquiolitis aguda, no especificada	6.638	5.470	1	207	180	1	21	19	1	11	11	1
	M545	Lumbago no especificado	11	11	1	16	14	1	56	52	1	107	102	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	2.008	1.653	1	1.089	920	1	363	316	1	435	385	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	175	142	1	264	238	1	297	267	1	286	251	1
		Total hospitalizaciones	31.644	21.634	1	15.018	11.607	1	6.740	5.711	1	6.149	5.349	1



	Código	1	[	De 20 a 24 añ	ios	[	De 25 a 29 añ	íos		De 30 a 34 ai	ĩos	[	De 35 a 39 añ	os
Tipo de atención	CIE10		Atenciones	Personas C	oncentració	n Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas C	oncentraciór
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	32.514	22.117	1	42.892	28.869	1	35.250	24.222	1	21.791	15.225	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	2.686	1.663	2	4.683	2.636	2	9.141	4.541	2	15.274	7.006	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	25.365	19.139	1	30.407	22.839	1	27.062	20.475	1	19.593	14.919	1
	K021	Caries de la dentina	84.099	42.072	2	106.580	49.851	2	108.595	49.300	2	90.648	39.619	2
		Gingivitis aguda	19.092	13.263	1	22.480	15.475	1	22.318	15.183	1	17.088	11.602	1
	M545	Lumbago no especificado	18.639	11.546	2	29.177	16.860	2	34.464	19.418	2	33.774	18.287	2
Consultas	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	21.851	14.973	1	23.669	15.766	1	22.903	15.107	2	18.203	12.017	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	23.559	16.555	1	25.886	17.415	1	23.739	15.952	1	17.692	12.104	1
	R51x	Cefalea	28.189	18.914	1	32.703	21.084	2	29.233	19.173	2	22.333	14.866	1
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	28.152	14.160	2	35.875	17.050	2	32.540	16.012	2	25.929	12.900	2
		Total consultas	444.149	184.279	2	522.372	205.107	3	497.876	195.141	3	398.062	154.910	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4.091	3.560	1	5.058	4.362	1	3.849	3.250	1	2.372	2.017	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	1.643	1.542	1	2.154	1.963	1	1.666	1.511	1	1.065	964	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	757	705	1	998	918	1	800	716	1	498	447	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	1.481	1.337	1	1.771	1.524	1	1.382	1.159	1	840	718	1
		Bronquitis aguda, no especificada	411	385	1	605	529	1	665	532	1	532	441	1
Urgencias		Bronquiolitis aguda, no especificada	42	40	1	28	28	1	29	26	1	26	24	1
O. goriolao	M545	Lumbago no especificado	969	833	1	1.729	1.395	1	1.711	1.381	1	1.610	1.252	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	2.298	2.020	1	2.270	1.895	1	1.918	1.551	1	1.313	1.056	1
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	410	351	1	501	397	1	596	469	1	617	479	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	1.120	945	1	1.245	1.001	1	1.071	835	1	776	626	1
		Total urgencias	23.092	17.583	1	27.445	19.989	1	23.217	16.643	1	16.238	11.753	1
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.741	1.585	1	2.240	2.053	1	1.931	1.761	1	1.131	1.057	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	681	657	1	933	895	1	904	864	1	616	588	1
		Faringitis aguda, no especificada	418	405	1	600	583	1	475	466	1	353	345	1
	J030	Amigdalitis estreptocócica	263	262	1	288	285	1	248	241	1	148	142	1
		Amigdalitis aguda, no especificada	527	492	1	607	580	1	562	524	1	354	339	1
Hospitalizaciones	J209		204	196	1	315	294	1	343	307	1	318	294	1
		Bronquiolitis aguda, no especificada	18	16	1	5	5	1	12	12	1	8	8	1
	M545	Lumbago no especificado	356	329	1	603	550	1	686	607	1	655	571	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	885	796	1	1.045	903	1	970	821	1	637	544	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	305	273	1	387	335	1	446	388	1	329	287	1
		Total hospitalizaciones	9.456	7.904	1	11.252	9.126	1	10.236	8.202	1	7.084	5.790	1



	Código	)		De 40 a 44 añ	os		De 45 a 49 añ	íos		De 50 a 54 ar	ios		De 55 a 59 añ	os
Tipo de atención	CIE10		Atenciones	Personas C	oncentracio	ón Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas C	oncentració	n Atenciones	Personas C	oncentració
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	16.433	11.575	1	12.872	9.179	1	10.023	7.269	1	7.003	5.097	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	30.618	12.825	2	57.472	22.784	2	98.742	36.746	3	131.932	46.921	3
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	16.133	12.328	1	14.380	10.947	1	12.691	9.642	1	10.208	7.741	1
	K021	Caries de la dentina	84.184	35.636	2	77.212	32.047	2	58.527	24.357	2	39.149	16.289	2
	K050	Gingivitis aguda	14.760	9.808	2	12.671	8.295	2	9.767	6.182	2	6.632	4.174	2
	M545	Lumbago no especificado	36.389	18.875	2	38.550	19.636	2	36.540	17.855	2	28.181	13.957	2
Consultas	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	17.174	11.323	2	16.916	11.020	2	15.775	10.081	2	14.013	8.737	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16.558	11.224	1	15.518	10.634	1	13.540	9.257	1	10.981	7.310	1
	R51x	Cefalea	20.447	13.839	1	19.430	13.123	1	16.304	10.941	1	11.585	7.623	2
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	23.852	11.940	2	22.582	11.255	2	20.452	9.918	2	15.925	7.683	2
		Total consultas	377.513	144.569	3	387.968	144.298	3	383.808	135.413	3	347.861	116.548	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.753	1.469	1	1.413	1.213	1	1.192	964	1	899	761	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	831	724	1	660	583	1	500	460	1	440	398	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	351	331	1	309	274	1	249	222	1	186	174	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	604	503	1	499	390	1	291	242	1	255	216	1
			498	414	1	468	409	1	501	431	1	521	438	1
Urgencias		Bronquiolitis aguda, no especificada	32	25	1	27	22	1	23	22	1	24	24	1
Orgonolad	M545	Lumbago no especificado	1.487	1.138	1	1.410	1.109	1	1.121	865	1	819	677	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.101	902	1	1.051	847	1	924	738	1	944	751	1
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	675	530	1	821	664	1	887	689	1	833	674	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	724	597	1	750	599	1	636	502	1	538	410	1
		Total urgencias	13.579	9.815	1	12.292	8.987	1	10.696	7.791	1	8.991	6.610	1
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	836	772	1	600	557	1	501	460	1	365	338	1
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	482	464	1	350	333	1	300	289	1	231	221	1
			303	294	1	232	222	1	186	181	1	112	108	1
			86	85	1	72	72	1	43	42	1	33	32	1
			273	261	1	181	168	1	101	96	1	78	75	1
Hospitalizaciones		Bronquitis aguda, no especificada	274	253	1	275	255	1	270	258	1	235	219	1
•		Bronquiolitis aguda, no especificada	6	6	1	7	6	1	3	2	2	10	10	1
	IVI545	Lumbago no especificado	587	519	1	559	486	1	461	414	1	336	312	7
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	507	448	1	473	390	1	492	405	1	460	378	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	359	300	1	276	239	1	251	210	1	241	203	1
		Total hospitalizaciones	5.442	4.463	1	4.421	3.601	1	3.913	3.152	1	3.190	2.568	1



	Código			De 60 a 64 añ	ios		e 65 a 69 ai	ños		De 70 a 74 a	ños		De 75 a 79 añ	os
Tipo de atención	CIE10		Atenciones	Personas C	oncentració	ón Atenciones	Personas (	Concentración	Atenciones	Personas (	Concentraciór	Atenciones	Personas C	oncentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5.065	3.635	1	3.625	2.570	1	2.867	2.000	1	2.262	1.552	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	157.982	52.487	3	160.845	51.438	3	159.546	49.509	3	134.253	41.152	3
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	7.615	5.814	1	5.570	4.257	1	4.170	3.150	1	2.794	2.152	1
		Caries de la dentina	26.133	10.677	2	16.607	6.623	3	10.755	4.274	3	5.520	2.296	2
		Gingivitis aguda	4.774	2.905	2	2.813	1.737	2	1.652	1.003	2	870	535	2
	M545	Lumbago no especificado	21.777	10.496	2	16.316	7.498	2	12.446	5.687	2	8.357	3.840	2
Consultas	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	12.135	7.237	2	9.776	5.726	2	9.156	5.129	2	8.018	4.186	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8.739	5.705	2	6.502	4.204	2	5.782	3.654	2	4.824	2.897	2
	R51x	Cefalea	8.036	5.258	2	5.818	3.750	2	4.728	2.889	2	3.514	2.031	2
	R688	Otros síntomas y signos generales especificados	12.210	5.752	2	9.175	4.185	2	7.930	3.464	2	6.735	2.748	2
		Total consultas	318.176	99.602	3	272.688	81.190	3	242.203	69.414	3	193.493	54.025	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	647	554	1	498	417	1	465	366	1	393	322	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	240	223	1	163	139	1	137	119	1	88	82	1
	J029	Faringitis aguda, no especificada	118	104	1	80	72	1	49	46	1	29	28	1
		Amigdalitis aguda, no especificada	130	104	1	71	64	1	28	25	1	29	26	1
		Bronquitis aguda, no especificada	409	340	1	349	274	1	301	253	1	286	231	1
Urgencias		Bronquiolitis aguda, no especificada	21	20	1	21	19	1	20	18	1	12	11	1
0.90	M545	Lumbago no especificado	500	410	1	360	291	1	250	201	1	205	177	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	769	588	1	722	547	1	736	544	1	668	479	1
	R074	Dolor en el pecho, no especificado	697	544	1	517	413	1	485	406	1	389	312	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	429	340	1	331	262	1	258	209	1	246	195	1
		Total urgencias	6.589	4.840	1	5.092	3.710	1	4.448	3.208	1	3.827	2.704	1
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	265	247	1	210	190	1	152	141	1	122	114	1
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	143	141	1	101	99	1	50	47	1	35	34	1
		Faringitis aguda, no especificada	101	98	1	68	65	1	36	36	1	19	18	1
		Amigdalitis estreptocócica	15	14	1	6	6	1	6	6	1	4	4	1
		Amigdalitis aguda, no especificada	53	52	1	24	22	1	13	13	1	6	6	1
Hospitalizaciones		Bronquitis aguda, no especificada	192	178	1	168	155	1	143	127	1	108	96	1
,		Bronquiolitis aguda, no especificada	6	6	1	7	7	1	8	7	1	6	6	1
	Wb45	Lumbago no especificado	182	168	1	115	103	1	84	77	1	69	65	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	416	353	1	361	283	1	338	266	1	375	304	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	212	181	1	178	156	1	118	108	1	131	109	1
		Total hospitalizaciones	2.461	1.988	1	1.920	1.507	1	1.526	1.219	1	1.413	1.088	1



Código		D.	e 80 años d	o más		Total	
CIE10		Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración
A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3.678	2.468	1	317.223	218.888	1
I10x	Hipertensión esencial (primaria)	169.605	53.074	3	1.136.467	385.019	3
J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	3.469	2.551	1	445.698	313.465	1
K021	Caries de la dentina	6.173	2.619	2	1.063.122	478.056	2
K050	Gingivitis aguda	1.187	716	2	206.963	139.845	1
M545	Lumbago no especificado	8.988	4.218	2	336.121	176.325	2
N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	12.373	6.067	2	256.324	160.074	2
R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	6.968	4.037	2	247.549	169.035	1
R51x	Cefalea	4.178	2.470	2	260.640	173.997	1
R688	Otros síntomas y signos generales especificados	9.639	3.840	3	355.016	173.883	2
	Total consultas	249.536	70.695	3	6.634.712	2.448.184	3
A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	615	514	1	44.095	37.417	1
J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	168	142	1	30.624	26.738	1
J029		34	32	1	10.474	9.579	1
	Amigdalitis aguda, no especificada	47	38	1	19.257	16.537	1
	Bronquitis aguda, no especificada	424	322	1	10.167	8.604	1
J219		26	25	1	10.771	8.981	1
M545	Lumbago no especificado	284	238	1	12.876	10.309	1
N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.441	962	1	21.850	17.625	1
R074	Dolor en el pecho, no especificado	647	485	1	8.611	6.839	1
R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	373	296	1	10.944	8.890	1
	Total urgencias	6.646	4.557	1	285.741	207.132	1
A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	213	187	1	21.031	19.082	1
J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	75	70	1	15.062	13.713	1
J029	Faringitis aguda, no especificada	26	26	1	6.877	6.598	1
	Amigdalitis estreptocócica	7	7	1	4.636	4.395	1
J039	Amigdalitis aguda, no especificada	22	20	1	7.930	7.400	1
J209		205	178	1	5.367	4.964	1
J219	Bronquiolitis aguda, no especificada	7	7	1	6.980	5.778	1
M545	Lumbago no especificado	116	105	1	5.001	4.487	1
N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	864	656	1	11.719	9.822	1
R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	188	160	1	4.443	3.847	1
	Total hospitalizaciones	2.821	2.067	1	124.697	96.986	1





### **Región Oriental**

Tabla 13. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Oriental, Colombia, 2011

Tipo de atención	Código	Diagnóstico	Total	Total	Concentració
ripo de aterición	CIE10	<u> </u>	atenciones	personas	Concentració
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	131.687	94.815	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	92.629	75.611	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	642.698	187.689	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	166.226	124.253	1
	K021	Caries de la dentina	535.936	250.445	2
Consultas	K050	Gingivitis aguda	87.173	58.186	1
	K051	Gingivitis crónica	132.830	73.959	2
	M545	Lumbago no especificado	129.116	81.793	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	139.184	89.815	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	120.500	80.561	1
		Total consultas	3.049.663	1.179.469	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	19.583	14.498	1
	B349	Infección viral, no especificada	3.975	3.261	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	6.170	3.639	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	7.097	6.016	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	6.193	5.091	1
Urgencias	J209	Bronquitis aguda, no especificada	4.246	3.258	1
· ·	M545		5.640	4.075	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	10.545	7.015	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	5.537	3.698	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	18.138	12.887	1
		Total urgencias	131.059	82.161	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.380	2.006	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	1.472	1.244	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	1.628	1.390	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	1.634	1.361	1
Hospitalizaciones	J189	Neumonía, no especificada	1.687	1.434	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	2.874	2.324	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	1.431	1.219	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	4.956	4.034	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1.915	1.718	1
		Fiebre, no especificada	1972	1714	1
		Total hospitalizaciones	35365	28920	1





Tabla 14. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Oriental, Colombia, 2011

Tipo do otono:fr	Código	Diagnóstico		De 0 a 4 año	os		De 05 a 09	años		e 10 a 14	años		De 15 a 19 a	nños
Tipo de atención	CIE10	Diagnostico	Atenciones	Personas C	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	36.172	23.315	2	13.882	10.431	1	7.048	5.572	1	5.869	4.650	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	11.154	8.968	1	24.489	19.705	1	16.812	13.684	1	8.917	7.337	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	500	408	1	365	293	1	374	199	2	659	364	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	56.109	36.986	2	28.182	21.361	1	11.291	9.217	1	7.660	6.389	1
	K021	Caries de la dentina	10.896	5.752	2	62.907	31.592	2	46.811	25.172	2	50.839	26.193	2
Consultas	K050	Gingivitis aguda	2.794	2.224	1	9.313	6.931	1	8.354	5.955	1	8.910	5.998	1
	K051	Gingivitis crónica	1.727	1.304	1	7.567	5.222	1	8.831	5.706	2	11.431	6.826	2
	M545	Lumbago no especificado	192	157	1	386	314	1	1.131	890	1	3.929	2.935	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	9.904	5.883	2	10.232	6.320	2	5.192	3.651	1	6.641	4.788	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3.976	3.033	1	8.820	6.384	1	9.652	6.777	1	10.107	7.048	1
		Total consultas	379.680	138.444	3	323.924	140.436	2	178.631	88.522	2	163.852	81.641	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4.941	3.696	1	1.871	1.498	1	874	709	1	794	614	1
	B349	Infección viral, no especificada	740	639	1	498	410	1	240	203	1	204	169	1
		Hipertensión esencial (primaria)				2	2	1	2	2	1	15	10	2
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	2.686	2.173	1	902	785	1	295	268	1	262	229	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	1.303	1.059	1	1.146	923	1	461	387	1	374	310	1
	J209	Bronquitis aguda, no especificada	1.097	865	1	512	413	1	130	108	1	108	94	1
Urgencias	M545		4	4	1	6	3	2	41	33	1	137	109	1
2 92 2 22	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	938	720	1	647	483	1	255	193	1	502	391	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	134	113	1	212	169	1	274	224	1	387	300	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	481	390	1	1.075	847	1	1.271	938	1	1.674	1.241	1
		Total urgencias	21.835	12.906	2	12.202	8.276	1	6.510	4.626	1	7.115	4.919	1
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	975	791	1	358	295	1	92	82	1	88	81	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	4	4	1	5	5	1	1	1	1	5	4	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	468	407	1	139	125	1	37	34	1	32	28	1
		Bronconeumonía, no especificada	767	620	1	249	197	1	56	44	1	35	33	1
		Neumonía, no especificada	507	431	1	167	140	1	37	32	1	22	19	1
Haanitalinaaia	K359	Apendicitis aguda, no especificada	29	27	1	125	109	1	350	276	1	444	354	1
Hospitalizaciones			92	83	1	65	61	1	47	43	1	74	64	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	750	609	1	378	316	1	141	110	1	208	188	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	52	47	1	123	114	1	150	130	1	169	152	1
	R509	Fiebre, no especificada	685	574	1	334	288	1	99	89	1	109	95	1
		Total hospitalizaciones	4.547	3.528	1	2.062	1.662	1	1.100	892	1	2.603	2.244	1





Tipo de atención	Código	Diagnóstico		De 20 a 24	años	[	De 25 a 29 a	años		De 30 a 34 a	años	[	De 35 a 39 ai	ños
ripo de aterición	CIE10	Diagnostico	Atenciones	Personas	Concentració	n Atenciones	Personas	Concentracio	ón Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas (	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8.431	6.638	1	11.395	8.430	1	10.767	7.864	1	7.405	5.501	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	4.072	3.554	1	4.121	3.491	1	4.223	3.485	1	3.446	2.868	1
		Hipertensión esencial (primaria)	994	568	2	2.044	1.014	2	4.568	1.966	2	8.203	3.276	2
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	7.036	5.876	1	8.371	6.746	1	8.294	6.544	1	6.494	5.191	1
		Caries de la dentina	41.628	21.569	2	52.795	25.039	2	57.947	25.782	2	47.611	20.916	2
Consultas		Gingivitis aguda	8.090	5.646	1	9.010	6.151	1	8.885	5.851	2	6.608	4.444	1
		Gingivitis crónica	10.773	7.350	1	15.176	8.928	2	17.667	9.243	2	14.086	7.155	2
	M545	Lumbago no especificado	6.608	4.627	1	10.153	6.746	2	13.341	8.583	2	13.480	8.591	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	9.745	7.045	1	11.277	7.830	1	12.102	8.086	1	10.126	6.750	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	10.554	7.231	1	12.027	8.209	1	11.807	7.802	2	9.747	6.426	2
		Total consultas	152.170	72.208	2	181.585	81.220	2	190.985	80.956	2	158.774	66.897	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.682	1.316	1	1.813	1.418	1	1.405	1.055	1	959	723	1
	B349	Infección viral, no especificada	381	341	1	405	345	1	406	314	1	221	171	1
		Hipertensión esencial (primaria)	27	20	1	51	38	1	81	57	1	141	88	2
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	540	472	1	578	525	1	464	396	1	269	242	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	627	558	1	640	535	1	510	393	1	276	230	1
	J209	Bronquitis aguda, no especificada	129	116	1	244	194	1	245	188	1	185	155	1
Urgencias	M545	Lumbago no especificado	441	352	1	623	472	1	720	514	1	562	419	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	993	724	1	883	691	1	807	588	1	552	394	1
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	506	388	1	520	398	1	444	319	1	351	232	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2.016	1.498	1	2.077	1.510	1	1.741	1.228	1	1.269	931	1
		Total urgencias	10.456	7.075	1	11.248	7.441	2	9.980	6.241	2	7.018	4.563	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	72	68	1	81	72	1	90	78	1	60	49	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	11	11	1	12	12	1	23	16	1	30	26	1
		Neumonía bacteriana, no especificada	25	25	1	43	40	1	35	30	1	38	29	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	26	26	1	27	23	1	23	21	1	15	14	1
		Neumonía, no especificada	44	41	1	39	31	1	40	33	1	32	27	1
Hoopitolizaciones		Apendicitis aguda, no especificada	335	309	1	349	283	1	353	261	1	229	174	1
Hospitalizaciones	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	53	52	1	68	61	1	67	61	1	72	60	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	320	290	1	295	256	1	280	230	1	217	185	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	162	152	1	178	160	1	167	145	1	133	112	1
	R509	Fiebre, no especificada	119	112	1	95	86	1	84	74	1	62	51	1
		Total hospitalizaciones	4.467	4.075	1	4.308	3.624	1	3.828	3.018	1	2.254	1.788	1

Continuación. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Oriental, Colombia, 2011





Tipo de atención	Código	Diagnóstico		De 40 a 44	años	[	De 45 a 49 a	años		De 50 a 54 a	años		De 55 a 59 a	ños
ripo de aterición	CIE10	Diagnostico	Atenciones	Personas	Concentración	n Atenciones	Personas	Concentraci	ón Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas (	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	6.132	4.511	1	5.343	3.959	1	4.356	3.210	1	3.556	2.637	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	3.287	2.665	1	3.004	2.454	1	2.313	1.855	1	1.914	1.540	1
		Hipertensión esencial (primaria)	17.912	6.441	3	33.425	11.476	3	55.849	17.745	3	73.675	22.165	3
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	5.776	4.645	1	5.398	4.309	1	4.866	3.860	1	4.017	3.187	1
		Caries de la dentina	44.493	18.712	2	38.336	16.019	2	29.145	11.877	2	19.343	7.970	2
Consultas		Gingivitis aguda	6.226	3.924	2	5.363	3.327	2	4.465	2.561	2	3.186	1.825	2
		Gingivitis crónica	12.298	6.059	2	10.506	5.077	2	8.063	3.799	2	5.477	2.707	2
	M545	Lumbago no especificado	14.392	9.099	2	14.332	8.867	2	13.279	8.146	2	10.459	6.418	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	9.634	6.489	1	9.492	6.347	1	8.226	5.381	2	7.328	4.674	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	8.570	5.700	1	7.752	5.118	2	6.438	4.248	2	5.088	3.183	2
		Total consultas	158.749	64.181	2	166.601	64.889	3	167.946	60.179	3	158.447	52.364	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	791	613	1	721	498	1	685	468	1	595	377	2
	B349	Infección viral, no especificada	213	157	1	168	132	1	127	98	1	112	89	1
		Hipertensión esencial (primaria)	228	159	1	388	264	1	642	358	2	638	377	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	237	195	1	161	142	1	179	149	1	145	128	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	271	211	1	189	153	1	125	108	1	113	88	1
	J209	Bronquitis aguda, no especificada	192	140	1	186	143	1	191	145	1	210	169	1
Urgencias	M545	Lumbago no especificado	594	440	1	623	465	1	501	366	1	378	240	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	477	339	1	503	323	2	502	303	2	437	260	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	329	224	1	348	239	1	401	238	2	302	195	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1.092	754	1	996	687	1	870	593	1	772	479	2
		Total urgencias	6.351	4.068	2	6.093	3.852	2	6.091	3.595	2	4.997	3.012	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	66	57	1	63	49	1	61	57	1	59	53	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	42	33	1	68	58	1	113	92	1	131	114	1
		Neumonía bacteriana, no especificada	37	30	1	37	31	1	44	35	1	55	46	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	21	19	1	27	22	1	30	26	1	34	30	1
		Neumonía, no especificada	32	25	1	30	25	1	55	43	1	48	41	1
Haanitalinaaia		Apendicitis aguda, no especificada	178	134	1	130	107	1	104	90	1	87	70	1
Hospitalizaciones		Celulitis de otras partes de los miembros	84	69	1	98	74	1	94	75	1	92	78	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	177	140	1	194	143	1	221	165	1	192	156	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	126	108	1	99	91	1	106	98	1	113	98	1
	R509	Fiebre, no especificada	48	45	1	48	41	1	43	36	1	35	32	1
		Total hospitalizaciones	1.346	1.061	1	925	726		972				742	

Continuación. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Oriental, Colombia, 2011





Tipo de atención	Código	Diagnóstico		De 60 a 64	años		De 65 a 69 a	años	[	De 70 a 74	años	I	De 75 a 79 a	ños
ripo de aterición	CIE10	Diagnostico	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentrac	ción Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.872	2.075	1	2.324	1.649	1	2.011	1.457	1	1.605	1.147	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	1.581	1.306	1	1.090	896	1	932	733	1	562	466	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	84.498	24.647	3	86.345	24.685	3	88.219	24.505	4	76.629	20.614	4
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	3.428	2.720	1	3.009	2.318	1	2.389	1.899	1	1.726	1.354	1
		Caries de la dentina	12.957	5.231	2	8.185	3.427	2	5.332	2.225	2	3.002	1.294	2
Consultas		Gingivitis aguda	2.221	1.261	2	1.532	822	2	949	532	2	577	329	2
		Gingivitis crónica	3.878	1.824	2	2.189	1.119	2	1.330	709	2	761	388	2
	M545	Lumbago no especificado	8.268	4.920	2	6.253	3.806	2	4.842	3.098	2	3.310	2.016	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	6.177	3.833	2	5.508	3.249	2	5.188	3.016	2	4.571	2.522	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4.133	2.615	2	3.184	1.912	2	2.868	1.646	2	2.408	1.302	2
		Total consultas	149.910	46.209	3	135.526	39.562	3	127.590	35.529	4	105.484	27.994	4
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	567	345	2	423	291	1	422	256	2	335	224	1
	B349	Infección viral, no especificada	65	49	1	56	43	1	45	34	1	39	25	2
		Hipertensión esencial (primaria)	601	364	2	690	407	2	714	423	2	739	406	2
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	120	94	1	96	78	1	65	58	1	39	33	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	58	50	1	29	27	1	16	15	1	29	23	1
	J209	Bronquitis aguda, no especificada	164	117	1	118	94	1	158	92	2	146	90	2
Urgencias	M545	Lumbago no especificado	262	183	1	228	127	2	178	122	1	132	92	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	445	273	2	412	268	2	562	282	2	597	258	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	210	143	1	230	144	2	212	116	2	360	94	4
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	638	422	1	550	306	2	484	309	2	457	297	2
		Total urgencias	4.220	2.501	2	3.633	2.133	2	3.732	2.014	2	3.591	1.817	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	65	59	1	60	51	1	62	56	1	47	36	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	137	118	1	149	134	1	178	144	1	192	165	1
		Neumonía bacteriana, no especificada	54	48	1	64	53	1	110	90	1	119	103	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	27	25	1	39	35	1	48	36	1	63	58	1
		Neumonía, no especificada	70	59	1	79	66	1	78	73	1	124	104	1
Harris Baller and a second		Apendicitis aguda, no especificada	48	34	1	34	29	1	37	30	1	21	17	1
Hospitalizaciones		Celulitis de otras partes de los miembros	109	89	1	81	64	1	92	77	1	94	77	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	218	167	1	213	168	1	270	206	1	260	215	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	62	57	1	61	56	1	71	64	1	57	54	1
	R509	Fiebre, no especificada	41	39	1	28	24	1	37	33	1	47	42	1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO, Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud- RIPS, 2011 Continuación. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Oriental, Colombia, 2011





Tine de etens!	Código	Diagnéstica	D	e 80 años o	o más		Total	
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	2.481	1.735	1	131.687	94.815	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	690	583	1	92.629	75.611	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	108.332	27.296	4	642.698	187.689	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	2.151	1.627	1	166.226	124.253	1
	K021	Caries de la dentina	3.588	1.610	2	535.936	250.445	2
Consultas	K050	Gingivitis aguda	668	387	2	87.173	58.186	1
	K051	Gingivitis crónica	1.060	536	2	132.830	73.959	2
	M545	Lumbago no especificado	4.747	2.568	2	129.116	81.793	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	7.817	3.930	2	139.184	89.815	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3.311	1.891	2	120.500	80.561	1
		Total consultas	149.136	37.898	4	3.049.663	1.179.469	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	703	395	2	19.583	14.498	1
	B349	Infección viral, no especificada	54	41	1	3.975	3.261	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	1.211	664	2	6.170	3.639	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	57	47	1	7.097	6.016	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	26	21	1	6.193	5.091	1
	J209	Bronquitis aguda, no especificada	230	134	2	4.246	3.258	1
Urgencias	M545	Lumbago no especificado	210	134	2	5.640	4.075	1
-	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.033	525	2	10.545	7.015	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	317	162	2	5.537	3.698	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	671	453	1	18.138	12.887	1
		Total urgencias	5.961	3.104	2	131.059	82.161	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	81	72	1	2.380	2.006	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	371	307	1	1.472	1.244	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	291	236	1	1.628	1.390	1
	J180		147	132	1	1.634	1.361	1
	J189	Neumonía, no especificada	281	242	1	1.687	1.434	1
Hoonitalizacioses	K359	Apendicitis aguda, no especificada	21	20	1	2.874	2.324	1
Hospitalizaciones	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	149	131	1	1.431	1.219	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	621	489	1	4.956	4.034	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	85	79	1	1.915	1.718	1
	R509	Fiebre, no especificada	58	53	1	1.972	1.714	1
		Total hospitalizaciones	2.196	1.736	1	35.365	28.920	1





# Región Pacífica

Tabla 15. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Pacífica, Colombia, 2011

Tipo de atención	Código CIE10	Diagnóstico	Total	Total	Concentración
		Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	atenciones 168.984	personas 111.445	2
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	152.228	107.529	1
	110x	Hipertensión esencial (primaria)	1.066.979	286.420	4
	_	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	218.860	147.354	1
	K021	Caries de la dentina	416.523	206.588	2
Consultas	K051	Gingivitis crónica	145.746	86.060	2
00.104.144	M545	Lumbago no especificado	159.815	94.587	2
		· ·	201.982	117.463	2
		•	136.718	85.913	2
	_	Cefalea	113.720	74.922	2
		Total consultas	4.138.993	1.500.927	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	32.550	19.689	2
	B349	Infección viral, no especificada	6.834	4.599	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	7.673	4.597	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	15.863	9.604	2
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	10.093	6.182	2
Urgencias	J189	Neumonía, no especificada	6.892	4.214	2
_	J459	Asma, no especificada	6.281	3.685	2
	M545	Lumbago no especificado	6.402	3.775	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	16.332	9.704	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	6.129	3.768	2
		Total urgencias	195.359	97.391	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3.516	2.986	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	1.916	1.527	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	2.826	2.154	1
	J189	Neumonía, no especificada	3.868	3.055	1
Hospitalizaciones	K359	Apendicitis aguda, no especificada	3.725	3.005	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	2.167	1.689	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	7.757	5.781	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2.585	2.183	1
	R509	Fiebre, no especificada	2.034	1.716	1
	T818	Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte	1885	1669	1
		Total hospitalizaciones	52987	40719	1



Tabla 16. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Pacífica, Colombia, 2011

	Código			De 0 a 4 años	3	[	De 05 a 09 añ	ios	[	De 10 a 14 añ	ňos	ı	De 15 a 19 añ	ios
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas Co	oncentració	n Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas C	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	46.992	27.082	2	20.573	13.849	1	10.151	7.139	1	8.131	5.760	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	18.675	12.669	1	42.552	29.385	1	28.708	20.457	1	14.803	10.662	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	273	137	2	248	145	2	383	175	2	984	503	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	70.736	41.390	2	38.424	25.643	1	15.478	11.197	1	10.868	8.008	1
	K021	Caries de la dentina	9.455	5.677	2	47.326	27.262	2	38.490	22.590	2	42.632	23.027	2
Consultas	K051	Gingivitis crónica	3.034	2.093	1	12.328	8.419	1	13.314	8.832	2	13.042	8.325	2
	M545	Lumbago no especificado	241	177	1	427	314	1	1.229	852	1	4.366	2.893	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	11.693	5.776	2	11.908	6.759	2	6.998	4.349	2	10.945	6.831	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4.422	3.061	1	9.267	6.109	2	10.036	6.366	2	11.532	7.358	2
	R51x	Cefalea	852	634	1	4.684	3.138	1	8.449	5.658	1	10.722	7.320	1
		Total consultas	498.378	162.769	3	400.403	172.561	2	246.383	118.169	2	273.431	122.991	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	10.186	5.780	2	4.069	2.596	2	1.889	1.198	2	1.406	884	2
	B349	Infección viral, no especificada	2.219	1.463	2	1.115	794	1	407	312	1	332	225	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	8	4	2	4	3	1	3	3	1	25	19	1
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	6.200	3.652	2	2.528	1.584	2	834	538	2	604	374	2
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	1.599	957	2	2.210	1.351	2	1.117	684	2	770	475	2
Urgonoico	J189	Neumonía, no especificada	3.941	2.320	2	1.162	774	2	176	116	2	121	78	2
Urgencias	J459	Asma, no especificada	1.773	1.016	2	1.540	963	2	665	407	2	285	174	2
	M545	Lumbago no especificado	32	8	4	18	8	2	70	34	2	210	123	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.453	859	2	1.250	803	2	644	409	2	1.101	683	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	135	97	1	311	209	1	362	237	2	582	327	2
		Total urgencias	41.414	18.325	2	24.276	12.604	2	11.690	6.417	2	11.250	5.935	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.315	1.089	1	544	461	1	176	155	1	117	101	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	729	586	1	223	179	1	46	41	1	35	26	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	1.723	1.297	1	520	391	1	84	63	1	45	35	1
	J189	Neumonía, no especificada	1.861	1.530	1	522	411	1	123	90	1	74	60	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	29	27	1	184	149	1	441	368	1	649	521	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	104	82	1	112	92	1	108	80	1	99	81	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.108	843	1	514	366	1	161	133	1	345	275	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	67	59	1	182	163	1	191	169	1	276	236	1
	R509	Fiebre, no especificada	858	704	1	362	305	1	108	96	1	84	70	1
	T818	Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte	42	40	1	30	26	1	19	17	1	74	69	1
		Total hospitalizaciones	7.884	5.897	1	3.228	2.454		1.510	1.222		4.637	3.776	



### Continuación. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Pacífica, Colombia, 2011

	Código			De 20 a 24 añ	os		De 25 a 29 añ	ios		De 30 a 34 añ	ios		De 35 a 39 añ	os
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas C	oncentració	n Atenciones	Personas C	oncentració	n Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas C	oncentració
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	9.767	6.951	1	11.691	8.042	1	11.120	7.692	1	8.249	5.785	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	7.323	5.249	1	6.366	4.690	1	6.239	4.463	1	5.062	3.627	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	1.600	836	2	3.390	1.375	2	7.650	2.717	3	14.174	4.494	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	9.858	7.303	1	10.041	7.356	1	9.654	7.070	1	7.842	5.710	1
		Caries de la dentina	31.662	17.347	2	32.782	17.211	2	35.485	17.532	2	31.166	14.744	2
Consultas		Gingivitis crónica	11.231	7.165	2	13.390	8.173	2	15.608	9.091	2	13.206	7.403	2
	M545	Lumbago no especificado	6.466	4.271	2	9.449	5.775	2	12.731	7.708	2	13.906	8.200	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	15.580	9.721	2	16.143	10.003	2	16.943	10.257	2	14.688	8.863	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	12.131	7.759	2	13.024	8.063	2	12.817	7.908	2	10.157	6.340	2
	R51x	Cefalea	10.235	6.932	1	10.749	7.060	2	10.967	7.049	2	8.947	5.797	2
		Total consultas	239.186	102.575	2	223.869	95.256	2	204.544	87.657	2	165.347	71.395	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.612	1.049	2	2.219	1.359	2	2.061	1.285	2	1.464	891	2
	B349	Infección viral, no especificada	323	231	1	472	324	1	362	254	1	264	189	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	34	21	2	62	41	2	156	95	2	190	108	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	747	468	2	942	578	2	865	508	2	672	392	2
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	754	464	2	808	543	1	809	497	2	559	323	2
Urgonoico	J189	Neumonía, no especificada	64	42	2	105	67	2	95	63	2	64	46	1
Urgencias	J459	Asma, no especificada	239	119	2	213	130	2	220	120	2	143	87	2
	M545	Lumbago no especificado	273	189	1	603	344	2	656	401	2	608	338	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.370	869	2	1.476	873	2	1.370	806	2	1.045	626	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	509	314	2	518	323	2	523	330	2	422	252	2
		Total urgencias	11.495	6.048	2	13.268	6.819	2	12.688	6.466	2	9.708	4.927	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	110	100	1	146	127	1	144	126	1	74	65	1
		Neumonía bacteriana, no especificada	32	26	1	48	43	1	44	36	1	36	25	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	38	31	1	27	25	1	31	28	1	25	19	1
	J189	Neumonía, no especificada	43	35	1	65	46	1	68	48	1	66	49	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	493	405	1	419	337	1	437	328	1	277	222	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	86	76	1	120	96	1	138	106	1	105	81	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	485	395	1	461	367	1	451	337	1	296	223	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	168	149	1	196	160	1	246	192	1	157	129	1
	R509	Fiebre, no especificada	57	51	1	70	62	1	66	56	1	37	36	1
	T818	Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte	205	192	1	301	279	1	227	206	1	130	117	1
		Total hospitalizaciones	7.526	6.057	1	6.985	5.430	1	5.772	4.276	1	3.167	2.426	1



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO, Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud- RIPS, 2011 Continuación. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Pacífica, Colombia, 2011

	Código			De 40 a 44 añ	os		De 45 a 49 a	ños		De 50 a 54 añ	ños	[	De 55 a 59 añ	IOS
Tipo de atención	CIE10		Atenciones	Personas C	oncentracio	ón Atenciones	Personas (	Concentració	n Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas C	oncentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	7.467	5.176	1	6.549	4.565	1	5.766	4.008	1	5.133	3.512	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	4.688	3.342	1	4.128	2.991	1	3.334	2.451	1	2.695	1.958	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	29.776	8.868	3	59.076	16.832	3	98.148	26.662	4	125.568	33.281	4
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	7.307	5.350	1	6.831	5.068	1	6.426	4.726	1	5.856	4.230	1
	K021	Caries de la dentina	31.490	13.963	2	30.641	13.025	2	26.163	10.754	2	19.577	7.832	2
Consultas	K051	Gingivitis crónica	12.311	6.786	2	10.495	5.683	2	8.919	4.608	2	6.287	3.222	2
	M545	Lumbago no especificado	16.774	9.515	2	17.574	10.168	2	17.181	9.883	2	15.188	8.593	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	13.945	8.319	2	13.281	8.014	2	12.038	7.145	2	10.365	6.215	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	9.937	6.099	2	8.960	5.590	2	7.541	4.706	2	6.088	3.868	2
	R51x	Cefalea	9.109	5.860	2	9.008	5.806	2	7.939	5.137	2	5.761	3.793	2
		Total consultas	175.727	70.686	2	207.895	76.290	3	229.248	74.758	3	231.971	69.303	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.203	737	2	1.182	684	2	961	609	2	852	548	2
	B349	Infección viral, no especificada	241	163	1	191	134	1	171	112	2	156	97	2
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	307	191	2	480	308	2	791	453	2	826	492	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	498	301	2	400	256	2	369	226	2	306	176	2
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	372	234	2	369	209	2	231	152	2	174	90	2
Urgonoice	J189	Neumonía, no especificada	86	57	2	106	72	1	106	68	2	103	62	2
Urgencias	J459	Asma, no especificada	173	95	2	154	85	2	167	95	2	145	87	2
	M545	Lumbago no especificado	721	408	2	701	389	2	632	405	2	453	287	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	855	503	2	748	430	2	769	466	2	575	341	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	389	252	2	334	213	2	343	215	2	378	219	2
		Total urgencias	8.867	4.521	2	8.206	4.157	2	7.444	3.925	2	6.523	3.332	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	81	72	1	104	96	1	81	73	1	99	85	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	39	30	1	42	33	1	49	30	2	49	39	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	28	24	1	20	15	1	23	19	1	29	23	1
	J189	Neumonía, no especificada	62	43	1	79	58	1	69	54	1	68	53	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	233	183	1	170	135	1	118	103	1	89	70	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	120	96	1	113	95	1	144	111	1	171	132	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	303	232	1	274	191	1	313	228	1	281	217	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	159	139	1	175	146	1	133	116	1	99	85	1
	R509	Fiebre, no especificada	47	37	1	45	44	1	47	40	1	30	27	1
	T818	Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte	89	80	1	80	69	1	84	72	1	70	60	1
		Total hospitalizaciones	1.873	1.442	1	1.197	931	1	1.078	845	1	995	778	1



	Código		[	De 60 a 64 aí	ĭos		De 65 a 69 añ	íos		De 70 a 74 aí	ños		De 75 a 79 ai	ĭos
Tipo de atención	CIE10		Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas C	Concentració	n Atenciones	Personas 0	Concentració
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4.340	2.986	1	3.281	2.283	1	3.150	2.189	1	2.718	1.802	2
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	2.274	1.652	1	1.763	1.287	1	1.451	1.059	1	1.023	736	1
		Hipertensión esencial (primaria)	145.265	37.817	4	146.991	38.347	4	146.603	38.516	4	125.237	33.064	4
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	5.196	3.776	1	4.289	3.127	1	3.752	2.767	1	2.937	2.163	1
		Caries de la dentina	14.711	5.722	3	10.063	3.894	3	6.971	2.706	3	4.181	1.684	2
Consultas		Gingivitis crónica	4.886	2.415	2	3.247	1.572	2	1.907	977	2	1.240	613	2
	M545	Lumbago no especificado	12.376	7.335	2	9.959	5.864	2	8.631	5.003	2	6.461	3.837	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	9.588	5.648	2	8.584	4.803	2	8.665	4.665	2	8.024	4.063	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5.090	3.225	2	4.254	2.615	2	3.972	2.404	2	3.038	1.843	2
	R51x	Cefalea	4.563	3.042	1	3.518	2.308	2	3.059	2.020	2	2.367	1.556	2
		Total consultas	233.522	64.918	4	216.351	57.421	4	206.026	53.652	4	170.275	43.756	4
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	824	468	2	624	364	2	614	368	2	580	352	2
	B349	Infección viral, no especificada	137	89	2	146	61	2	91	45	2	101	44	2
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	821	504	2	869	522	2	874	526	2	885	506	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	238	147	2	220	130	2	165	101	2	116	70	2
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	130	81	2	79	47	2	64	38	2	22	16	1
Llenanaina	J189	Neumonía, no especificada	80	53	2	141	67	2	105	68	2	108	71	2
Urgencias	J459	Asma, no especificada	161	75	2	120	64	2	93	53	2	72	47	2
	M545	Lumbago no especificado	403	232	2	325	184	2	200	124	2	179	117	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	609	353	2	562	302	2	740	382	2	614	350	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	315	176	2	225	151	1	266	138	2	167	100	2
		Total urgencias	6.036	3.025	2	5.452	2.608	2	5.062	2.448	2	4.358	2.179	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	77	67	1	99	78	1	94	79	1	92	76	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	57	48	1	70	55	1	73	58	1	83	66	1
		Bronconeumonía, no especificada	27	22	1	26	23	1	43	30	1	36	32	1
		Neumonía, no especificada	71	56	1	85	69	1	110	87	1	150	115	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	51	44	1	48	41	1	35	28	1	19	15	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	158	110	1	127	96	1	138	108	1	103	80	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	351	252	1	365	268	1	409	305	1	499	355	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	103	85	1	110	91	1	106	84	1	104	83	1
	R509	Fiebre, no especificada	43	35	1	35	27	1	33	29	1	48	41	1
	T818	Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte	75	64	1	92	77	1	102	86	1	85	73	1
		Total hospitalizaciones	1.019	766	1	1.069	800	1	1.153	860	1	1.228	900	1



	Código		D	e 80 años o	o más		Total	
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	3.842	2.576	1	168.984	111.445	2
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	1.087	803	1	152.228	107.529	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	161.434	42.593	4	1.066.979	286.420	4
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	3.285	2.410	1	218.860	147.354	1
	K021	Caries de la dentina	3.612	1.550	2	416.523	206.588	2
Consultas	K051	Gingivitis crónica	1.267	658	2	145.746	86.060	2
	M545	Lumbago no especificado	6.815	4.177	2	159.815	94.587	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	12.548	5.996	2	201.982	117.463	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4.413	2.570	2	136.718	85.913	2
	R51x	Cefalea	2.748	1.777	2	113.720	74.922	2
		Total consultas	215.247	56.127	4	4.138.993	1.500.927	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	793	508	2	32.550	19.689	2
	B349	Infección viral, no especificada	105	61	2	6.834	4.599	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	1.337	800	2	7.673	4.597	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	156	100	2	15.863	9.604	2
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	23	19	1	10.093	6.182	2
Urgencias	J189	Neumonía, no especificada	329	190	2	6.892	4.214	2
Orgencias	J459	Asma, no especificada	114	66	2	6.281	3.685	2
	M545	Lumbago no especificado	314	183	2	6.402	3.775	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.148	647	2	16.332	9.704	2
	R101	Dolor abdominal localizado en parte superior	346	213	2	6.129	3.768	2
		Total urgencias	7.568	3.625	2	195.359	97.391	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	163	136	1	3.516	2.986	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	261	206	1	1.916	1.527	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	100	76	1	2.826	2.154	1
	J189	Neumonía, no especificada	352	251	1	3.868	3.055	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	30	27	1	3.725	3.005	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	221	167	1	2.167	1.689	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.141	794	1	7.757	5.781	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	112	96	1	2.585	2.183	1
	R509	Fiebre, no especificada	64	56	1	2.034	1.716	1
	T818	Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte	180	142	1	1.885	1.669	1
		Total hospitalizaciones	2.656	1.851	1	52.987	40.719	1





### Región Amazonía-Orinoquía

Tabla 17. Primeras causas de morbilidad atendida. Región Amazonía-Orinoquía, Colombia, 2011

Tipo de atención	Código CIE10	Diagnóstico	Total atenciones	Total personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	5.712	3.511	2
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	7.175	4.359	2
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	13.153	3.919	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	5.748	3.436	2
	K021	Caries de la dentina	11.906	6.379	2
Consultas	K051	Gingivitis crónica	4.106	2.815	1
	M545	Lumbago no especificado	4.670	2.611	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	8.015	4.319	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	4.800	2.760	2
	R509	Fiebre, no especificada	5.843	3.369	2
		Total consultas	108.496	43.677	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.395	806	2
	B349	Infección viral, no especificada	266	168	2
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	396	204	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	344	207	2
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	378	234	2
Urgencias	J189	Neumonía, no especificada	485	289	2
	M545	Lumbago no especificado	425	226	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	938	556	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	1.651	879	2
	R11x	Nausea y vomito	300	170	2
		Total urgencias	12.975	6.572	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	118	95	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	67	51	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	102	81	1
	J189	Neumonía, no especificada	149	119	1
Hospitalizaciones	K359	Apendicitis aguda, no especificada	137	109	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	78	67	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	226	178	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	65	55	1
	R509	Fiebre, no especificada	79	64	1
	R69x	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	122	93	1
		Total hospitalizaciones	1801	1408	1



Tabla 18. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Amazonía-Orinoquía, Colombia, 2011

Tipo de atención	Código	Diagnóstico		De 0 a 4 a			De 05 a 09 a			De 10 a 14 ai			De 15 a 19 a	
ripo de aterición	CIE10	Diagnostico	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas (	Concentració	n Atenciones	Personas (	Concentració
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1.957	1.038	2	812	517	2	407	271	1	244	171	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	836	505	2	1.896	1.142	2	1.575	916	2	861	495	2
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	5	5	1	3	2	2	3	3	1	22	14	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	2.153	1.235	2	1.112	665	2	486	297	2	304	185	2
	K021	Caries de la dentina	429	242	2	2.153	1.169	2	1.477	852	2	1.140	652	2
Consultas	K051	Gingivitis crónica	182	125	1	588	411	1	428	303	1	318	219	1
	M545	Lumbago no especificado	2	1	2	16	8	2	58	32	2	163	97	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	573	291	2	577	325	2	375	210	2	564	289	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	174	87	2	394	244	2	502	279	2	458	258	2
	R509	Fiebre, no especificada	1.446	788	2	1.104	642	2	607	345	2	401	235	2
		Total consultas	18.414	6.580	3	17.403	7.141	2	10.037	4.568	2	8.419	3.992	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	422	246	2	211	118	2	85	55	2	54	35	2
	B349	Infección viral, no especificada	52	34	2	29	19	2	26	18	1	24	15	2
		Hipertensión esencial (primaria)							1	1	1	6	4	2
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	128	76	2	67	38	2	22	15	1	21	12	2
		Amigdalitis aguda, no especificada	63	42	2	110	65	2	59	37	2	27	17	2
	J189	Neumonía, no especificada	229	131	2	69	41	2	33	19	2	21	11	2
Urgencias	M545	Lumbago no especificado				1	1	1	4	1	4	7	3	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	119	72	2	70	44	2	47	33	1	90	47	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	16	7	2	91	53	2	155	82	2	172	95	2
	R11x	Nausea y vomito	92	51	2	48	28	2	25	15	2	10	8	1
		Total urgencias	2.238	1.086	2	1.571	796	2	919	503	2	958	522	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	39	33	1	24	17	1	5	5	1	1	1	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	28	23	1	5	4	1	4	2	2	1	1	1
		Bronconeumonía, no especificada	61	43	1	11	10	1				1	1	1
		Neumonía, no especificada	80	60	1	20	18	1	9	6	2	2	2	1
		Apendicitis aguda, no especificada	4	4	1	10	8	1	10	8	1	26	23	1
		Celulitis de otras partes de los miembros	12	10	1	6	5	1	4	4	1	2	2	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	66	49	1	19	16	1	7	6	1	19	16	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	5	5	1	10	8	1	10	8	1	2	2	1
	R509	Fiebre, no especificada	22	21	1	13	8	2	4	3	1	7	6	1
	R69x	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	55	44	1	23	20	1	3	3	1	8	5	2



Tino do otonoión	Código		D	e 20 a 24	años	ı	De 25 a 29 a	años	[	De 30 a 34 a	años	ı	De 35 a 39 a	iños
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración	n Atenciones	Personas	Concentraciór
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	215	149	1	327	223	1	316	226	1	283	177	2
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	293	187	2	306	202	2	281	188	1	219	154	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	18	12	2	59	31	2	140	63	2	257	99	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	215	119	2	218	146	1	234	146	2	241	159	2
	K021	Caries de la dentina	842	478	2	1.126	601	2	1.323	690	2	1.060	520	2
Consultas	K051	Gingivitis crónica	298	222	1	428	294	1	549	364	2	332	220	2
	M545	Lumbago no especificado	206	127	2	335	201	2	474	279	2	639	329	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	641	332	2	754	422	2	690	406	2	698	401	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	387	216	2	453	267	2	535	301	2	376	229	2
	R509	Fiebre, no especificada	304	180	2	344	217	2	335	209	2	253	156	2
		Total consultas	5.884	2.685	2	6.452	2.995	2	6.313	2.904	2	5.253	2.317	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	66	39	2	82	48	2	67	39	2	75	40	2
	B349	Infección viral, no especificada	21	12	2	17	11	2	16	11	1	17	9	2
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	2	1	2	6	4	2	4	2	2	20	11	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	18	9	2	13	8	2	30	16	2	18	12	2
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	19	13	1	16	10	2	22	12	2	10	7	1
Llumanaina	J189	Neumonía, no especificada	4	2	2	10	6	2	6	3	2	8	5	2
Urgencias	M545	Lumbago no especificado	24	12	2	37	21	2	57	27	2	55	29	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	113	65	2	98	55	2	63	41	2	52	30	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	173	88	2	213	111	2	221	112	2	115	63	2
	R11x	Nausea y vomito	15	9	2	12	7	2	17	10	2	5	2	3
		Total urgencias	965	482	2	1.006	521	2	995	506	2	733	371	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	3	1	4	3	1	7	6	1	2	2	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	1	1	1	3	2	2	4	3	1			
	J180	Bronconeumonía, no especificada	3	3	1	1	1	1	7	6	1	1	1	1
	J189	Neumonía, no especificada	4	4	1	6	5	1	4	4	1	3	3	1
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	13	12	1	15	8	2	19	14	1	6	6	1
		Celulitis de otras partes de los miembros	3	3	1	3	2	2	8	7	1	3	3	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	21	16	1	17	13	1	15	12	1	1	1	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	2	2	5	3	2	4	3	1	4	4	1
	R509	Fiebre, no especificada	6	5	1	4	3	1	3	2	2	6	5	1
	R69x	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	4	2	2	2	1	2	8	5	2	6	4	2
		Total hospitalizaciones	236	193	1	207	154	1	217	157	1	97	78	1



<del></del>	Código			De 40 a 44	años		De 45 a 49 ar	ios		De 50 a 54	años		De 55 a 59 a	años
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas C	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	215	142	2	208	138	2	179	115	2	134	83	2
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	217	132	2	169	112	2	131	89	1	108	71	2
		Hipertensión esencial (primaria)	440	175	3	869	313	3	1.486	444	3	1.403	456	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	148	92	2	122	80	2	126	70	2	96	63	2
	K021	Caries de la dentina	784	395	2	622	303	2	365	173	2	216	113	2
Consultas	K051	Gingivitis crónica	301	199	2	230	152	2	138	96	1	116	65	2
	M545	Lumbago no especificado	535	296	2	493	283	2	495	266	2	374	206	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	651	340	2	523	287	2	412	244	2	372	182	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	308	175	2	256	162	2	235	137	2	170	101	2
	R509	Fiebre, no especificada	237	143	2	158	86	2	155	96	2	143	81	2
		Total consultas	4.452	1.928	2	4.363	1.802	2	4.198	1.565	3	3.448	1.199	3
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	64	35	2	75	37	2	35	23	2	35	21	2
	B349	Infección viral, no especificada	17	11	2	13	7	2	10	6	2	10	5	2
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	23	12	2	24	13	2	57	28	2	33	17	2
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)				7	6	1	6	5	1	2	1	2
		Amigdalitis aguda, no especificada	12	9	1	13	7	2	11	6	2	8	4	2
		Neumonía, no especificada	3	2	2	7	4	2	16	9	2	16	10	2
Urgencias	M545	Lumbago no especificado	64	39	2	38	20	2	37	21	2	33	15	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	46	29	2	46	26	2	30	19	2	29	18	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	116	57	2	78	48	2	61	33	2	62	34	2
	R11x	Nausea y vomito	6	3	2	12	6	2	10	6	2	14	8	2
		Total urgencias	686	356	2	576	273	2	515	264	2	404	208	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	3	1	5	5	1	6	5	1			
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	2	2	1	1	1	1	5	3	2	1	1	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	7	6	1	4	4	1	3	3	1			
	J189	Neumonía, no especificada				3	3	1	6	4	2			
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	13	8	2	7	5	1	3	2	2	2	2	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	4	3	1	4	3	1	5	4	1	6	6	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	6	5	1	11	9	1	5	4	1	5	4	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	2	1	6	5	1	3	2	2	2	2	1
	R509	Fiebre, no especificada	1	1	1	6	5	1	2	1	2	2	1	2
	R69x	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	4	3	1				2	1	2			
		Total hospitalizaciones	68	55	1	52	43	1	42	29	1	19	17	1



The design of the	Código	Diame (atia		De 60 a 64 a	ños		De 65 a 69 años	3	D	e 70 a 74 a	iños		De 75 a 79 a	ños
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas Cor	ncentració	n Atenciones	Personas	Concentraciór	n Atenciones	Personas (	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	118	77	2	101	63	2	102	58	2	33	23	1
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	89	54	2	58	39	1	74	36	2	25	14	2
		Hipertensión esencial (primaria)	1.750	523	3	1.715	492	3	1.943	475	4	1.227	340	4
		Rinofaringitis aguda (resfriado común)	103	59	2	63	40	2	68	40	2	29	19	2
		Caries de la dentina	137	73	2	84	38	2	71	35	2	30	18	2
Consultas		Gingivitis crónica	74	49	2	30	26	1	17	13	1	19	12	2
	M545	Lumbago no especificado	279	153	2	227	119	2	151	82	2	110	63	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	380	166	2	252	122	2	207	116	2	162	83	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	155	82	2	102	59	2	99	55	2	52	31	2
	R509	Fiebre, no especificada	107	64	2	85	38	2	60	35	2	38	19	2
		Total consultas	3.456	1.078	3	2.901	863	3	2.953	787	4	1.836	514	4
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	20	11	2	46	24	2	32	20	2	13	8	2
	B349	Infección viral, no especificada	3	3	1	4	3	1	6	3	2	1	1	1
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	40	20	2	32	17	2	43	21	2	36	18	2
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	6	4	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1
	J039	Amigdalitis aguda, no especificada	4	2	2				2	1	2	1	1	1
Urgencias	J189	Neumonía, no especificada	9	7	1	13	8	2	10	8	1	7	5	1
Orgencias	M545	Lumbago no especificado	23	11	2	14	10	1	8	5	2	3	3	1
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	39	19	2	20	10	2	20	15	1	23	15	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	37	22	2	25	13	2	43	24	2	24	14	2
	R11x	Nausea y vomito	10	5	2	7	3	2	6	3	2	5	3	2
		Total urgencias	337	161	2	253	128	2	269	129	2	209	103	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	8	4	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	1	1	1				6	3	2	1	1	1
	J180	Bronconeumonía, no especificada	1	1	1				1	1	1			
	J189	Neumonía, no especificada	3	3	1				2	2	1	3	2	2
	K359	Apendicitis aguda, no especificada	3	3	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	4	4	1	3	3	1	7	4	2	2	2	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	11	7	2	9	8	1	4	4	1	4	2	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
	R509	Fiebre, no especificada				1	1	1						
	R69x	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas	1	1	1	6	4	2						
		Total hospitalizaciones	36	28	1	26	23	1	24	18	1	16	13	1



#### Continuación. Primeras causas de morbilidad atendida por grupos de edad. Región Amazonía-Orinoquía, Colombia, 2011

Tino do otomoión	Código	Diagráphica	D	e 80 años	o más		Total	
Tipo de atención	CIE10	Diagnóstico	Atenciones	Personas	Concentración	Atenciones	Personas	Concentración
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	56	37	2	5.712	3.511	2
	B829	Parasitosis intestinal, sin otra especificación	37	23	2	7.175	4.359	2
	I10x	Hipertensión esencial (primaria)	1.798	465	4	13.153	3.919	3
	J00x	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	30	21	1	5.748	3.436	2
	K021	Caries de la dentina	39	22	2	11.906	6.379	2
Consultas	K051	Gingivitis crónica	30	20	2	4.106	2.815	1
	M545	Lumbago no especificado	110	66	2	4.670	2.611	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	175	97	2	8.015	4.319	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	136	71	2	4.800	2.760	2
	R509	Fiebre, no especificada	64	33	2	5.843	3.369	2
		Total consultas	2.607	703	4	108.496	43.677	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	13	7	2	1.395	806	2
	B349	Infección viral, no especificada				266	168	2
		Hipertensión esencial (primaria)	69	35	2	396	204	2
		. ,	1	1	1	344	207	2
		Amigdalitis aguda, no especificada	1	1	1	378	234	2
	J189	Neumonía, no especificada	24	18	1	485	289	2
Urgencias		Lumbago no especificado	20	8	3	425	226	2
	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	33	18	2	938	556	2
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	49	23	2	1.651	879	2
	R11x	Nausea y vomito	6	3	2	300	170	2
		Total urgencias	341	163	2	12.975	6.572	2
	A09x	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	4	3	1	118	95	1
	J159	Neumonía bacteriana, no especificada	4	3	1	67	51	1
		Bronconeumonía, no especificada	1	1	1	102	81	1
			4	3	1	149	119	1
		Apendicitis aguda, no especificada				137	109	1
	L031	Celulitis de otras partes de los miembros	2	2	1	78	67	1
Hospitalizaciones	N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	6	6	1	226	178	1
	R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3	3	1	65	55	1
	R509	Fiebre, no especificada	2	2	1	79	64	1
	R69x	Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas				122	93	1
		Total hospitalizaciones	28	23	1	1.801	1.408	1

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO, Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud- RIPS, 2011



#### Priorización

Luego de analizar los indicadores previamente expuestos y sus relaciones con los determinantes sociales de la salud, a continuación se presenta el análisis que da cuenta de las regiones y departamentos donde el valor del indicador es significativamente más alto que el nacional.

Para realizar este análisis comparativo entre los indicadores departamentales o regionales con respecto al nacional, se calculó la razón para cada indicador, usando en el numerador el valor del indicador regional o departamental y en el denominador el valor del indicador nacional, luego al resultado del cálculo de la razón se le calculó los intervalos de confianza del 95% utilizando el método de Rothman KJ y Greenland S:

Lower bound: 
$$e^{\left[\ln(rate)-Z_{1-\alpha/2}\frac{1}{\sqrt{a}}\right]}$$

Upper bound: 
$$e^{\left[\ln(rate)+Z_{1-\alpha/2}\frac{1}{\sqrt{a}}\right]}$$

En cada casilla aparece el valor del indicador enunciado en la columna A, y fue semaforizado de acuerdo a los resultados del cálculo de la razón con sus intervalos de confianza. Se interpretan de la siguiente manera:

Cuando la razón es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas en el valor que toma el indicador en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Cuando la razón es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el

Cuando la razón es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Cuando la razón es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Entre los hallazgos más relevantes en este proceso de priorización, de acuerdo a la tabla resumen que se presenta a continuación con 41 indicadores analizados en seis regiones y 32 departamentos y el Distrito Capital, se encontró que las regiones más vulnerables, teniendo en cuenta los indicadores analizados son la Amazonía – Orinoquía y la Oriental. Estas dos regiones presentan 11 de 41 indicadores (26,8%) con valores por encima del valor nacional, cuyo resultado es estadísticamente significativo de acuerdo al análisis de los intervalos de confianza para las razones calculadas.





Entre los departamentos, los que tienen mayor número de indicadores por encima del valor nacional son Amazonas (10) y Guainía (9), que corresponden a la región Amazonia-Orinoquia, y Chocó (10) de la región Pacífica y Vichada (9) de la región Oriental.

Asimismo, el indicador de salud que más está afectando la población colombiana es la cobertura de vacunación con DPT, cuya cobertura está por debajo de la nacional en 19 departamentos, seguido de la razón de mortalidad materna (hasta los 42 días y hasta el año) cuyo indicador se encuentra por encima del valor nacional en 11 departamentos y dos regiones, la tasa general de fecundidad por 1000 mujeres (2010-2015), el cual se encuentra por encima del valor nacional en 13 departamentos, la tasa de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad por EDA por 100.000 menores de cinco años que se encuentran por encima del valor del indicador nacional en 9 departamentos. (Tabla 19).





#### Tabla 19. Indicadores. Colombia.

Indicador	Colombia	Región Caribe e insular	Atlántico	Cesar	Córdoba	Bolívar	Magdalena	La Guajira	San Andrés	Sucre	Región Central	Antioquía	Caquetá	Caldas	Huila	Tolima	Risaralda	Quindío
Tasa global de fecundidad (por mujer) por 1.000 (2010-2015)	2,4		2,3	2,8	2,8	2,6	3,0	3,6	2,2	2,6		2,1	3,1	2,1	2,6	2,5	2,1	2,2
Tasa general de fecundidad por 1000 mujeres (2010-2015)	71,5		68,6	89,8	90,2	83,3	96,9	116,8	67,2	84,7		63,8	98,1	65,6	83,8	77,2	63,4	65,7
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes (2010-2015)	18,8		18,3	23,0	22,8	21,1	23,2	29,4	17,4	21,0		17,1	24,6	16,6	21,2	18,6	16,5	16,7
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes (2010-2015)	5,8		5,3	5,0	5,7	5,6	5,4	4,9	5,2	5,8		5,9	6,6	7,2	6,0	7,4	6,7	7,1
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (2010)	12,8	14,0	13,1	16,4	15,6	12,0	14,8	18,6	21,8	8,9	11,7	11,0	16,5	13,3	10,7	11,7	11,8	14,0
Tasa de mortalidad en menores de cinco años por 100.000 menores de cinco años (2010)	15,7	16,8	15,2	20,0	18,6	14,7	18,1	23,1	25,5	10,4	14,9	14,3	20,8	16,2	13,4	15,4	15,5	15,8
Tasa de mortalidad por IRA por 100.000 menores de cinco años (2010)	16,5	15,1	13,0	20,8	13,6	20,3	12,1	15,7	15,7	7,1	14,8	13,7	16,7	10,9	8,0	19,1	32,6	6,5
Tasa de mortalidad por EDA por 100.000 menores de cinco años (2010)	5,3	5,8	2,8	9,0	2,8	6,8	7,9	11,3	0,0	2,4	4,2	3,3	13,0	2,4	2,7	6,1	6,5	2,2
Razón de mortalidad materna (hasta los 42 días) por 100.000 nacidos vivos (2010)	71,6	102,1	76,7	117,3	146,8	71,1	127,4	155,0	0,0	62,8	63,6	51,1	194,3	73,5	48,1	76,7	59,2	65,0
Razón de mortalidad materna (hasta el año) por	75,3	106,0	82,4	122,6	151,2	71,1	132,2	163,1	0,0	62,8	65,6	52,4	194,3	73,5	48,1	81,8	67,7	65,0



COLOMP																		
Indicador	Colombia	Región Caribe e insular	Atlántico	Cesar	Córdoba	Bolívar	Magdalena	La Guajira	San Andrés	Sucre	Región Central	Antioquía	Caquetá	Caldas	Huila	Tolima	Risaralda	Quindío
100.000 nacidos vivos (2010)																		
Prevalencia de bajo peso al nacer por 100 (2010)	9,0		8,6	7,8	8,4	7,7	7,5	8,2	8,4	7,5		9,6	6,0	6,8	6,1	7,0	8,7	7,4
Prevalencia de anemia en niños de 1 a 4 años por 100 (2010)	29,4		29,9	23,6	37,5	22,8	35,8	38,9	36,6	16,0		23,8	20,4	25,1	20,8	34,7	22,9	20,6
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años por 100 (2010)	13,2		15,5	11,7	16,4	10,8	18,0	27,9	3,8	14,3		10,3	11,7	13,5	11,7	10,7	10,4	9,6
Prevalencia de obesidad de 18 a 64 años por 100	16,7		19,5	16,3	15,3	17,1	14,6	17,0	26,6	14,0		15,4	21,8	16,4	20,0	21,3	15,1	17,5
Cobertura de parto institucional por 100 (2010)	98,6	98,9									98,5							
Cobertura de 4 o más controles prenatales por 100 (2010)	86,2	83,8									88,6							
Tasa de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes (2006)	169,0		126,0	108,0	56,0	96,0	92,0	61,0	486,0	124,0		127,0	80,0	119,0	148,0	130,0	123,0	157,0
Coberturas de vacunación por polio (2011)	84,8	89,1	73,3	102,6	92,8	86,2	95,8	81,9	61,6	93,7	75,4	71,4	87,1	64,8	87,2	84,6	75,4	72,0
Coberturas de vacunación por DPT (2011)	85,3	89,3	73,3	105,0	92,7	85,9	95,7	81,8	62,2	93,7	75,2	70,9	87,0	64,9	87,2	84,6	75,6	72,0
Coberturas de vacunación por SRP (2011)	87,6	90,0	72,7	108,1	92,6	83,4	97,7	82,3	64,1	97,9	80,7	80,0	85,3	66,4	87,9	86,2	80,3	76,2
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (2010)	120,3	100,6									69,9							
Tasas ajustadas de	63,2	53,4									69,9							



Colombia	Región Caribe e insular	Atlántico	Cesar	Córdoba	Bolívar	Magdalena	La Guajira	San Andrés	Sucre	Región Central	Antioquía	Caquetá	Caldas	Huila	Tolima	Risaralda	Quindío
		ļ									ļ						
57,1	47,2									62,8							
78,4	57,4									44,2							
38,3	28,6									44,2							
40,0	28,8									45,3							
28,0	27,6									17,2							
16,4	15,9									17,2							
11,6	11,7									12,5 76.2							
	57,1 78,4 38,3 40,0 28,0	57,1 47,2 78,4 57,4 38,3 28,6 40,0 28,8 28,0 27,6 16,4 15,9	57,1 47,2  78,4 57,4  38,3 28,6  40,0 28,8  28,0 27,6  16,4 15,9	See	Separate   Separate	Colombia Col	Sequence       Adjuntico         Sequence       Adjuntico	September   Sept	San Andress   San Andress	San Andrés   San	62,8         78,4       57,4       44,2         38,3       28,6       44,2         40,0       28,8       45,3         28,0       27,6       17,2         11,6       11,7       11,6	San Antiodrila   San	Septendaria   Septendaria	Page   Page	Regique   Part   Part	Help   Help	Columbia   Columbia



COLOWELL																		
Indicador	Colombia	Región Caribe e insular	Atlántico	Cesar	Córdoba	Bolívar	Magdalena	La Guajira	San Andrés	Sucre	Región Central	Antioquía	Caquetá	Caldas	Huila	Tolima	Risaralda	Quindío
mortalidad por causas externas (2010)			,				_	_			_	,			_			
Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas en hombres (2010)	59,9	39,4									76,2							
Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas en mujeres (2010)	9,8	6,4									12,0							
Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal (2010)	11,1	12,6									5,4							
Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal en hombres (2010)	6,2	6,9									5,4							
Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal en mujeres (2010)	4,9	5,6									4,4							
Tasas ajustadas de mortalidad por signos y síntomas mal definidos (2010)	8,6	7,7									3,8							
Tasas ajustadas de mortalidad por signos y síntomas mal definidos en hombres (2010)	5,0	4,0									3,8							
Tasas ajustadas de mortalidad por signos y síntomas mal definidos en	3,6	3,7									2,5							



Indicador	Colombia	Región Caribe e insular	Atlántico	Cesar	Córdoba	Bolívar	Magdalena	La Guajira	San Andrés	Sucre	Región Central	Antioquía	Caquetá	Caldas	Huila	Tolima	Risaralda	Quindío
mujeres (2010)																		
Tasas ajustadas de mortalidad por las demás enfermedades (2010)	104,1	88,0									54,8							
Tasas ajustadas de mortalidad por las demás enfermedades en hombres (2010)	52,6	43,9									54,8							
Tasas ajustadas de mortalidad por las demás enfermedades en mujeres (2010)	51,5	44,1									54,2							



COLOND			1						1			
Indicador	Colombia	Región Bogotá- Cundinamarca	Bogotá D.C.	Cundinamarca	Región Oriental	Arauca	Boyacá	Casanare	Meta	Norte de Santander	Santander	Vichada
Tasa global de fecundidad (por mujer) por 1.000 (2010-2015)	2,4		1,9	2,3		3,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,1	3,7*
Tasa general de fecundidad por 1000 mujeres (2010-2015)	71,5		56,8	72,7		117,4	74,7	83,9	78,5	76,0	64,1	124,4*
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes (2010-2015)	18,8		15,9	18,8		27,9	17,8	22,1	20,8	19,6	16,9	29,1*
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes (2010-2015)	5,8		4,5	6,2		6,0	6,9	5,8	6,2	6,4	6,2	5,6
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (2010)	12,8	11,7	11,9	11,1	11,6	8,2	12,5	12,2	10,9	12,7	10,4	37,9
Tasa de mortalidad en menores de cinco años por 100.000 menores de cinco años (2010)	15,7	13,7	13,8	13,4	14,7	12,9	15,3	16,1	15,2	15,5	12,5	49,7
Tasa de mortalidad por IRA por 100.000 menores de cinco años (2010)	16,5	20,3	22,9	13,8	14,9	14,9	8,5	14,2	23,5	16,4	13,0	32,3
Tasa de mortalidad por EDA por 100.000 menores de cinco años (2010)	5,3	1,3	1,3	1,3	3,9	3,0	0,8	0,0	1,1	7,8	4,7	21,6
Razón de mortalidad materna (hasta los 42 días) por 100.000 nacidos vivos (2010)	71,6	37,8	37,0	40,5	66,6	111,3	73,2	77,3	46,3	93,5	43,8	118,3
Razón de mortalidad materna (hasta el año) por 100.000 nacidos vivos (2010)	75,3	41,9	41,5	43,4	68,7	111,3	73,2	77,3	52,9	98,4	43,8	118,3
Prevalencia de bajo peso al nacer por 100 (2010)	9,0		12,9	10,7		6,2	9,5	5,7	6,2	6,4	7,3	5,9
Prevalencia de anemia en niños de 1 a 4 años por 100 (2010)	29,4		21,0	37,5		26,5	25,7	19,7	42,6	30,3	14,7	32,5
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años por 100 (2010)	13,2		16,3	13,1		13,0	16,7	10,1	7,7	9,8	8,6	15,8
Prevalencia de obesidad de 18 a 64 años por 100	16,7		14,1	17,9		20,1	16,2	20,1	19,8	16,4	17,0	19,8
Cobertura de parto institucional por 100 (2010)	98,6	99,7			98,2							
Cobertura de 4 o más controles prenatales por 100 (2010)	86,2	88,6			85,0							
Tasa de violencia intrafamiliar por 100.000	169,0		258,0	398,0		258,0	356,0	328,0	262,0	206,0	170,0	76,0



							I	1			I	
Indicador	Colombia	Región Bogotá- Cundinamarca	Bogotá D.C.	Cundinamarca	Región Oriental	Arauca	Boyacá	Casanare	Meta	Norte de Santander	Santander	Vichada
habitantes (2006)												
Coberturas de vacunación por polio (2011)	84,8	85,0	88,7	75,6	90,1	71,1	84,8	95,0	92,0	89,5	97,0	69,9
Coberturas de vacunación por DPT (2011)	85,3	88,6	93,8	75,5	90,0	70,6	84,8	95,0	91,9	89,5	97,1	63,1
Coberturas de vacunación por SRP (2011)	87,6	88,4	92,7	77,4	91,7	72,9	86,0	102,7	93,3	93,4	95,6	76,9
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (2010)	120,3	114,5			184,5							
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en hombres (2010)	63,2	57,2			100,6							
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres (2010)	57,1	57,3			84,0							
Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias (2010)	78,4	80,3			106,4							
Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias en hombres (2010)	38,3	38,8			53,3							
Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias en mujeres (2010)	40,0	41,6			53,1							
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades transmisibles (2010)	28,0	22,9			38,9							
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades transmisibles en hombres (2010)	16,4	13,5			24,1							
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades transmisibles en mujeres (2010)	11,6	9,4			14,8							
Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas (2010)	69,7	42,1			82,0							
Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas en hombres (2010)	59,9	35,1			69,4							
Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas en mujeres (2010)	9,8	7,0			12,5							
Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal (2010)	11,1	11,8			13,0							



Indicador	Colombia	Región Bogotá- Cundinamarca	Bogotá D.C.	Cundinamarca	Región Oriental	Arauca	Boyacá	Casanare	Meta	Norte de Santander	Santander	Vichada
Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal en hombres (2010)	6,2	6,4			7,9							
Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal en mujeres (2010)	4,9	5,4			5,2							
Tasas ajustadas de mortalidad por signos y síntomas mal definidos (2010)	8,6	12,1			11,1							
Tasas ajustadas de mortalidad por signos y síntomas mal definidos en hombres (2010)	5,0	7,6			6,2							
Tasas ajustadas de mortalidad por signos y síntomas mal definidos en mujeres (2010)	3,6	4,4			4,8							
Tasas ajustadas de mortalidad por las demás enfermedades (2010)	104,1	106,2			155,7							
Tasas ajustadas de mortalidad por las demás enfermedades en hombres (2010)	52,6	52,6			82,5							
Tasas ajustadas de mortalidad por las demás enfermedades en mujeres (2010)	51,5	53,6			73,1							



COLOMBIA												
Indicador	Colombia	Región Pacífica	Cauca	Chocó	Nariño	Valle del Cauca	Región Amazonía- Orinoquía	Amazonas	Guaviare	Putumayo	Vaupés	Guainía
Tasa global de fecundidad (por mujer) por 1.000 (2010-2015)	2,4		2,7	3,6	2,5	2,0		3,7*	3,7*	3,1	3,7*	3,7*
Tasa general de fecundidad por 1000 mujeres (2010-2015)	71,5		83,0	122,7	79,0	60,8		124,4*	124,4*	98,1	124,4*	124,4*
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes (2010-2015)	18,8		20,7	29,3	20,2	16,4		29,1*	29,1*	24,8	29,1*	29,1*
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes (2010-2015)	5,8		6,7	6,6	6,2	6,1		5,6*	5,6*	5,5	5,6*	5,6*
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos (2010)	12,8	14,1	15,9	33,8	14,5	11,4	19,7	23,0	14,8	17,9	17,4	39,0
Tasa de mortalidad en menores de cinco años por 100.000 menores de cinco años (2010)	15,7	17,2	19,7	42,3	17,3	13,8	27,1	32,5	20,7	21,3	49,1	47,5
Tasa de mortalidad por IRA por 100.000 menores de cinco años (2010)	16,5	15,5	19,9	42,3	12,8	10,3	32,2	39,3	7,2	22,7	50,3	140,1
Tasa de mortalidad por EDA por 100.000 menores de cinco años (2010)	5,3	8,2	10,7	27,2	6,7	4,4	32,2	39,3	7,2	5,1	234,8	60,0
Razón de mortalidad materna (hasta los 42 días) por 100.000 nacidos vivos (2010)	71,6	79,2	135,0	178,7	69,4	55,0	138,2	0,0	74,1	242,2	0,0	0,0
Razón de mortalidad materna (hasta el año) por 100.000 nacidos vivos (2010)	75,3	86,5	152,6	196,5	69,4	60,5	138,2	0,0	74,1	242,2	0,0	0,0
Prevalencia de bajo peso al nacer por 100 (2010)	9,0		8,2	9,8	8,8	9,1		6,3	7,1	6,0	4,3	5,8
Prevalencia de anemia en niños de 1 a 4 años por 100 (2010)	29,4		32,6	37,2	39,4	28,2		43,9	28,7	33,1	34,4	29,2
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años por 100 (2010)	13,2		23,1	15,7	16,9	5,9		28,7	12,4	9,8	34,7	23,4
Prevalencia de obesidad de 18 a 64 años por 100	16,7		14,8	20,3	14,6	15,7		12,7	25,1	15,0	11,7	20,7
Cobertura de parto institucional por 100 (2010)	98,6	97,7					88,9					
Cobertura de 4 o más controles prenatales por 100 (2010)	86,2	86,3					61,6					



COLOME												
Indicador	Colombia	Región Pacífica	Cauca	Chocó	Nariño	Valle del Cauca	Región Amazonía- Orinoquía	Amazonas	Guaviare	Putumayo	Vaupés	Guainía
Tasa de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes (2006)	169,0		82,0	59,0	83,0	138,0		447,0	84,0	41,0		
Coberturas de vacunación por polio (2011)	84,8	86,9	87,3	66,3	65,0	100,4	70,5	73,4	66,3	72,3	69,6	64,3
Coberturas de vacunación por DPT (2011)	85,3	86,0	87,4	66,2	65,0	98,5	70,6	73,7	66,3	72,3	69,5	64,2
Coberturas de vacunación por SRP (2011)	87,6	86,6	89,5	78,1	68,7	95,2	74,6	76,9	59,7	78,1	76,9	81,8
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio (2010)	120,3	114,1					75,5			·		
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en hombres (2010)	63,2	59,3					45,7					
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres (2010)	57,1	54,8					29,7					
Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias (2010)	78,4	79,7					51,9					
Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias en hombres (2010)	38,3	37,4					27,7					
Tasas ajustadas de mortalidad por neoplasias en mujeres (2010)	40,0	42,3					24,2					
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades transmisibles (2010)	28,0	28,1					43,5					
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades transmisibles en hombres (2010)	16,4	16,1					26,1					
Tasas ajustadas de mortalidad por enfermedades transmisibles en mujeres (2010)	11,6	12,0					17,3					
Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas (2010)	69,7	93,2					87,8					
Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas en hombres (2010)	59,9	81,2					76,9					
Tasas ajustadas de mortalidad por causas	9,8	12,0					10,9					



	1											
Indicador	Colombia	Región Pacífica	Cauca	Chocó	Nariño	Valle del Cauca	Región Amazonía- Orinoquía	Amazonas	Guaviare	Putumayo	Vaupés	Guainía
externas en mujeres (2010)								,			,	
Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal (2010)	11,1	9,9					11,4					
Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal en hombres (2010)	6,2	5,7					6,9					
Tasas ajustadas de mortalidad por afecciones del periodo perinatal en mujeres (2010)	4,9	4,2					4,5					
Tasas ajustadas de mortalidad por signos y síntomas mal definidos (2010)	8,6	7,7					8,4					
Tasas ajustadas de mortalidad por signos y síntomas mal definidos en hombres (2010)	5,0	4,2					4,9					
Tasas ajustadas de mortalidad por signos y síntomas mal definidos en mujeres (2010)	3,6	3,6					3,4					
Tasas ajustadas de mortalidad por las demás enfermedades (2010)	104,1	99,0					87,4					
Tasas ajustadas de mortalidad por las demás enfermedades en hombres (2010)	52,6	49,4					49,6					
Tasas ajustadas de mortalidad por las demás enfermedades en mujeres (2010)	51,5	49,6					37,8					









#### Bibliografía

\_\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Naciones Unidas. Informe 2010: Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nueva York. 2010