

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002-2007

CORRECCIONES A GRÁFICAS Y TABLAS TOMO II

RELACIONES FAMILIARES Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

4. a. Página 90:

Cuadro 3.2. Razones de Disparidad (OR) e Intervalo de Confianza (IC95%) de factores de protección y de riesgo para agresión a la pareja y al menor. Modelos de regresión logística. Medellín y área metropolitana, 2004

VARIABLE	Cónyuge agresor de su pareja		Padre/madre agresor de hijo menor de 5 años	
	Agresión física SIN lesión	Agresión física CON lesión	Agresión física SIN lesión	Agresión física CON lesión
FAMILIA O MICROSISTEMA – MESOSISTEMA				
Confianza y vigilancia de la MADRE	0,32 (0,21-0,48)		0,24 (0,14-0,39)	
Afecto y comunicación con la MADRE		0,35 (0,20-0,61)		
PADRE vigilante cercano		0,39 (0,22-0,70)		
PADRE afectuoso y comunicativo	0,70 (0,54-0,91)			
Maltrato físico por la MADRE	2,08 (1,42-3,06)			52,61 (17,21-161,05)
PADRE aplicaba castigo físico	3,26 (1,28-8,32)	4,70 (1,18-18,6)		
BARRIO O EXOSISTEMA				
Percepción de cuidado y vigilancia social del barrio		0,31 (0,10-0,61)	0,36 (0,15-0,88)	
Percepción de violencia en el barrio	4,43 (2,93-6,70)	5,04 (2,46-10,3)	5,15 (2,97-8,91)	
PERSONA U ONTOLÓGICAS				
Índice de desempleo en la vida	1,61 (1,09-2,37)	2,80 (1,49-5,24)	2,25 (1,35-3,73)	
Aprobación de corrupción a funcionario público	1,37 (1,04-1,79)			
Aprobación de asesinato para defensa de la comunidad				2,56 (1,27-5,13)
Desconfianza en los demás	1,51 (1,04-2,19)			
Anomia		1,59 (1,05-2,41)		
Percepción de que no se podrán satisfacer las expectativas de educación superior y ejercicio profesional	2,64 (1,97-3,54)			
Actitudes machistas		2,57 (1,15-5,76)		
Legitimación del uso de la violencia como método de educación			2,57 (1,33-4,95)	
Legitimación del uso de la violencia para defensa de la familia y la sociedad	1,55 (1,07-2,26)	2,75 (1,37-5,48)		

Fuente: Cálculos de los investigadores a partir de los datos compilados por PREVIVA en sus estudios sobre muestras representativas de Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá, 2003-2004.

4. b. Página 99:

Cuadro 3.3. Relación de diversos factores con la victimización de la mujer por parte de su compañero o cónyuge en términos de OR ajustadas. Colombia 2005

Variable	Control del cónyuge En la vida	Control del cónyuge Último año	Amenaza con arma En la vida	Amenaza con arma Último año	Agresión física En la vida	Agresión física Último año	Agresión sexual En la vida
Residir en cabecera municipal			1,31 **	1,36 **		1,24 **	
Región (Referencia Atlántica)							
Oriental	1,04	0,92	1,05	0,99	1,07 **	0,96	1,29 *
Central	1,18	1,10	1,04	0,89	1,18 **	0,77	1,33 **
Pacífica	1,17	1,11	0,98	0,96	1,29 **	1,06	1,40 **
Bogotá	1,56 **	1,44 **	1,32 **	1,16	2,12 **	1,58 **	1,29
Orinoquía/Amazonía	1,33 **	1,14	1,11	0,82 **	1,80 **	0,88	1,32 **
Edad mujer	0,98 **	0,98 **	0,99 **	0,96 **		0,96 **	
Edad cónyuge		0,99 *			0,99 **	0,98 **	1,01 **
Grado de escolaridad de la mujer			0,99 **	0,84 **	0,90 **	0,87 **	0,88 **
Grado de escolaridad del cónyuge	0,91 **	0,93 **	0,91 **	0,90 **	0,90 **	0,89 *	0,83 **
Estrato económico social mujer			0,91 **	0,92 **	0,96 **	0,92 **	
Mujer trabajó último año o tiene trabajo remunerado	0,79 **	0,80 **	1,18 **	1,14 **	1,14 **	1,14 *	1,30 **
Mujer aporta a gastos del hogar			1,04 **	1,04 **			
¿Quién decide cómo gastar el dinero?:							
Cónyuge/compañero			1,86 **	1,85 **	1,91 **	2,16 **	1,30
Ambos de común acuerdo			0,72 **	0,63 **	0,79 **	0,80 **	0,67 **
Alguien diferente a la pareja			1,18	1,00	1,13	0,91	1,21
Conjuntamente con alguien mas			1,16	1,27	1,16	1,47	1,33
Embarazo actual					0,79 **		
Número de hijos con los que viven	1,09 **	1,09 **	1,21 **	1,19 **	1,15 **	1,13 **	1,20 **

*: P =< 0,05; **: P =< 0,01

Fuente: Cálculos de los investigadores a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Página 100:

Cuadro 3.4. Relación de diversos factores con la agresión de la mujer a su cónyuge o compañero sin que haya habido agresión por parte de él inmediatamente antes. OR ajustadas, Colombia, 2005

Variable	Agresión física	Agresión verbal	Control del cónyuge
Residir en cabecera municipal	1,36 **	1,19 *	1,21 **
Región (Referencia Atlántica)			
Oriental	0,70 **	0,60 **	0,70 **
Central	0,88	0,69 **	0,78 **
Pacífica	0,88	0,73 **	0,80 **
Bogotá	0,80	0,67 **	0,69 **
Orinoquia/Amazonía	1,34 **	0,87	0,69 **
Edad mujer	0,97 **		
Edad cónyuge		0,99 **	0,99 **
Estrato económico social mujer	1,11 *	1,11 **	
Mujer trabajó último año o tiene trabajo remunerado			
Mujer víctima control por su pareja en la vida	1,47 **	1,52 **	1,60 **
Mujer víctima de amenazas por su pareja en la vida	1,66 **	1,42 **	1,25 **
Mujer víctima de amenazas por su pareja en el último año	0,74 **		
Mujer víctima de agresión física por su pareja en la vida	1,61 **	2,26 **	1,52 **

*: P =< 0,05; **: P =< 0,01

Fuente: Cálculos de los investigadores a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Página 101:

Cuadro 3.5. Factores asociados al hecho de que la mujer consulte los servicios de salud por las lesiones que generó la agresión recibida por su pareja en Colombia, 2005. OR e IC del 95%.

Variable	B*	Valor P	OR	IC 95% OR	
				Inferior	Superior
La mujer tiene trabajo remunerado	0,216	0,013	1,24	1,05	1,47
Víctima de amenaza por la pareja en la vida	0,530	<0,001	1,70	1,42	2,04
Edad de la mujer	0,030	<0,001	1,03	1,02	1,04
Aporte en los gastos por la mujer	0,059	0,035	1,06	1,00	1,12

*B: coeficiente de la regresión

Fuente: Cálculos de los investigadores a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

Página 102:

Cuadro 3.6. Factores asociados a que la mujer castigue físicamente a los menores de edad bajo su cuidado, Colombia, 2005. OR e IC del 95%

Variable	B*	Valor P	OR	IC 95% OR	
				Límite inferior	Límite superior
Regiones		<0,001			
Oriental	0,335	<0,001	1,40	1,25	1,57
Central	0,518	<0,001	1,68	1,52	1,86
Pacífica	0,587	<0,001	1,80	1,60	2,03
Bogotá	-0,151	0,035	0,86	0,75	0,99
Orinoquia y Amazonía	0,217	<0,001	1,24	1,11	1,39
La mujer tiene trabajo remunerado	-0,117	0,002	0,89	0,83	0,96
Mujer víctima de control en los últimos 12 meses	0,094	0,018	1,10	1,02	1,19
Mujer víctima de agresión física en la vida	0,268	<0,001	1,31	1,21	1,42
Mujer víctima de agresión sexual en la vida	0,131	0,034	1,14	1,01	1,29
Edad de la mujer	-0,027	<0,001	0,97	0,97	0,98
Nivel educativo de la mujer	-0,073	<0,001	0,93	0,89	0,97
Número de hijos con los que vive	0,106	<0,001	1,11	1,08	1,15

*B: coeficiente de la regresión

Fuente: Cálculos de los investigadores a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005.

6. Página 184:

Cuadro 6.1. Distribución de los residentes en los hogares colombianos mayores de 18 años según el auto-reporte de haber tenido o no relaciones sexuales. Colombia, 2007.

¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales?	Frecuencia	Porcentaje	IC 95%	
Sí	27448	92,2	91,0	93,3
No	1279	4,3		
No responde	1039	3,5		
Total	29762	100,0		

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

7. Página 184:


Cuadro 6.2. Edad de la población de estudio según sexo. Colombia, 2007.

Sexo	Mediana	Media	DS*	IC 95% Media	
Hombre	37,00	38,17	13,73	37,90	38,44
Mujer	37,00	38,64	13,45	38,24	39,04
Total	37,00	38,42	13,58	38,13	38,71

DS: Desviación estándar

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007


8. Página 185:



Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007.

Gráfico 6.1. Distribución de la población de estudio por sexo y departamento de Colombia, 2007.


9. Página 185:



Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007.

Gráfico 6.2. Distribución del estado civil entre la población de estudio por sexo. Colombia, 2007.

10. Página 186:



Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007.

Gráfico 6.3. Distribución del grupo étnico entre los hombres y las mujeres de la población de estudio. Colombia, 2007.

11. Página 186:

Cuadro 6.3. Distribución del aseguramiento en salud en la población de estudio. Colombia, 2007

Entidad aseguradora	Porcentaje
Seguro Social	6,3
Fuerzas Militares, Policía Nacional	1,9
ECOPETROL	0,1
Magisterio	2,0
Entidad promotora de salud (EPS) o adaptada diferente al ISS	33,2
Administradora del Régimen Subsidiado (ARS)	34,6
Otra entidad	1,9
Carta de desplazado o desmovilizado	0,3
Ninguna	18,6
No Sabe	1,1

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

12. Página 187:

Cuadro 6.4. Prevalencia de ITS en la población de estudio, de acuerdo con el antecedente del diagnóstico de ITS o la presencia de signos o síntomas de ITS. Colombia, 2007.

En el último año	Prevalencia ITS (%)	IC 95%
¿Le han diagnosticado a usted alguna infección de transmisión sexual?	0,8	0,7 - 0,9
¿Ha tenido signo o síntoma de alguna infección de transmisión sexual?	7,3	6,6 - 8,2
¿Ha tenido signo o síntoma o le han diagnosticado alguna infección de transmisión sexual?	8,1	7,3 - 8,9

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

13. Página 187:

Cuadro 6.5. Prevalencia de VIH por auto-reporte en la población que ha tenido relaciones sexuales. Colombia, 2007.

¿Un doctor u otro profesional de la salud, alguna vez le dijo que tiene una infección por VIH o SIDA?	Porcentaje	IC 95%
Sí	0,058	0,027-1,123
No	99,962	

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

14. Página 188:

Cuadro 6.6. Distribución porcentual de la forma cómo fue adquirida la última infección de transmisión sexual según sexo. Colombia, 2007.

Forma de transmisión	Sexo		Total %
	Hombre %	Mujer %	
Por relaciones sexuales con persona(s) infectadas	57,63	52,46	54,02
Por contacto con alguien infectado sin tener relación sexual	15,62	8,61	10,72
Por uso de baños públicos	1,70	3,64	3,05
Por uso de silla u objetos usados por alguien infectado	4,02	3,46	3,63
Por abuso sexual	0,00	0,48	0,33
Por descuido o desaseo personal	0,00	7,14	4,99
No sabe	21,03	24,21	23,26

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 188:

Cuadro 6.7. Prácticas efectuadas para prevenir la transmisión de la ITS a otras personas. Colombia, 2007.

Práctica efectuada		Sexo		Total %
		Hombre %	Mujer %	
Tomo o usó algún medicamento	Sí	87,9	95,6	93,3
	No	12,1	4,4	6,7
Dejó de tener relaciones sexuales	Sí	76,3	79,3	78,4
	No	23,7	20,7	21,6
Usó condón	Sí	25,6	32,4	30,1
	No	74,4	67,6	69,9
Buscó tratamiento o consejo	Sí	93,0	97,6	96,3
	No	7,0	2,4	3,7

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

15. Página 189:

Cuadro 6.8. Diagnóstico o signos o síntomas de ITS durante el último año según sexo y promedio de la edad. Colombia, 2007.

Diagnóstico o signos o síntomas de ITS durante el último año	Sexo	Porcentaje	Media de la edad	IC 95% de la media
Si	Hombre	27,7	39,76	38,07-41,46
	Mujer	72,3	35,68	34,90-36,46
No	Hombre	48,6	38,09	37,82-38,36
	Mujer	51,4	39,00	38,59-39,42

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

16. Página 190:

Cuadro 6.9. Distribución de infección por VIH según sexo y promedio de edad. Colombia, 2007.

¿Un doctor u otro profesional de la salud, alguna vez le dijo que tiene una infección por VIH o SIDA?	Sexo	Porcentaje	Media de la edad	IC95% de la media	
Si	Hombre	34,4	39,75	34,72	44,79
	Mujer	65,6	29,77	19,82	39,72
	Total	100,0	33,21	24,85	41,56
No	Hombre	46,9	38,18	37,91	38,46
	Mujer	53,1	38,63	38,24	39,03
	Total	100,0	38,42	38,13	38,71

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007.

17. Página 190:

Cuadro 6.10. Porcentaje de personas con auto-reporte de infección por virus de la hepatitis B según diagnóstico o signos o síntomas de ITS en el último año. Colombia, 2007.

Diagnóstico o signos o síntomas de ITS en el último año	Porcentaje con hepatitis B	IC95%	
Si	3,7	2,7	4,9
No	3,5	3,0	4,0
Total	3,5	3,1	4,0

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

18. Página 191:

Cuadro 6.11. Uso del preservativo en la primera o última relación sexual según diagnóstico o signos o síntomas de ITS en el último año. Colombia, 2007.

Sí usó condón	Diagnóstico o signos o síntomas de ITS en el último año				Total	
	Sí		No			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
En la primera relación sexual	17,00	15,0 - 19,2	18,40	17,5 - 19,4	18,30	17,4 - 19,2
En la última vez que tuvo relaciones sexuales	14,90	13,0 - 17,0	20,30	19,6 - 21,1	19,90	19,1 - 20,7

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

19. Página 191:

Cuadro 6.12. Uso del preservativo en la primera o última relación sexual según si un doctor u otro profesional de la salud alguna vez le dijo que tiene una infección por VIH o Sida. Colombia, 2007.

Sí usó condón	¿Un doctor u otro profesional de la salud, alguna vez le dijo que tiene una infección por VIH o SIDA?				Total	
	Sí		No			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
En la primera relación sexual	27,30	5,3-71,7	18,30	17,4-19,2	18,30	17,4-19,3
En la última vez que tuvo relaciones sexuales	15,60	2,5-57,4	19,90	19,1-20,7	19,90	19,1-20,7

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

20. Página 192:

Cuadro 6.13. Distribución de frecuencias del tipo de compañero de la última relación sexual según el reporte de ITS en el último año. Colombia, 2007.

Compañero(a) última relación sexual	Diagnostico o signos o síntomas de ITS en ultimo año				Total	
	Sí		No			
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Estable: esposo(a) / compañero(a), novio(a) / prometido(a)	78,2	75,5 - 80,7	77,3	76,2 - 78,4	77,4	76,3 - 78,4
Casual conocido(a) o desconocido(a)	21,4	18,9 - 24,1	22,2	21,1 - 23,3	22,1	21,0 - 23,3
Trabajador(a) sexual	0,4	0,2 - 0,8	0,5	0,4 - 0,7	0,5	0,4 - 0,6

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 192:

Cuadro 6.14. Distribución de frecuencias del tipo de compañero sexual en los últimos 6 meses según el reporte de ITS en el último año. Colombia, 2007.

Compañero(a) sexual en los últimos 6 meses	Diagnóstico, signos o síntomas de ITS en último año				Total	
	Sí		No			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Estable: esposo(a) / compañero(a), novio(a) / prometido(a)	19,1	13,1 - 27,0	9,4	7,4 - 11,8	10,2	8,2 - 12,6
Casual conocido(a) o desconocido(a)	75,8	68,1 - 82,2	87,7	84,8 - 90,1	86,7	83,9 - 89,1
Trabajador(a) sexual	5,1	2,5 - 10,3	2,9	2,1 - 4,0	3,1	2,3 - 4,2

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 193:

Cuadro 6.15. Edad de la primera relación sexual y número de compañeros sexuales en los últimos meses según reporte de ITS en el último año. Colombia, 2007.

Estadísticos	Edad en años cumplidos cuando tuvo su primera relación sexual		Número de compañeros sexuales en los ÚLTIMOS 6 MESES	
	Diagnóstico, signos o síntomas de ITS en último año		Diagnóstico, signos o síntomas de ITS en último año	
	No	Sí	No	Sí
Mínimo	11,0	11,0	1,0	1,0
Máximo	50,0	39,0	40,0	20,0
Mediana	17,0	17,0	2,0	2,0
Media	17,3	17,3	2,8	2,8
Desv. típica	3,5	3,5	3,3	2,3
IC 95%	17,2 - 17,4	17,1 - 17,5	2,7 - 2,9	2,4 - 3,2

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 193:

Cuadro 6.16. Consumo de licor o sustancias estimulantes en la última relación sexual según diagnóstico o signos o síntomas de ITS en el último año. Colombia, 2007.

Consumo en la última relación sexual	Diagnostico o signos o síntomas de ITS en ultimo año				Total	
	No		Sí			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Licor	7,1	6,7 - 7,6	7,3	5,8 - 9,08	7,1	6,7 - 7,6
Droga o estimulante	0,4	0,3 - 0,5	1,0	0,6 - 1,7	0,4	0,3 - 0,6

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007


Página 194:

Cuadro 6.17. Antecedente de consumo de sustancias psicoactivas entre quienes reportaron tener y no tener ITS. Colombia, 2007.

Consumo de sustancias psicoactivas	Diagnóstico, signos o síntomas de ITS en último año				Total	
	No		Sí			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Marihuana	24,2	21,2 - 27,4	29,8	25,8 - 34,1	24,6	21,8 - 27,8
Cocaína	19,2	16,4 - 22,3	24,8	18,3 - 32,6	19,7	16,8 - 22,9
Tranquilizantes	1,7	1,4 - 1,9	3,9	2,7 - 5,5	1,9	1,6 - 2,1
Inhalantes	1,7	1,5 - 2,1	3,1	2,3 - 4,0	1,9	1,6 - 2,2

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

23. Página 194:



Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

Gráfico 6.4. Distribución de la escolaridad entre quienes reportaron ITS y quienes no la reportaron. Colombia, 2007.


24. Página 195:

Cuadro 6.18. Frecuencia de las principales razones por las que se realiza la prueba para detectar el virus del SIDA entre quienes reportaron ITS y quienes no la reportaron. Colombia, 2007.

Razón para realizarse la prueba de VIH	ITS		Total %
	Sí %	No %	
Se lo sugirieron por el embarazo	47,9	34,1	35,5
Por curiosidad/ iniciativa propia	14,1	17,6	17,3
Se lo exigieron en el trabajo	6,9	16,1	15,1
El doctor se la ordenó	13,6	12,3	12,4
Se lo exigieron para donar sangre	5,5	9,1	8,7
Tenía dudas	9,8	6,7	7,0
Lo concertó con su pareja	0,8	2,0	1,8
Se la exigieron para un seguro de vida	0,3	1,0	0,9
Tenía síntomas extraños	1,1	0,7	0,8
Se lo exigió su pareja	0,1	0,5	0,5

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007


25. Página 196:



Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

Gráfico 6.5. Distribución comparativa de la afiliación a salud entre personas con ITS y sin ITS. Colombia, 2007.


26. Página 197:



Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

Gráfico 6.6. Distribución del auto-reporte positivo de ITS según la región geográfica de residencia. Colombia, 2007.

Página 197:



Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

Gráfico 6.7. Distribución de VIH auto-reportado según región geográfica de residencia. Colombia, 2007.

27. Página 198:

Cuadro 6.19. Proporción de personas con auto-reporte positivo de ITS por departamento. Colombia, 2007.

Región	Departamento	Auto-reporte de ITS* %
Atlántica	Atlántico	7,7
	Bolívar	20,7
	Cesar	9,3
	Córdoba	8,6
	La guajira	11,8
	Magdalena	14,5
	San Andrés	8,8
	Sucre	16,2
Oriental	Boyacá	6,0
	Cundinamarca	4,1
	Meta	7,9
	Norte de Santander	4,5
	Santander	8,1
Central	Antioquia	7,0
	Caldas	7,7
	Caquetá	12,4
	Huila	6,9
	Quindío	2,9
	Risaralda	8,7
	Tolima	8,4
Pacífica	Cauca	9,6
	Chocó	11,5
	Nariño	7,7
	Valle del cauca	8,4
Bogotá	Bogotá	5,5
Orinoquía y Amazonía	Amazonas	3,4
	Arauca	1,9
	Casanare	4,6
	Guainía	1,3
	Guaviare	12,0
	Putumayo	13,5
	Vaupés	12,1
	Vichada	12,0

Fuente: Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

*No corresponde a una distribución porcentual sino a la proporción de auto-reporte positivo de ITS en las personas encuestadas por departamento.

28. Página 208:

Cuadro 7.1. Tasas de mortalidad por cáncer en las Américas, según sexo. 2002

Región	Caribe		América Central		América del Sur		América del Norte	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Estómago	11,5	5,3	11,7	8,3	18,1		4,2	2,2
Pulmón	26	10	15,6	6,3	21,8	7,5	48,7	26,7
Cérvico uterino		16		15		12,9		2,3
Mama		12,7		10,5		15,1		19,2
Próstata	28		15,5		18		15,9	

Fuente: GLOBOCAN 2002.

29. Página 214:

Cuadro 7.2. Percepción del cáncer de cuello uterino por región en mujeres de 18-69 años. Colombia, 2007.

Región	No.	%	Percepción de CaCu *10000
Atlántica	4	7,8	2,5
Oriental	9	19,9	7,6
Central	18	38,5	10,0
Pacífica	5	10,5	4,1
Bogotá	9	20,0	7,8
Orinoquia y Amazonía	2	3,3	15,8
Total	46	100,0	6,7

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 214:

Cuadro 7.3. Distribución de las mujeres de 18-69 años que relataron percibir CaCu según asalariadas y no asalariadas por grupo étnico. Colombia, 2007.

Grupo étnico	Asalariada					
	Sí		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Indígena	0	0,0	4	100,0	4	16,4
Afrocolombiana	0	0,0	1	100,0	1	4,2
Ninguno de los anteriores	8	45,4	10	54,6	19	79,4
Total	8	36,0	15	64,0	23	100,0

Fuente: Colombia. Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 215:

Cuadro 7.4. Distribución por región de las mujeres de 18 a 69 años que percibieron tener CaCu según asalariadas y no asalariadas. Colombia, 2007.

Región	Asalariada					
	Sí		No		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	0	0,3	0	0,3	0	0,6
Oriental	3	12,5	4	16,6	7	29,0
Central	2	9,1	7	28,7	9	37,8
Pacífica	0	0,0	4	16,4	4	16,4
Bogotá	3	14,1	0	0,0	3	14,1
Orinoquia y Amazonía	0	0,0	0	2,0	0	2,0
Total	8	36,0	15	64,0	23	100,0

Fuente: Colombia. Ministerio de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 216:

Cuadro 7.5. Distribución de neoplasias intraepiteliales cervicales por grupo de edad en mujeres colombianas mayores de 12 años. Colombia, 2007.

Grupo de edad	NIC I		NIC II		NIC III		Displasia no especificada		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
12 a 19	771	69,5	90	8,1	53	4,8	196	17,7	1110	100
20 a 29	3357	66,4	479	9,5	404	8,0	815	16,1	5055	100
30 a 39	3170	61,7	496	9,7	608	11,8	865	16,8	5139	100
40 a 49	2436	59,6	397	9,7	472	11,5	784	19,2	4089	100
50 a 59	1000	60,2	167	10,0	223	13,4	272	16,4	1662	100
60 y más	422	50,9	106	12,8	172	20,7	129	15,6	829	100
Total	11156	62,4	1735	9,7	1932	10,8	3061	17,1	17884	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, RIPS 2007.

Página 216:

Cuadro 7.6. Neoplasias intraepiteliales cervicales según el régimen de aseguramiento en mujeres colombianas mayores de 12 años. Colombia, 2007.

Régimen de seguridad social	NIC I		NIC II		NIC III		Displasia no especificada		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Contributivo	4692	69,7	678	10,1	662	9,8	697	10,4	6729	100
Subsidiado	2808	52,1	610	11,3	652	12,1	1322	24,5	5392	100
Vinculado	3094	63,8	353	7,3	526	10,8	877	18,1	4850	100
Particular	270	66,3	49	12	34	8,4	54	13,3	407	100
Otro	292	57,7	45	8,9	58	11,5	111	21,9	506	100
Total	11156	62,4	1735	9,7	1932	10,8	3061	17,1	17884	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, RIPS-2007.

Página 217:

Cuadro 7.7. Distribución por región de las instituciones públicas que realizan actividades, programas o proyectos para incentivar la toma de citología de cuello uterino. Colombia. 2007.

Región	Hospitales y clínicas		Centros de salud		Puestos de salud		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	78	18	154	16,1	301	26,9	533	21,3
Bogotá	130	30	345	36	0	0	475	18,9
Central	69	15,9	201	21	228	20,4	498	19,9
Oriental	64	14,8	118	12,3	196	17,5	378	15,1
Orinoquia y amazonia	17	3,9	45	4,7	55	4,9	117	4,7
Pacífica	75	17,3	95	9,9	337	30,2	507	20,2
Total	433	17,3	958	38,2	1117	44,5	2508	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, Encuesta Nacional de Salud 2007.

Página 218:

Cuadro 7.8. Distribución por región de las instituciones privadas que realizan actividades, programa o proyectos para incentivar la toma de citología de cuello uterino. Colombia. 2007.

Región	Clínicas privadas con hospitalización		Centros de atención ambulatoria de EPS o ARS		Total	
	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	153	31,8	305	29,3	458	30,1
Bogotá	122	25,4	150	14,4	272	17,9
Central	78	16,2	202	19,4	280	18,4
Oriental	65	13,5	194	18,6	259	17
Orinoquia y amazonia	6	1,2	24	2,3	30	2
Pacífica	57	11,9	167	16	224	14,7
Total	481	31,6	1042	68,4	1523	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 218:

Cuadro 7.9. Distribución por región de los profesionales de salud independientes registrados en el sistema de habilitación que realizan o participan en acciones, proyectos o programa para incentivar la toma de citología de cuello uterino. Colombia. 2007.

Región	Profesionales de salud registrados	
	No.	%
Atlántica	4468	26,9
Bogotá	1999	12
Central	4230	25,5
Oriental	2856	17,2
Orinoquia y amazonia	339	2
Pacífica	2704	16,3
Total	16596	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, Encuesta Nacional de Salud 2007.

Página 219:

Cuadro 7.10. Distribución por región de las aseguradoras del régimen contributivo y subsidiado que tienen población cubierta y que realizan o participan en acciones, proyectos o programa para incentivar la toma de citología de cuello uterino. Colombia. 2007.

Región	Aseguradoras Reg. Contributivo		Oficinas de Atención al usuario del Reg. Contributivo		Aseguradoras Reg. Subsidiado	
	No.	%	No.	%	No.	%
Atlántica	234	25,6	141	28,2	259	32,6
Bogotá	15	1,6	15	3	11	1,4
Central	240	26,3	111	22,2	174	21,9
Oriental	257	28,1	132	26,4	196	24,7
Orinoquia y amazonia	38	4,2	24	4,8	41	5,2
Pacífica	129	14,1	77	15,4	114	14,3
Total	913	100	500	100	795	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 220:

Cuadro 7.11. Distribución por grupo de edad de las mujeres cuya principal razón de la última consulta fue la citología. Colombia, 2007.

Grupo de edad	No.	%
12 a 17	8	1,5
18 a 24	84	16,1
25 a 34	161	31
35 a 44	156	30
45 a 54	91	17,5
55 a 69	21	4
Total	520	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 220:

Cuadro 7.12. Distribución por región de las mujeres cuya principal razón de la última consulta fue la citología. Colombia, 2007.

Región	No.	%
Atlántica	84	16,2
Oriental	83	15,9
Central	115	22,2
Pacífica	129	24,8
Bogotá	102	19,6
Orinoquia y Amazonía	7	1,4
Total	520	100

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, Encuesta Nacional de Salud 2007

Página 222:

Cuadro 7.13. Tiempo transcurrido por región después del examen citológico para reclamar el resultado. Colombia, 2007.

¿Cuándo debe volver a consulta para conocer el resultado del examen?						
Región	Tiempo	Media	Mediana	Percentil 25	Percentil 75	Desviación típica
Atlántica	Días	9,6	8	5	15	5,7
	Meses	1,3	1	1	2	0,5
	Total	9,5	8	5	15	5,7
Oriental	Días	12,9	10	8	20	4,9
	Meses	1,1	1	1	1	0,2
	Total	9,4	10	1	15	6,8
Central	Días	10,6	8	5	15	6,8
	Meses	1,1	1	1	1	0,3
	Total	9,3	8	2	15	7,1
Pacífica	Días	14	15	8	20	6,2
	Meses	1,1	1	1	1	0,3
	Total	12,6	15	8	20	7,1
Bogotá	Días	12,6	15	8	15	5,2
	Meses	1,1	1	1	1	0,5
	Total	10,7	10	8	15	6,4
Orinoquia y Amazonía	Días	14,9	15	15	20	4,4
	Meses	1	1	1	1	0
	Total	11,5	15	1	15	7,1

Fuente: Colombia, Ministerio de la Protección Social, Encuesta Nacional de Salud 2007