

¡PIENSE EN LEPTOSPIROSIS!!

Si su paciente presenta enfermedad febril aguda con cefalea, mialgias (dolor en pantorrillas y dolor lumbar predominantemente) y artralgias asociadas a cualquiera de los siguientes síntomas:

Náuseas



Vómito



Erupción e ictericia



Anuria, oliguria y proteinuria



Hemorragias (intestinal, pulmonar)



- falla respiratoria
- irritación meníngea



Dolor abdominal y diarrea



Sufusión conjuntival (pequeñas zonas hemorrágicas en la conjuntiva)



Arritmia o insuficiencia cardíaca



Con antecedentes de contacto directo con aguas estancadas, nadar en pozos ó ríos, o indicios de contaminación de alimentos o agua para consumo humano con orina de roedores

...PIENSE EN LEPTOSPIROSIS

Un caso clínico altamente compatible con leptospirosis debe ser manejado como tal, aunque el paciente **NO refiera el antecedente epidemiológico de riesgo...recuerde que Colombia es un país endémico para leptospirosis y el contacto con la bacteria pudo no haber sido detectado por el paciente**

En cualquier paciente que reconsulte a su institución por un cuadro febril persistente sin causa clara con deterioro clínico indague a profundidad los antecedentes epidemiológicos mencionados para configurar un caso sospechoso.

Recuerde que leptospirosis es el principal diagnóstico diferencial de dengue. Cuando su paciente con un cuadro probable de dengue no responda de forma satisfactoria al manejo médico...**PIENSE EN LEPTOSPIROSIS**

Otros diagnósticos diferenciales que usted debe tener en cuenta son: malaria, hepatitis A, influenza, fiebre amarilla, salmonelosis. Administre el tratamiento con un diagnóstico presuntivo sin esperar la confirmación por laboratorio

... Recuerde que la leptospirosis responde muy bien al tratamiento antibiótico temprano

Tome una muestra de suero para el diagnóstico por laboratorio, solicitando la prueba de tamizaje de ELISA para leptospirosis y no olvide tomar una segunda muestra de suero con intervalo de 15 días. Avise a epidemiología para realizar seguimiento al paciente y asegurar la segunda toma.

No olvide que la leptospirosis es una enfermedad de notificación obligatoria. Si tiene alguna inquietud consulte el Protocolo de Vigilancia de Leptospirosis publicado por el Instituto Nacional de Salud en <http://www.ins.gov.co/?idcategoria=39013>