


| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | Página 1 de 44 |

Violencia de género

INFORME DEL EVENTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLOMBIA, PERIODO EPIDEMIOLÓGICO XIII, 2015.

Natalia Gutiérrez Bolívar

Equipo Funcional Enfermedades Crónicas no Transmisibles

Grupo Enfermedades Crónicas

Subdirección de Prevención, Vigilancia y Control en Salud Pública


Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública

1. INTRODUCCIÓN

Es reconocido socialmente que la violencia, manifestada a través de diversas modalidades, es una de las principales causas que afectan la vida social y el estado de salud de las poblaciones, de ahí que su afrontamiento con medidas para disminuir sus altos índices de incidencia es una de las prioridades de la agenda pública [1].

A la génesis de la violencia se atribuyen distintos factores tanto de orden estructural como coyuntural, lo que conlleva al acuerdo sobre la multicausalidad y por ende la complejidad de estos eventos, lo que exige un detenido estudio del fenómeno con el ánimo de construir intervenciones realmente efectivas o que muestren impacto en términos de prevención o minimización del daño [1].

Dentro del análisis de las distintas formas de violencia interpersonal, se dedica un lugar especial a la observación de las agresiones, si se pueden llamar primarias, que sufren los seres humanos y que ocurren en el escenario básico de socialización como lo es la familia, donde se

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | Página 2 de 44 |

Violencia de género

perpetran un número significativo de violencias de tipo físico, psicológico, sexual o por privación y negligencia cuyas repercusiones en la psicodinámica de las víctimas, puede incluso ser aún más profunda dada la calidad de los victimarios, quienes a su vez son las personas a quienes la sociedad les ha delegado la tarea de desarrollar el rol del cuidado y la protección de sus generaciones y de quien se espera un vínculo de sangre y/o de afecto con sus víctimas [2].


Por lo tanto, el Instituto Nacional de Salud (INS) adoptó, desarrolló e implementó el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia de género, bajo el entendido que este es un evento de interés en salud, que puede ser intervenido con el ánimo de empezar a cortar el círculo vicioso de personas maltratadas, que solo aprenden esta forma de interacción social y que en futuro serán unos potenciales maltratadores, así mismo en las distintas formas de violencia contra la mujer y la violencia sexual.

A continuación se presenta la caracterización de los casos de violencia atendidos por el sector salud notificados hasta la semana 52 del año 2015.

1.1 Comportamiento del evento a nivel mundial

El análisis integral de la violencia debe empezar por definir las diversas formas que esta adopta con el fin de facilitar su medición. Hay muchas maneras posibles de definir la violencia. **La Organización Mundial de la Salud** la define como: *“El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones o muerte”*.

La clasificación según la Organización Mundial de la Salud (OMS), divide la violencia en tres tipos los cuales son: violencia auto infligida, violencia interpersonal y violencia colectiva. La violencia interpersonal se subdivide a la vez en violencia intrafamiliar o de pareja siendo esta, la violencia que se produce entre los miembros de la familia o la pareja y por lo general sucede en el hogar, ejemplo maltrato a menores, violencia contra la pareja, ataque sexual por personas

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | |

Violencia de género


conocidas y maltrato de las personas mayores. La violencia de la comunidad o comunitaria es la que se produce entre personas que no guardan parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.

La génesis de la violencia se atribuye a distintos factores tanto de orden estructural como coyuntural; para el año 2000 se encontró que en cada año más de 1,6 millones de personas pierden la vida y otra cantidad no determinada sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia auto infligida, interpersonal o colectiva, siendo la violencia en general una de las principales causas de muerte en todo el mundo para la población de 15 a 44 años de edad.

Una de las formas de violencia de género es la "violencia contra las mujeres" que abarca muchas formas de violencia, incluida la violencia por parte de su pareja (violencia de pareja) y violaciones / asalto sexual y otras formas de violencia sexual perpetradas por alguien que no sea su pareja, así como la mutilación genital femenina y la trata de mujeres.

Más de un tercio de la población mundial de mujeres es afectada por la violencia física o sexual, encontrando que un 30% de las mujeres sufren violencia sexual por su pareja o ex pareja. El impacto de la violencia en las mujeres puede tener el doble de la probabilidad de sufrir depresión, problemas con uso de licor o sustancias psicoactivas, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos y niños con bajo peso al nacer, además el 42% de ellas sufren lesiones físicas moderadas y severas, el 30% son víctimas fatales de la agresión por su pareja o ex pareja [3].

La estimación de prevalencia de mayor a menor a nivel mundial fue sureste de Asia con 37,7%, Mediano Oriente con 37%, África con 36,6%, Latinoamérica con 29,8%, Europa Oriental con 25,4%, Lejano Oriente con 24,6% y los países de ingresos altos con 23,2%; el quinquenio de edad con mayor prevalencia en este revisión fue 40 a 44 años con un 37,8% y en el grupo de edad de 15 a 44 fue de 33,1% [4].

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | |

Violencia de género

1.2 Comportamiento del evento en América

La violencia que alcanza niveles récord en América Latina es a la vez producto de las transformaciones políticas recientes, de las desigualdades generadas por el crecimiento económico pero también de una cultura de la violencia de larga data, señalan diferentes analistas.


A pesar del fin de varios conflictos civiles en estos últimos años (Guatemala, El Salvador) o de la caída de su intensidad (Colombia, Perú), muchos países y ciudades del continente figuran a la cabeza de las listas que miden los homicidios en el mundo.

Lejos delante de países como Afganistán e Irak, Honduras y El Salvador ocupan los primeros lugares de esa funesta clasificación.

En Honduras, la tasa de homicidios es diez veces superior a la media mundial, y en 2012 ascendió a 85,5 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes, según un reciente informe de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH, pública).

Al igual que El Salvador (69 muertes violentas por año por cada 100.000 habitantes en 2011, según la ONU), ese pequeño país de América Central sufre la delincuencia de las llamadas “maras”, bandas criminales que reclutan jóvenes en los barrios pobres de las grandes ciudades que colaboran con grupos criminales mexicanos. Padecen asimismo la debilidad de las autoridades públicas, la corrupción policial endémica y una justicia inoperante.

“En los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) a las causas tradicionales de la violencia se agrega la frágil institucionalidad de los Estados, las policías permeadas por el crimen y los amplios niveles de impunidad”, afirma Jannet Aguilar, universitaria y responsable de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ).

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | Página 5 de 44 |

Violencia de género

La ciudad que la mayor parte de las estadísticas consideran la más violenta del mundo es San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con no menos de 173,6 homicidios por cada 100.000 habitantes cada año. Destronó hace dos años a Ciudad Juárez, la ciudad mexicana famosa por ser a la vez escenario de una ola de asesinatos de mujeres y enfrentamientos entre cárteles de narcotraficantes.

Además de la violencia emprendida por las guerrillas, las bandas criminales y los cárteles de traficantes, también existe en América Latina una violencia cotidiana: criminalidad en los barrios pobres de las grandes ciudades, violencia contra las mujeres en América Central, conflictos por la propiedad de la tierra en Brasil y Paraguay, motines y asesinatos en las cárceles venezolanas, brutalidad en los conflictos sociales en Bolivia y Argentina, abusos y prepotencia policial en Chile, etc.


Para el universitario peruano, esta cultura de recurrir a la violencia es también “consecuencia de la disociación entre las instituciones y la cultura cotidiana callejera”.

Finalmente, Mazzitelli, señala un último aspecto que a su juicio es necesario destacar: “En la mayoría de los países latinoamericanos existe una cultura machista del hombre fuerte y viril que a menudo implica la posesión de un arma”, a veces muy fácil de conseguir (como en América Central, México, Brasil y Colombia).

Tanto en las favelas brasileñas y venezolanas como en el campo paraguayo y colombiano, en México, América Central y la Amazonia, los conflictos terminan muchas veces en baño de sangre [5].

1.3 Comportamiento del evento en Colombia

En Colombia, según el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, el Sivigila (Instituto Nacional de Salud, 2012) recepciona información relacionada con la violencia intrafamiliar y sexual. Durante el año 2012 fueron reportados al Sivigila 63.256 casos de violencia intrafamiliar; de los cuales el 40% corresponde a violencia física y el 26% a privación y negligencia. Mientras que fue baja la notificación de los casos de violencia sexual, con un 16% cabe resaltar que quienes

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | |


Violencia de género

han sufrido violencia física, también han sido objeto de violencia psicológica y que quienes han sido violentados sexualmente han sido objeto de violencia física y psicológica.

Según Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante el año 2014, en Colombia recibió 25.225 casos por muertes violentas, el menor número de registros de la década; comparado con el año inmediatamente anterior se observó una disminución del 5% en las muertes violentas registradas. En la última década (2005-2014) se han registrado 279.565 casos, siendo el año 2010 donde se registró mayor número de muertes con un total de 29.962 casos. La tasa más alta de muertes violentas por cada 100.000 habitantes de la década se presentó en el año 2005 con un valor de 66,36 y la tasa más baja se presentó en el año 2014 con un valor de 52,92.

En cuanto a la violencia intrafamiliar con respecto a 2013, hubo una reducción de 24.246 casos, equivalente al 15,26%. La tasa por 100.000 habitantes fue de 282,31, con 379,10 lesionados por cada 100.000 hombres y 187,91 lesionadas por cada 100.000 mujeres. Estas tasas son estadísticamente más bajas que las registradas en 2013; la tasa de 2014 es una de las más bajas de la última década con registros inferiores a esta tasa solo en 2005 y 2006; La edad promedio de las víctimas de violencia interpersonal fue de 30,7 años, un poco mayor en hombres (30,9 años) que en mujeres (30,3). La edad más frecuente de victimización fue la de 17 años. La mayor proporción de lesionados (18,70%) se presenta para los dos géneros entre los 20 y 24 años, situación que ha permanecido constante en los últimos años; Se pudo establecer el estado conyugal de las víctimas en el 90,32% de los casos (se excluyeron del análisis 11.471 casos sin información y 1.555 casos que no aplican por la edad); de estos, más de la mitad correspondía a personas sin ninguna relación de pareja (53,79%), fenómeno que ha permanecido invariable en los últimos años; proporcionalmente las mujeres separadas y viudas, son agredidas con mayor frecuencia que sus equivalentes masculinos [6].

Es posible que la información sobre violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia sexual en Colombia presenta altos índices de subregistro, a juzgar por los reportes oficiales, contrastados con los pocos datos de la Encuesta Nacional de Salud en cuanto a victimización

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | |


Violencia de género

por estas causas. Según esta última encuesta correspondiente al 2010 la proporción de mujeres que han sido forzadas físicamente por el esposo, compañero a tener relaciones o actos sexuales, en el grupo de edad de 15 a 49 años asciende al 9.7%. La proporción de mujeres que han sido forzadas físicamente por otra persona diferente a su esposo y pareja a tener relaciones o actos sexuales para ese mismo grupo de edad equivale a un 5.7%. La proporción de mujeres entre 15 y 49 años que han experimentado alguna violencia física por una persona diferente al esposo o compañero es de 13,9% y la proporción de mujeres entre 15 y 49 años alguna vez unidas que han experimentado alguna violencia física por parte del esposo o compañero representa un 27.7%

Las diferencias en los indicadores, solo contrastando estas dos fuentes permite confirmar el subregistro de los diferentes tipos de violencia, el cual puede ser explicado por variadas causas, entre las que más se destacan el desconocimiento de los derechos por parte de las víctimas, la poca credibilidad en las instituciones y la persistencia de imaginarios sobre lo privado de la violencia intrafamiliar. Por ello el INS ha entendido la importancia del diseño e implementación de un sistema de vigilancia riguroso, confiable, sostenible y con la vocación de integrarse y articularse con otros sistemas para construir cifras más veraces y permitir el adecuado seguimiento a las acciones del Estado para garantizar el restablecimiento del derecho a las víctimas.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar el cumplimiento de los procesos de notificación, seguimiento, y clasificación de los casos de violencia de género, establecer la frecuencia y distribución de morbilidad y medir la mortalidad registrada para este evento en el país, determinar los indicadores de seguimiento del evento por región.

| | | | |
|---|---|------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | Página 8 de 44 |

Violencia de género

3. METODOLOGÍA

Se realizó un **informe descriptivo retrospectivo** de los hallazgos encontrados mediante la notificación al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) del evento de Violencia de género en el país en el periodo epidemiológico XIII del año 2015.


La **población en estudio** fue la población general de Colombia.

Las variables que se trabajaron fueron: las que contempla la ficha de notificación de datos básicos como sexo, área de residencia, tipo de régimen en salud y grupo poblacional, así como las variables de la ficha de datos complementarios como tipo de violencia, relación con agresor (familiar, no familiar, grupos), arma utilizada para la agresión, atención realizada ante la violencia de nivel nominal; edad nivel razón.

Para la **recolección de los datos** se revisó cada una de las variables frente a la calidad de los datos reportados identificando los errores de digitación y los errores de consistencia de la información. Se identificaron campos vacíos, se verificó el tipo de documento con la edad, el sexo con el nombre del paciente, los datos de identificación con el nombre de la víctima, condición final de la ficha de datos básicos, la fecha de defunción.

Se aclara que la combinación de ciertas variables recaudadas, como el tipo de agresor y la edad de las víctimas permitirá la descripción y análisis de las diferentes tipologías violentas como maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes, la violencia de pareja o contra el adulto mayor.

Se notificaron al sistema de vigilancia 75611 casos de violencia de género. Una vez depurada la base de datos se descartan 793 casos duplicados y repetidos, y 904 con ajuste D descartados por la entidad territorial obteniendo **73914** registros lo que corresponde a un 97,75%.

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | |

Violencia de género

Los casos notificados al sistema ingresan como sospechosos, no requiriendo ajustes para su confirmación o descarte debido a que este proceso es resultado de las investigaciones judiciales y/o de los órganos competentes.

Plan de análisis: los datos obtenidos (Datos Originales) se organizaron en frecuencias absolutas, frecuencias relativas y distribución de frecuencias, presentados en tablas y gráficas. Se midió con incidencia tipo proporción. Se evaluó el comportamiento y la tendencia de las modalidades de la violencia en cuanto a las variables contempladas en la ficha de notificación de datos básicos y complementarios del evento de código INS 875. Se buscó establecer diferencias estadísticas entre las variables de interés utilizando (riesgo relativo y sus respectivos intervalos de confianza del 95%).

Consideraciones éticas: Según la resolución N° 008430 de 1993: Normas científicas técnicas y administrativas para la investigación en Salud, En su Artículo 11, expresa que esta investigación no tiene riesgos debido a que es un proyecto documental retrospectivo, que no interviene en variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de la población en estudio. Se garantizará la confidencialidad de los datos los cuales serán solo utilizados con fin científico y se preservará el anonimato de las víctimas.

4. HALLAZGOS

4.1. Comportamiento de la notificación

En el marco de la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica que permita determinar el comportamiento de la violencia de género, mediante su detección oportuna en el territorio nacional, se está realizando desde el Instituto Nacional de Salud la notificación del evento según el protocolo de vigilancia específico. En ese sentido es importante resaltar los siguientes hallazgos durante el XIII periodo epidemiológico del año 2015.

Hasta el XIII periodo epidemiológico del 2015 se evidenció notificación de casos de violencia de género en las 36 entidades territoriales e igualmente ocurre al revisar puntualmente niñas, niños


Violencia de género

y adolescentes. Además se realizó notificación de violencia de género en el **83,6% (938/1122)** de los municipios del país. En niños, niñas y adolescentes hubo notificación en el **83,6% (889/1122)** de los municipios.

Se halló notificación de **2917** unidades primarias generadoras de datos en el registro general y en niños, niñas y adolescentes fueron **2571**.

El promedio semanal de casos de violencia fue de 1421. En las semanas 36, 38, 37 Y 39 se notificaron el mayor número de casos para el evento con un promedio de 1605, 1592, 1566 Y 1566 casos respectivamente, se observó un incremento de la notificación al mismo periodo con respecto al año 2014 del 19,6% (ver gráfico 1).


Gráfica 1. Notificación de violencia de género por semana epidemiológica en Colombia, periodo XIII, 2013-2014-2015



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2014-2015.

4.2 Magnitud en lugar y persona (datos básicos)

Hasta el XIII periodo epidemiológico de 2015 en Colombia, se notificaron 73914 casos para el evento de violencia de género a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud (INS).

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | Página 11 de 44 |

Violencia de género

Estos eventos afectan mayormente a las mujeres que a los hombres, con una proporción de 78,2% (57815/73914) y 21,8% (16099/73914) respectivamente.

De acuerdo con el área de ocurrencia, la categoría que tuvo la mayor representatividad en frecuencia de distribución porcentual fue la cabecera municipal con 75,6% (55862/73914), seguida rural disperso y centro poblado. Al revisar los datos de notificación correspondientes al tipo de afiliación al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), se observó que la mayor distribución porcentual de los casos notificados, se encontró en el régimen subsidiado aporta el 59.5% (43976/73914), seguido del régimen contributivo 31,0% (22929/73914). Según la pertenencia étnica se observa que la mayor proporción de las víctimas de violencia se concentra en el grupo otro con un 92,1% (68041/73914), seguido de negro, mulato, afrocolombiano e indígena (ver tabla 1).

Tabla 1. Distribución de los casos de violencia de género, por sexo, área de ocurrencia, tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y pertenencia étnica, notificados en Colombia, periodo XIII, 2015

| Variable | n | % | Incidencia por 100.000 hab. | RR | IC |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| Sexo | | | | | |
| Mujeres | 57815 | 78,2 | 236,911 | 3,5 | 3,44 3,56 |
| Hombres | 16099 | 21,8 | 67,64 | Referencia | |
| Área de Ocurrencia | | | | | |
| Casos | | | | | |
| Cabecera municipal | 55862 | 75,6 | 151,61 | Referencia | |
| Rural disperso | 18052 | 24,4 | 158,96 | 1.05 | 1,03 1,07 |
| Seguridad social | | | | | |
| Casos | | | | | |
| Subsidiado | 43976 | 59,5 | | | |
| Contributivo | 22929 | 31,0 | | | |
| No asegurado | 5223 | 7,1 | | | |
| Especial | 1065 | 1,4 | | | |
| Excepción | 721 | 1,0 | | | |
| Pertenencia Étnica | | | | | |
| Casos | | | | | |
| Otro | 68041 | 92,1 | | | |
| Negro, mulato, afrocolombiano | 3318 | 4,5 | | | |
| Indígena | 2019 | 2,7 | | | |
| ROM, gitano | 399 | 0,5 | | | |
| Raizal | 115 | 0,2 | | | |
| Palenquero | 22 | 0,0 | | | |
| Total | 73914 | 100,0 | | | |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Violencia de género

4.3 Comportamiento de otras variables de interés (datos complementarios)

Es necesario precisar que en relación a grupos poblacionales una persona puede tener criterio para estar en más de uno de estos. De esta manera el 89,5% (66121/73914) pertenece a otros grupos poblacionales u otras actividades, seguido de las amas de casa con el 23,1% (17042/73914), gestantes con el 6,8% (5027/73914) y en cuarto lugar mujer cabeza de familia con el 6,3% (4657/73914), con menos frecuencia se presenta en la población Psiquiátrica, Migrantes, madres comunitarias, desmovilizados (as) (ver tabla 2).

Tabla 2. Distribución de la violencia de género por grupo poblacional y/o actividad en Colombia, periodo XIII, 2015

| Grupo | Mujer | Hombre | Total | Porcentaje |
|--|--------------|--------------|---------------|------------|
| Otros | 50767 | 15354 | 66121 | 89,5 |
| Ama (o) de casa | 16726 | 316 | 17042 | 23,1 |
| Gestantes | 5027 | 0 | 5027 | 6,8 |
| Mujer cabeza de familia | 4488 | 169 | 4657 | 6,3 |
| Campeño (a) | 2246 | 765 | 3011 | 4,1 |
| Víctimas de violencia (conflicto armado) | 2177 | 386 | 2563 | 3,5 |
| Desplazados | 1000 | 193 | 1193 | 1,6 |
| Consumo de SPA | 555 | 152 | 707 | 1,0 |
| Discapacitados | 410 | 170 | 580 | 0,8 |
| Población SCBF | 333 | 132 | 465 | 0,6 |
| Carcelarios- privado de la libertad | 163 | 137 | 300 | 0,4 |
| LGTBI | 174 | 79 | 253 | 0,3 |
| Trabajo Sexual | 192 | 21 | 213 | 0,3 |
| Indigentes | 143 | 54 | 197 | 0,3 |
| Psiquiátricos | 142 | 36 | 178 | 0,2 |
| Migrantes | 105 | 45 | 150 | 0,2 |
| Madres comunitarias | 140 | 0 | 140 | 0,2 |
| Desmovilizados | 78 | 25 | 103 | 0,1 |
| Total | 84866 | 18034 | 102900 | - |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.


Por la complejidad del acto violento, no es posible encontrarlo en formas “puras”, es decir que la violencia física o sexual no se acompañe de afectaciones psicológicas. Para facilitar el abordaje se han generado clasificaciones donde se busca el tipo de violencia que mayor daño haya causado a la víctima en el momento de la atención, evidenciando que los eventos de violencia reportados por el sector salud corresponde en orden de incidencia a agresiones de tipo físico las cuales representan el 50,0% de los registros, la violencia sexual el 23,9%, la violencia por

Violencia de género

negligencia y abandono en el 19,5% y la violencia psicológica 6,6%; aunque se ubique en cuarto lugar, no implica que sea un fenómeno de menor gravedad.

Comparando con el año anterior se registró un aumento de la notificación del 19,6%, pasando de 61818 a 73914 casos (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Comparación de los hechos de violencia de género según tipo de violencia en Colombia, periodo XIII, 2014-2015



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2014-2015.

Frente al reporte de tipo de caso del evento violencia de género se presentó registro en el 100% de los casos. Por departamento de procedencia los que presentaron mayor frecuencia fueron en su orden Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Bogotá y Cundinamarca que en conjunto representan el 48,2% del total de la notificación (ver tabla 3).

Violencia de género

Tabla 3. Distribución de los casos de violencia de género por tipo de lesión según departamento del hecho, notificados en Colombia, periodo XIII, 2015

| ENTIDAD TERRITORIAL | Violencia Física | Violencia sexual | Negligencia y abandono | Violencia Psicológica | Total general | % |
|----------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| ANTIOQUIA | 5504 | 3230 | 401 | 1165 | 10300 | 13,9 |
| VALLE DEL CAUCA | 5309 | 2131 | 612 | 351 | 8403 | 11,4 |
| SANTANDER | 1805 | 789 | 5258 | 191 | 8043 | 10,9 |
| BOGOTA | 1439 | 967 | 1598 | 793 | 4797 | 6,5 |
| CUNDINAMARCA | 2614 | 530 | 291 | 641 | 4076 | 5,5 |
| HUILA | 1410 | 838 | 774 | 592 | 3614 | 4,9 |
| NARIÑO | 1663 | 883 | 274 | 179 | 2999 | 4,1 |
| BOYACA | 1967 | 409 | 268 | 170 | 2814 | 3,8 |
| NORTE SANTANDER | 1144 | 468 | 855 | 60 | 2527 | 3,4 |
| CALDAS | 1719 | 449 | 210 | 45 | 2423 | 3,3 |
| CASANARE | 342 | 333 | 1254 | 46 | 1975 | 2,7 |
| CAUCA | 1020 | 680 | 181 | 37 | 1918 | 2,6 |
| RISARALDA | 908 | 424 | 512 | 51 | 1895 | 2,6 |
| CESAR | 821 | 627 | 243 | 18 | 1709 | 2,3 |
| CORDOBA | 892 | 532 | 154 | 48 | 1626 | 2,2 |
| META | 717 | 419 | 389 | 21 | 1546 | 2,1 |
| SUCRE | 908 | 377 | 106 | 16 | 1407 | 1,9 |
| BOLIVAR | 697 | 445 | 227 | 17 | 1386 | 1,9 |
| ATLANTICO | 845 | 380 | 49 | 46 | 1320 | 1,8 |
| QUINDIO | 766 | 228 | 56 | 178 | 1228 | 1,7 |
| TOLIMA | 667 | 351 | 119 | 30 | 1167 | 1,6 |
| CARTAGENA | 385 | 470 | 40 | 24 | 919 | 1,2 |
| GUAJIRA | 779 | 110 | 10 | 3 | 902 | 1,2 |
| CAQUETA | 657 | 188 | 28 | 12 | 885 | 1,2 |
| BARRANQUILLA | 406 | 281 | 20 | 48 | 755 | 1,0 |
| MAGDALENA | 474 | 177 | 58 | 7 | 716 | 1,0 |
| PUTUMAYO | 300 | 251 | 73 | 8 | 632 | 0,9 |
| ARAUCA | 149 | 183 | 194 | 1 | 527 | 0,7 |
| STA MARTA D.E. | 238 | 131 | 15 | 9 | 393 | 0,5 |
| VICHADA | 121 | 40 | 25 | 23 | 209 | 0,3 |
| CHOCO | 58 | 105 | 35 | 6 | 204 | 0,3 |
| AMAZONAS | 45 | 112 | 36 | 4 | 197 | 0,3 |
| GUAVIARE | 55 | 67 | 18 | 1 | 141 | 0,2 |
| GUAINIA | 54 | 21 | 18 | 0 | 93 | 0,1 |
| EXTERIOR | 15 | 40 | 26 | 3 | 84 | 0,1 |
| SAN ANDRES | 21 | 18 | 6 | 1 | 46 | 0,1 |
| VAUPES | 32 | 5 | 1 | 0 | 38 | 0,1 |
| Total general | 36946 | 17689 | 14434 | 4845 | 73914 | 100,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

En cuanto a la proporción de incidencia de la notificación de casos de violencia por 100.000 habitantes, se encontró que los departamentos con este indicador más alto fueron Casanare, Santander, Huila, Vichada, y Amazonas. Para violencia física Vichada, Caldas y Boyacá. Para violencia psicológica Huila, Vichada y Quindío. Para negligencia y abandono Casanare, Santander, y Arauca. Para violencia sexual Amazonas, Casanare y Putumayo. La proporción

Violencia de género

de incidencia nacional general del evento fue de 153,34 x 100.000 habitantes y fue superada por el 55,5% (20/36) de entidades territoriales. Para violencia física fue de 76,65, para violencia sexual fue de 36,70, para negligencia y abandono fue de 29,94 y para violencia psicológica fue de 10,05 x 100.000 habitantes y (ver tabla 4).

Tabla 4. Proporción de incidencia por tipo de violencia para cada departamento de la violencia de género en Colombia, periodo XIII, 2015

| Entidad territorial | Violencia Física | Violencia sexual | Negligencia y abandono | Violencia Psicológica | Incidencia x 100.000 hab. |
|---------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| CASANARE | 95,94 | 93,41 | 351,77 | 12,90 | 554,03 |
| SANTANDER | 87,58 | 38,28 | 255,11 | 9,27 | 390,23 |
| HUILA | 122,10 | 72,57 | 67,03 | 51,27 | 312,96 |
| VICHADA | 168,12 | 55,58 | 34,73 | 31,96 | 290,38 |
| AMAZONAS | 59,02 | 146,90 | 47,22 | 5,25 | 258,38 |
| CALDAS | 173,99 | 45,45 | 21,26 | 4,55 | 245,25 |
| GUAJIRÁ | 130,18 | 50,62 | 43,39 | 0,00 | 224,19 |
| BOYACÁ | 154,10 | 32,04 | 21,00 | 13,32 | 220,46 |
| QUINDÍO | 135,50 | 40,33 | 9,91 | 31,49 | 217,23 |
| ARAUCA | 56,80 | 69,76 | 73,96 | 0,38 | 200,90 |
| RISARALDA | 95,38 | 44,54 | 53,78 | 5,36 | 199,06 |
| NORTE SANTANDER | 84,38 | 34,52 | 63,06 | 4,43 | 186,39 |
| CAQUETA | 137,55 | 39,36 | 5,86 | 2,51 | 185,29 |
| PUTUMAYO | 86,91 | 72,71 | 21,15 | 2,32 | 183,08 |
| VALLE DEL CAUCA | 115,07 | 46,19 | 13,26 | 7,61 | 182,13 |
| NARIÑO | 95,34 | 50,62 | 15,71 | 10,26 | 171,94 |
| CESAR | 79,79 | 60,94 | 23,62 | 1,75 | 166,10 |
| SUCRE | 106,63 | 44,27 | 12,45 | 1,88 | 165,23 |
| META | 74,58 | 43,59 | 40,46 | 2,18 | 160,82 |
| ANTIOQUIA | 85,25 | 50,03 | 6,21 | 18,04 | 159,53 |
| COLOMBIA | 76,65 | 36,70 | 29,94 | 10,05 | 153,34 |
| CUNDINAMARCA | 97,54 | 19,78 | 10,86 | 23,92 | 152,09 |
| CAUCA | 73,96 | 49,31 | 13,12 | 2,68 | 139,07 |
| GUAVIARE | 49,52 | 60,33 | 16,21 | 0,90 | 126,96 |
| BOLIVAR | 63,63 | 40,62 | 20,72 | 1,55 | 126,53 |
| ATLANTICO | 68,01 | 30,59 | 3,94 | 3,70 | 106,25 |
| CORDOBA | 52,17 | 31,12 | 9,01 | 2,81 | 95,11 |
| GUAJIRA | 81,33 | 11,48 | 1,04 | 0,31 | 94,17 |
| MAGDALENA | 61,09 | 22,81 | 7,47 | 0,90 | 92,27 |
| CARTAGENA | 38,43 | 46,92 | 3,99 | 2,40 | 91,74 |
| VAUPES | 73,29 | 11,45 | 2,29 | 0,00 | 87,03 |
| TOLIMA | 47,36 | 24,92 | 8,45 | 2,13 | 82,87 |
| STA MARTA D.E. | 49,19 | 27,07 | 3,10 | 1,86 | 81,22 |
| BARRANQUILLA | 33,32 | 23,06 | 1,64 | 3,94 | 61,96 |
| BOGOTA | 18,26 | 12,27 | 20,28 | 10,07 | 60,89 |
| SAN ANDRES | 27,47 | 23,55 | 7,85 | 1,31 | 60,18 |
| CHOCO | 11,60 | 21,00 | 7,00 | 1,20 | 40,79 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Violencia de género

La actividad de vulnerabilidad en la agresión al sexo femenino se documentó en el 90,5% (52297/57815) de los casos. Se halla en primer lugar otro seguido de los estudiantes y trabajadora doméstica (ver tabla 5).

Tabla 5. Actividad de vulnerabilidad en los casos de violencia de género por tipo de violencia para el sexo femenino notificados en Colombia, periodo XIII, 2015

| Situación o condición de vulnerabilidad - Mujeres (n=57815) | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|
| Actividad | Negligencia y abandono | Violencia Física | Violencia Psicológica | Violencia Sexual | Total | % |
| Otro | 6900 | 21527 | 2791 | 6848 | 38066 | 65,8 |
| Estudiante | 804 | 2754 | 335 | 6786 | 10679 | 18,5 |
| Trabajadora doméstica | 126 | 2208 | 267 | 329 | 2930 | 5,1 |
| Maestro (a) | 1 | 192 | 39 | 31 | 263 | 0,5 |
| Servidor (a) público | 7 | 195 | 21 | 25 | 248 | 0,4 |
| Reciclador (a) | 4 | 46 | 1 | 12 | 63 | 0,1 |
| Fuerza pública | 0 | 26 | 0 | 3 | 29 | 0,1 |
| Líderes (as) cívicos | 1 | 12 | 2 | 4 | 19 | 0,0 |
| Total | 7843 | 26960 | 3456 | 14038 | 52297 | 90,5 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

La actividad de vulnerabilidad en la agresión al sexo masculino se documentó en el 92,4% (14873/16099) de los casos. Se halla en primer lugar otro seguido de los estudiantes y trabajador (a) doméstico (ver tabla 6).

Tabla 6. Actividad de vulnerabilidad en los casos de violencia de género por tipo de violencia para el sexo masculino notificados en Colombia, periodo XIII, 2015

| Situación o condición de vulnerabilidad - Hombres (n=16099) | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|
| Actividad | Negligencia y abandono | Violencia Física | Violencia Psicológica | Violencia Sexual | Total | % |
| Otro | 4819 | 4591 | 586 | 929 | 10925 | 67,9 |
| Estudiante | 987 | 1372 | 163 | 984 | 3506 | 21,8 |
| Trabajadora doméstica | 55 | 100 | 19 | 16 | 190 | 1,2 |
| Fuerza pública | 0 | 113 | 3 | 10 | 126 | 0,8 |
| Servidor (a) público | 2 | 59 | 5 | 5 | 71 | 0,4 |
| Maestro (a) | 1 | 25 | 4 | 1 | 31 | 0,2 |
| Reciclador (a) | 5 | 12 | 1 | 2 | 20 | 0,1 |
| Líderes (as) cívicos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| Total | 5869 | 6276 | 781 | 1947 | 14873 | 92,4 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Violencia de género

La asociación entre el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas a la ocurrencia de las agresiones por parte de la víctima del hecho violento se encuentra suficientemente documentada y su consideración como factores de riesgo se acepta universalmente. El 4,9% (3669/73914) de las víctimas estaban bajo su efecto.

Las agresiones por parte de un familiar o responsable se documentó que la mayoría son ocasionadas por la pareja, estos son compañero (a) permanente, esposo (a), novio(a) y amante con 28995 casos (39,23%), seguido de la madre y padre con 17529 casos (243,71%). Para la violencia física el mayor agresor es el compañero permanente, para la violencia sexual son otros, para la negligencia y abandono la madre y padre y para la violencia psicológica el esposo (a) (ver tabla 7).

Tabla 7. Distribución de los casos de violencia de género según agresor o responsable familiar en Colombia, periodo XIII, 2015

| Parentesco | Violencia física | Violencia sexual | Negligencia y abandono | Violencia psicológica | Total | % |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Otros | 7057 | 9028 | 1066 | 511 | 17662 | 23,9 |
| Madre | 1834 | 117 | 10951 | 508 | 13410 | 18,1 |
| Compañero (a) permanente | 8138 | 935 | 72 | 778 | 9923 | 13,4 |
| Esposos (a) | 7117 | 365 | 98 | 969 | 8549 | 11,6 |
| Padre | 1773 | 766 | 1199 | 381 | 4119 | 5,6 |
| Novio(a) | 1115 | 2479 | 30 | 57 | 3681 | 5,0 |
| Ex compañero (a) permanente | 2876 | 179 | 22 | 594 | 3671 | 5,0 |
| Hermano | 1587 | 293 | 89 | 188 | 2157 | 2,9 |
| Hijo | 916 | 25 | 381 | 473 | 1795 | 2,4 |
| Ex esposo (a) | 1521 | 51 | 6 | 137 | 1715 | 2,3 |
| Padrastra | 480 | 989 | 19 | 49 | 1537 | 2,1 |
| Tío (a) | 438 | 714 | 104 | 25 | 1281 | 1,7 |
| Ex novio (a) | 777 | 330 | 6 | 52 | 1165 | 1,6 |
| Primo (a) | 257 | 857 | 12 | 30 | 1156 | 1,6 |
| Abuelo (a) | 143 | 275 | 267 | 27 | 712 | 1,0 |
| Cuñado (a) | 495 | 135 | 7 | 14 | 651 | 0,9 |
| Ex amante | 95 | 57 | 4 | 9 | 165 | 0,2 |
| Encargado (a) NNA/adulto mayor | 35 | 41 | 77 | 11 | 164 | 0,2 |
| Suegro (a) | 128 | 12 | 7 | 13 | 160 | 0,2 |
| Amante | 90 | 23 | 2 | 11 | 126 | 0,2 |
| Madrastra | 69 | 11 | 14 | 7 | 101 | 0,1 |
| Sin dato y no aplica | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 | 0,0 |
| Total | 36946 | 17689 | 14434 | 4845 | 73914 | 100,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Violencia de género

14505 casos fueron ocasionados por agresores no familiares, se encontró que el 4,3% fueron ocasionadas por desconocidos, seguido del grupo otro y amigo con el 3,4% respectivamente (ver tabla 8).

Tabla 8. Distribución de los casos de violencia de género según agresor no familiar en Colombia, periodo XIII, 2015

| Agresor no familiar | Violencia física | Violencia sexual | Negligencia y abandono | Violencia psicológica | Total | % |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Desconocido (a) | 1170 | 1923 | 38 | 24 | 3155 | 4,3 |
| Otro | 1051 | 1231 | 180 | 79 | 2541 | 3,4 |
| Amigo | 917 | 1462 | 82 | 32 | 2493 | 3,4 |
| Conocido (a) sin ningún trato | 1205 | 1052 | 19 | 36 | 2312 | 3,1 |
| Vecino (a) | 952 | 1179 | 12 | 21 | 2164 | 2,9 |
| Compañero (a) de estudio | 270 | 176 | 13 | 31 | 490 | 0,7 |
| Jefe | 197 | 220 | 45 | 19 | 481 | 0,7 |
| Profesor | 144 | 228 | 40 | 25 | 437 | 0,6 |
| Compañero (a) de trabajo | 130 | 65 | 4 | 13 | 212 | 0,3 |
| Servidor Público | 159 | 22 | 1 | 2 | 184 | 0,2 |
| Sin información | 6 | 14 | 2 | 0 | 22 | 0,0 |
| Sacerdote/Pastor | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
| Custodio (a) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Total | 6205 | 7582 | 436 | 282 | 14505 | 19,62 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

El 14,42% (10658/73914) de los casos requirió hospitalización siendo el 69,64% (7422/10658) de estos de sexo femenino, afectando al 12,84% (7422/57815) de esta población. El 30,36% (3236/10658) restante de sexo masculino, afectó al 20,10% (3236/16099) de esta población (ver tabla 9).

Tabla 9. Distribución de los casos hospitalizados por violencia de género según tipo de violencia, Colombia, periodo XIII, 2015

| Hospitalización 14,42% (10658/73914) | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Tipo de Violencia | Mujeres | Hombres | Total | % |
| Negligencia y abandono | 2225 | 2120 | 4345 | 40,8 |
| Violencia Sexual | 3506 | 455 | 3961 | 37,2 |
| Violencia Física | 1578 | 628 | 2206 | 20,7 |
| Violencia Psicológica | 113 | 33 | 146 | 1,4 |
| Total | 7422 | 3236 | 10658 | 100,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Violencia de género

Con respecto a la violencia sexual se han notificado al sistema 17689 casos de los cuales el 80,3% fueron por abuso sexual, 7,9% violaciones y 7,4% actos sexuales violentos. El 85,04% (15043/17689) de las violencias sexuales fueron en niños, niñas y adolescentes (ver tabla 10).

Tabla 10. Distribución de los casos por tipo de violencia sexual y grupo de edad, Colombia, periodo XIII, 2015

| VIOLENCIA SEXUAL | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------|---|----------------------|--------------|
| Grupo de edad | Abuso Sexual | Acoso sexual | Violación | Explotación sexual | Turismo sexual | Trata de personas | Violencia sexual en el conflicto armado | Acto sexual violento | TOTAL |
| 0 a 4 | 1727 | 69 | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 120 | 1964 |
| 5 a 9 | 2664 | 146 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 3076 |
| 10 a 14 | 6387 | 295 | 440 | 22 | 1 | 4 | 4 | 364 | 7517 |
| 15 a 19 | 1828 | 97 | 325 | 13 | 1 | 5 | 7 | 210 | 2486 |
| 20 a 24 | 602 | 24 | 186 | 3 | 1 | 3 | 3 | 128 | 950 |
| 25 a 29 | 374 | 14 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 | 615 |
| 30 a 34 | 244 | 9 | 59 | 0 | 0 | 2 | 5 | 78 | 397 |
| 35 a 39 | 143 | 5 | 43 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | 235 |
| 40 a 44 | 84 | 7 | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 | 161 |
| 45 a 49 | 44 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 94 |
| 50 a 54 | 39 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 58 |
| 55 a 59 | 14 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 |
| 60 a 64 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 |
| > 65 | 31 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 64 |
| TOTAL | 14196 | 681 | 1402 | 40 | 3 | 18 | 41 | 1308 | 17689 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

En la violencia sexual se encuentra diferencia estadística en las mujeres con respecto de los hombres en todos los grupos de edad; en general se registraron 7,03 casos de violencia sexual en mujeres por cada caso en un hombre (ver tabla 11).

Tabla 11. Incidencia de la violencia sexual, por sexo y grupo de edad, Colombia, periodo XIII, 2015


| GRUPO DE EDAD (Años) | MUJERES | | HOMBRES | | RR | IC 95% |
|------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| | n | INCIDENCIA (por 100.000 habs.) | n | INCIDENCIA (por 100.000 habs.) | | |
| Niños (0 a 9) | 3796 | 90,55 | 1244 | 28,35 | 3,19 | 3,0 3,41 |
| Adolescentes (10 a 19) | 9290 | 220,07 | 713 | 16,18 | 13,6 | 12,6 14,68 |
| Adultos (> 20) | 2449 | 15,32 | 197 | 1,31 | 11,67 | 10,09 13,49 |
| TOTAL | 15535 | 63,66 | 2154 | 9,05 | 7,03 | 6,72 7,36 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2015. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, Colombia.

Violencia de género

Con relación a la hora de ocurrencia del hecho violento en general se observa un patrón similar en los tipos de violencia estudiados. En esta variable el 94,73% (70020/73914) de los casos contó con registro. Se puede así visualizar mayor incidencia de casos al inicio de la madrugada, en la mañana y al inicio de las horas de la noche (ver gráfica 3).

Gráfica 3. Distribución horaria de los casos notificados de violencia de género en Colombia, periodo XIII, 2015



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

En el 48,29% (35697/73914) de las víctimas se documenta convivencia con el agresor. En el 18,0% (13306/73914) se definió al agresor en la categoría de grupos, ocupando el primer lugar no sabe con el 16,7. En general la fuerza pública, que incluye policía, ejército y armada en conjunto representaron el 0,5% de los casos (355/73914). Los grupos ilegales formados por guerrilleros, bandas criminales, pandillas, y paramilitares en orden descendente ocupan el 0,9% (639/73914) de los casos (ver tabla 12).

Violencia de género

Tabla 12. Distribución de los casos de violencia de género, según agresor de grupo, Colombia, periodo XIII, 2015

| Grupo | Casos | Porcentaje |
|----------------------------|--------------|-------------|
| No sabe | 12312 | 16,7 |
| Policía | 255 | 0,3 |
| Pandilla | 221 | 0,3 |
| Guerrillero (a) | 195 | 0,3 |
| Bandas criminales | 150 | 0,2 |
| Ejército | 87 | 0,1 |
| Paramilitar o autodefensas | 59 | 0,1 |
| Narcotráfico | 14 | 0,0 |
| Armada | 13 | 0,0 |
| Total | 13306 | 18,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Se determinó que los mayores agresores de la violencia en general fueron los hombres con un 69,4% (51329/73914) y las mujeres con un 28,5% (21101/73914), se encontraron 1484 casos sin dato. Los hombres predominaron en la violencia física, en la sexual y en la psicológica. La mujer tuvo preponderancia en la generación de negligencia y abandono, teniendo en cuenta que esta es una actividad que llevan a cabo las mujeres. En esta variable el 98% (72430/73914) de los casos contó con registro.

Con relación al elemento usado en la agresión física el mayor porcentaje está dado por arma o elemento contundente/corto contundente con el 61,5%, otros con el 14,7%, cortante y corto punzante con el 6,9% y ahorcamiento/estrangulamiento/sofocación con el 6,8%. Las quemaduras con sus componentes de quemadura por químicos corrosivos, quemadura líquido hirviente y quemadura por fuego ocuparon el 1,0% (370/36946). Se notificaron 75 casos de quemaduras por químicos: 47 en mujeres y 28 en hombres (ver tabla 13).

Violencia de género

Tabla 13. Distribución de los casos de violencia de género según elemento causal en Colombia, periodo XIII, 2015

| Mecanismo utilizado para la agresión en la violencia Física (n=36946) | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| Elemento | Mujeres | Hombres | Total | Porcentaje |
| Contundente y corto contundente | 18881 | 3826 | 22707 | 61,5 |
| Otros | 4496 | 938 | 5434 | 14,7 |
| Cortante, corto punzante y punzante | 1584 | 964 | 2548 | 6,9 |
| Ahorcamiento/ estrangulamiento/ sofocación | 2292 | 211 | 2503 | 6,8 |
| Caídas | 1334 | 281 | 1615 | 4,4 |
| Sin dato | 1132 | 369 | 1501 | 4,1 |
| Proyectil de arma de fuego | 144 | 96 | 240 | 0,6 |
| Quemadura por líquido hirviendo | 100 | 98 | 198 | 0,5 |
| Quemadura por fuego | 55 | 42 | 97 | 0,3 |
| Quemadura por Sustancias corrosivas | 47 | 28 | 75 | 0,2 |
| Mordedura | 18 | 6 | 24 | 0,1 |
| Intoxicación | 4 | 0 | 4 | 0,0 |
| Total | 30087 | 6859 | 36946 | 100,0 |


Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

De los 75 casos notificados de violencia de género que fueron agredidos por sustancias corrosivas, que tuvieron quemadura, se observa que el sitio anatómico más comprometido fue la cara seguido del cuello, en cuanto al grado las más frecuentes fueron las de segundo grado y en su mayoría con una extensión del 6% al 14% (ver tabla 14).

Tabla 14. Distribución de los casos de violencia de género, con tipo lesión quemadura, según sitio anatómico, grado y extensión, en Colombia, periodo XIII, 2015

| Sitio anatómico comprometido por la quemadura | Mayor o igual a 14 años | Menor de 14 años | Total | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Cara | 36 | 7 | 43 | |
| Cuello | 11 | 3 | 14 | |
| Mano | 6 | 1 | 7 | |
| Pie | 2 | 1 | 3 | |
| Genitales | 3 | 0 | 3 | |
| Tronco | 10 | 0 | 10 | |
| Miembro superior (sin manos) | 11 | 1 | 12 | |
| Miembro Inferior (sin pies) | 5 | 2 | 7 | |
| Grado de la quemadura | Mayor de 14 años | Menor e igual a 14 años | Total | % |
| Primer grado | 12 | 4 | 16 | 21,3 |
| Segundo grado | 34 | 10 | 44 | 58,7 |
| Tercer grado | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| En blanco | 10 | 5 | 15 | 20,0 |
| Total | 56 | 19 | 75 | 100,0 |
| Extensión de la quemadura | Mayor de 14 años | Menor e igual a 14 años | Total | % |
| < o igual a 5% | 17 | 5 | 22 | 29,3 |
| 6% al 14% | 24 | 8 | 32 | 42,7 |
| > o igual al 15% | 5 | 1 | 6 | 8,0 |
| En blanco | 10 | 5 | 15 | 20,0 |
| Total | 56 | 19 | 75 | 100,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | |

Violencia de género

Al evaluar el escenario de ocurrencia de los tipos de violencia podemos observar que en la vivienda ocurre la mayor frecuencia de casos seguido de la vía pública y en tercer otro (ver tabla 15).

Tabla 15. Distribución de los casos de violencia de género según escenario de ocurrencia en Colombia, periodo XIII, 2015

| Escenario | Violencia física | Violencia sexual | Negligencia y abandono | Violencia Psicológica | Total general |
|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Vivienda | 25929 | 12253 | 12255 | 4180 | 54617 |
| Vía Pública | 8730 | 2335 | 1337 | 413 | 12815 |
| Otro | 292 | 840 | 347 | 66 | 1545 |
| Espacios terrestres al aire libre (Bosque, potreros) | 239 | 986 | 153 | 9 | 1387 |
| Centros educativos | 512 | 546 | 190 | 97 | 1345 |
| Establecimiento comercial(tienda, centro comercial) | 650 | 390 | 99 | 49 | 1188 |
| Lugares de esparcimiento con expendio de alcohol | 444 | 280 | 31 | 8 | 763 |
| Oficina | 86 | 30 | 11 | 20 | 147 |
| Sitio de diversión | 51 | 22 | 10 | 2 | 85 |
| Deportivo | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 |
| (en blanco) | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 36946 | 17689 | 14434 | 4845 | 73914 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

En la ruta de atención para violencia sexual se establecen diferentes acciones como los procesos de profilaxis, salud sexual y acciones de índole jurídica. Con relación a la violencia sexual no se contempla riesgo biológico en los casos de acoso sexual y acto sexual violento, por lo que de los 17689 casos el 88,75% (15700 casos) están en riesgo, siendo 13829 en mujeres y 1871 en hombres, Dentro de este contexto la mayor profilaxis aplicada fue para VIH, seguido de otras profilaxis y hepatitis B, visualizándose esta estrategia en menos de la tercera parte de los casos. Se debe tener en cuenta que de estos casos 14196 fueron notificados como abuso sexual en donde la atención no cumple con los criterios establecidos en el protocolo de atención y normatividad vigente o ya con estados de embarazo (ver tabla 16).

Violencia de género

Tabla 16. Distribución de profilaxis para enfermedades de transmisión sexual en paciente con riesgo biológico en la violencia de género en Colombia, periodo XIII 2015

| Violencia Sexual n= 17689 | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Riesgo Biológico n= 15700 | | | | |
| | Mujeres (n= 13829) | | Hombre (n=1871) | |
| | n | Porcentaje | n | Porcentaje |
| Profilaxis VIH | 4566 | 33,02 | 628 | 33,56 |
| Profilaxis hepatitis B | 3869 | 27,98 | 554 | 29,61 |
| Otras profilaxis | 4024 | 29,10 | 547 | 29,24 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

En el caso de violencia contra la mujer se contemplan acciones de anticoncepción de emergencia e interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la cual para este informe se contempla el inicio de la edad reproductiva a partir de los 10 hasta los 49 años teniendo 10270 mujeres a riesgo. El 26,15% (2686/10270) recibieron anticoncepción de emergencia, viéndose mayor frecuencia entre los 10 y 19 años y visualizándose esta estrategia en menos de la tercera parte de los casos. Se debe tener en cuenta que de estos casos 9044 fueron notificados como abuso sexual en donde la atención no cumple con los criterios establecidos en ruta de atención y normatividad vigente o ya con estados de embarazo (ver tabla 17).

Tabla 17. Anticoncepción de emergencia en mujeres en edad fértil con riesgo biológico en la violencia de género en Colombia, periodo XIII 2015

| Violencia sexual n= 17689 | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Mujeres n= 12461 con riesgo biológico | | | |
| Mujeres con riesgo biológico en edad reproductiva de 10 a 49 años n= 10270 | | | |
| Edad agrupada | Riesgo biológico | Anticoncepción de emergencia | Porcentaje |
| 10 a 14 | 6386 | 1039 | 16,27 |
| 15 a 19 | 2041 | 784 | 12,28 |
| 20 a 24 | 742 | 372 | 5,83 |
| 25 a 29 | 454 | 229 | 3,59 |
| 30 a 34 | 288 | 129 | 2,02 |
| 35 a 39 | 181 | 68 | 1,06 |
| 40 a 44 | 116 | 39 | 0,61 |
| 45 a 49 | 62 | 26 | 0,41 |
| Total | 10270 | 2686 | 26,15 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Violencia de género

El 34,63% (3556/10270) de las mujeres en edad fértil recibieron orientación en interrupción voluntaria de embarazo y al igual que en los dos indicadores anteriores se visualizó esta estrategia en menos de la tercera parte de los casos (ver tabla 18).

Tabla 18. Orientación en interrupción voluntaria del embarazo en mujeres en edad fértil con riesgo biológico en la violencia de género en Colombia, periodo XIII 2015

| Violencia sexual n= 17689 | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------|
| Mujeres n= 12461 con riesgo biológico | | | |
| Mujeres con riesgo biológico en edad reproductiva de 10 a 49 años n= 10270 | | | |
| Edad agrupada | Riesgo biológico | Orientación interrupción voluntaria del embarazo | Porcentaje |
| 10 a 14 | 6386 | 1826 | 28,59 |
| 15 a 19 | 2041 | 852 | 13,34 |
| 20 a 24 | 742 | 382 | 5,98 |
| 25 a 29 | 454 | 224 | 3,51 |
| 30 a 34 | 288 | 133 | 2,08 |
| 35 a 39 | 181 | 78 | 1,22 |
| 40 a 44 | 116 | 38 | 0,60 |
| 45 a 49 | 62 | 23 | 0,36 |
| Total | 10270 | 3556 | 34,63 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Con relación a la atención médica y puntualizando con el apoyo por el área especializada de salud mental por grupos de edad de las personas afectadas en ambos sexos, en el evento de violencia sexual, se brindó atención en salud mental en el 55,8% de los casos del sexo femenino y en 58,8% del masculino (ver tabla 19).

Violencia de género

Tabla 19. Distribución de la prestación de servicio de salud mental en violencia sexual por sexo y grupo de edad en Colombia, periodo XIII, 2015

| Violencia sexual (n= 17689) | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Grupo de edad | Mujeres | | | Hombres | | |
| | n | Casos atendidos | Porcentaje | n | Casos atendidos | Porcentaje |
| 0 a 4 | 1483 | 774 | 52,2 | 481 | 246 | 51,1 |
| 5 a 9 | 2313 | 1379 | 59,6 | 763 | 466 | 61,1 |
| 10 a 14 | 6966 | 3534 | 50,7 | 551 | 345 | 62,6 |
| 15 a 19 | 2324 | 1368 | 58,9 | 162 | 104 | 64,2 |
| 20 a 24 | 883 | 549 | 62,2 | 67 | 48 | 71,6 |
| 25 a 29 | 579 | 340 | 58,7 | 36 | 19 | 52,8 |
| 30 a 34 | 365 | 200 | 54,8 | 32 | 12 | 37,5 |
| 35 a 39 | 217 | 124 | 57,1 | 18 | 9 | 50,0 |
| 40 a 44 | 151 | 90 | 59,6 | 10 | 2 | 20,0 |
| 45 a 49 | 86 | 52 | 60,5 | 8 | 3 | 37,5 |
| 50 a 54 | 51 | 35 | 68,6 | 7 | 2 | 28,6 |
| 55 a 59 | 40 | 22 | 55,0 | 4 | 2 | 50,0 |
| 60 a 64 | 24 | 17 | 70,8 | 4 | 2 | 50,0 |
| 65 y más | 53 | 32 | 60,4 | 11 | 6 | 54,5 |
| Total | 15535 | 8516 | 54,8 | 2154 | 1266 | 58,8 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Con relación al haber informado a la autoridad competente del hecho por grupos de edad de las personas afectadas en ambos sexos, en el evento de violencia sexual, se informó a la autoridad competente en el 65,8% de las mujeres agredidas y en el 70,3% de los hombres (ver tabla 20).

Tabla 20. Distribución de la información a la autoridad competente en violencia sexual por sexo y grupo de edad en Colombia, periodo XIII, 2015

| Violencia sexual (n= 17689) | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Grupo de edad | Mujeres | | | Hombres | | |
| | n | casos Informe autoridad | Porcentaje | n | casos Informe autoridad | Porcentaje |
| 0 a 4 | 1483 | 1060 | 71,5 | 481 | 316 | 65,7 |
| 5 a 9 | 2313 | 1747 | 75,5 | 763 | 563 | 73,8 |
| 10 a 14 | 6966 | 4255 | 61,1 | 551 | 402 | 73,0 |
| 15 a 19 | 2324 | 1550 | 66,7 | 162 | 111 | 68,5 |
| 20 a 24 | 883 | 598 | 67,7 | 67 | 45 | 67,2 |
| 25 a 29 | 579 | 375 | 64,8 | 36 | 22 | 61,1 |
| 30 a 34 | 365 | 239 | 65,5 | 32 | 17 | 53,1 |
| 35 a 39 | 217 | 139 | 64,1 | 18 | 9 | 50,0 |
| 40 a 44 | 151 | 93 | 61,6 | 10 | 7 | 70,0 |
| 45 a 49 | 86 | 51 | 59,3 | 8 | 3 | 37,5 |
| 50 a 54 | 51 | 40 | 78,4 | 7 | 6 | 85,7 |
| 55 a 59 | 40 | 25 | 62,5 | 4 | 3 | 75,0 |
| 60 a 64 | 24 | 14 | 58,3 | 4 | 3 | 75,0 |
| 65 y más | 53 | 38 | 71,7 | 11 | 7 | 63,6 |
| Total | 15535 | 10224 | 65,8 | 2154 | 1514 | 70,3 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Violencia de género

Con relación a las medidas de protección por grupos de edad de las personas afectadas en ambos sexos, en el evento de violencia sexual, El 43,8% de las mujeres y el 50,0% de los hombres fueron remitidos a protección (ver tabla 21).

Tabla 21. Distribución de medidas de protección en violencia sexual por sexo y grupo de edad en Colombia, periodo XIII, 2015

| Violencia sexual (n= 17689) | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Grupo de edad | Mujeres | | | Hombres | | |
| | n | Remisión a protección | Porcentaje | n | Remisión a protección | Porcentaje |
| 0 a 4 | 1483 | 789 | 53,2 | 481 | 239 | 49,7 |
| 5 a 9 | 2313 | 1240 | 53,6 | 763 | 425 | 55,7 |
| 10 a 14 | 6966 | 2837 | 40,7 | 551 | 271 | 49,2 |
| 15 a 19 | 2324 | 1021 | 43,9 | 162 | 69 | 42,6 |
| 20 a 24 | 883 | 329 | 37,3 | 67 | 31 | 46,3 |
| 25 a 29 | 579 | 214 | 37,0 | 36 | 12 | 33,3 |
| 30 a 34 | 365 | 139 | 38,1 | 32 | 9 | 28,1 |
| 35 a 39 | 217 | 91 | 41,9 | 18 | 8 | 44,4 |
| 40 a 44 | 151 | 50 | 33,1 | 10 | 1 | 10,0 |
| 45 a 49 | 86 | 35 | 40,7 | 8 | 3 | 37,5 |
| 50 a 54 | 51 | 23 | 45,1 | 7 | 3 | 42,9 |
| 55 a 59 | 40 | 13 | 32,5 | 4 | 2 | 50,0 |
| 60 a 64 | 24 | 6 | 25,0 | 4 | 1 | 25,0 |
| 65 y más | 53 | 22 | 41,5 | 11 | 4 | 36,4 |
| Total | 15535 | 6809 | 43,8 | 2154 | 1078 | 50,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Con relación a los casos de violencia sexual con tipo violación los cuales el 100% presentan riesgo biológico se observó que al 36% de las mujeres y el 23,97 de los hombres se les tomó evidencia médico legal, se aclara que probablemente no todos los casos cumplen con los tiempo establecidos para la toma de evidencia médico legal según “El reglamento técnico para el abordaje forense integral en la investigación del delito sexual” de Medicina Legal y Ciencias Forenses (ver tabla 22).

Violencia de género

Tabla 22. Distribución de los casos de violencia sexual tipo violación con riesgo biológico y evidencia médico legal por sexo y grupo de edad en Colombia, periodo XIII, 2015

| Violencia sexual (n= 17689) | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|
| Riesgo biológico - Violación - n= 1402 | | | | | | |
| Mujeres | | | | Hombres | | |
| Grupo de edad | n | Evidencia médico legal | Porcentaje | n | Evidencia médico legal | Porcentaje |
| 0 a 4 | 29 | 14 | 48,3 | 16 | 2 | 12,5 |
| 5 a 9 | 68 | 27 | 39,7 | 31 | 10 | 32,3 |
| 10 a 14 | 411 | 104 | 25,3 | 29 | 7 | 24,1 |
| 15 a 19 | 310 | 132 | 42,6 | 15 | 4 | 26,7 |
| 20 a 24 | 173 | 71 | 41,0 | 13 | 3 | 23,1 |
| 25 a 29 | 104 | 38 | 36,5 | 2 | 0 | 0,0 |
| 30 a 34 | 55 | 20 | 36,4 | 4 | 2 | 50,0 |
| 35 a 39 | 41 | 21 | 51,2 | 2 | 1 | 50,0 |
| 40 a 44 | 28 | 11 | 39,3 | 1 | 0 | 0,0 |
| 45 a 49 | 21 | 10 | 47,6 | 1 | 0 | 0,0 |
| 50 a 54 | 7 | 2 | 28,6 | 1 | 0 | 0,0 |
| 55 a 59 | 18 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | NA |
| 60 a 64 | 4 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 |
| 65 y más | 12 | 8 | 66,7 | 4 | 0 | 0,0 |
| Total | 1281 | 464 | 36 | 121 | 29 | 23,97 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Comportamiento de la violencia en niños, niñas y adolescentes en Colombia, periodo XIII, 2015.

De los 73914 casos ya descritos de violencia género el 51% (37657/73914) corresponden a niños, niñas y adolescentes, que se considera para este informe menores de 20 años. Este evento en este grupo de edad afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres, con una proporción de 69,9% (26324/37657) y 30,1% (11333/37657) respectivamente.

De acuerdo con el área de ocurrencia, la categoría que tuvo la mayor representatividad en frecuencia de distribución porcentual fue la cabecera municipal, seguida rural disperso y centro poblado con 73,4% (27642/37657).

Violencia de género

Al revisar los datos de notificación correspondientes al tipo de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, se observó que la mayor distribución porcentual de los casos notificados, se encontró en el régimen subsidiado con el 64,4%.

Según la pertenencia étnica se observa que la mayor proporción de las víctimas de violencia se concentra en el grupo otro con un 91,3% (ver tabla 23).

Tabla 23. Distribución de los casos de violencia de género en niños, niñas y adolescentes por sexo, área de ocurrencia, tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y pertenencia étnica, notificados en Colombia, periodo XIII, 2015

| Variable | Casos | % |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Sexo | | |
| Niñas | 26324 | 69,9 |
| Niños | 11333 | 30,1 |
| Área de Ocurrencia | | |
| | n | % |
| Cabecera municipal | 27642 | 73,4 |
| Rural disperso | 6841 | 18,2 |
| Centro poblado | 3174 | 8,4 |
| Seguridad social | | |
| | n | % |
| Subsidiado | 24258 | 64,4 |
| Contributivo | 9864 | 26,2 |
| No asegurado | 2824 | 7,5 |
| Especial | 432 | 1,1 |
| Excepción | 279 | 0,7 |
| Pertenencia Étnica | | |
| | | % |
| Otro | 34375 | 91,3 |
| Negro, mulato, afrocolombiano | 1716 | 4,6 |
| Indígena | 1297 | 3,4 |
| ROM, gitano | 187 | 0,5 |
| Raizal | 69 | 0,2 |
| Palenquero | 13 | 0,0 |
| Total | 37657 | 100,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Con relación a grupos poblacionales una persona puede tener criterio para estar en más de uno de estos. De esta manera el 89,5% (33690/37657) pertenece a otros grupos poblacionales, seguido de las gestantes con el 7,6% (2865/37657) y en tercer lugar se encuentra el grupo de víctima de ama de casa con el 6,5% (2452/37657), con menos frecuencia se presenta en Madres comunitarias, desmovilizados y población privada de la libertad (ver tabla 24).

Violencia de género

Tabla 24. Distribución de la violencia de género en niños, niñas y adolescentes por grupo poblacional en Colombia, periodo XIII, 2015

| Vulnerabilidad-actividad | Mujer | Hombre | Total | Porcentaje |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| Otros | 22828 | 10862 | 33690 | 89,5 |
| Gestantes | 2865 | 0 | 2865 | 7,6 |
| Ama de casa | 2361 | 91 | 2452 | 6,5 |
| Campesino (a) | 1010 | 431 | 1441 | 3,8 |
| Víctimas de violencia | 817 | 229 | 1046 | 2,8 |
| Desplazados | 406 | 135 | 541 | 1,4 |
| Mujer cabeza de familia | 326 | 30 | 356 | 0,9 |
| Consumo de SPA | 305 | 73 | 378 | 1,0 |
| Población ICBF o SNBF | 233 | 115 | 348 | 0,9 |
| Discapacitados | 175 | 84 | 259 | 0,7 |
| LGTBI | 61 | 31 | 92 | 0,2 |
| Indigentes | 50 | 29 | 79 | 0,2 |
| Trabajo Sexual | 53 | 14 | 67 | 0,2 |
| Psiquiátricos | 43 | 23 | 66 | 0,2 |
| Migrantes | 34 | 23 | 57 | 0,2 |
| Carcelarios-privados de la libertad | 35 | 25 | 60 | 0,2 |
| Desmovilizados | 30 | 16 | 46 | 0,1 |
| Madres comunitarias | 32 | 0 | 32 | 0,1 |
| Total | 31664 | 12211 | 43875 | - |

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. SNBF: Sistema Nacional de Bienestar Familiar

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015


La mayor frecuencia de casos se encontró en el tipo de violencia sexual con 39,95% (15043/37657), seguida de la negligencia y abandono 31,65% (11917/37657), violencia física 24,80% (9340/37657), y finalmente psicológica con 3,60% (1357/37657).

En la violencia sexual predomina la afectación del sexo femenino con 87% (13086/15043), de igual manera en la física con 67,57% (6311/9340), la psicológica 68,90% (935/1357). El sexo masculino se ve afectado predominantemente en la privación y negligencia con 49,72% (5925/11917).

Comparando con el año anterior se registró un aumento de la notificación del 19,07%, pasando de 31626 a 37657 casos (ver gráfico 4).

Violencia de género

Gráfica 4. Comparación de los hechos de violencia de género en niños, niñas y adolescentes según tipo de violencia en Colombia, periodo XIII, 2014-2015




Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2014-2015.

La violencia sexual se presenta predominantemente en el grupo de edad de 10 a 14 años, seguido del de 5 a 9. La violencia física y la psicológica predominan en el grupo de 15 a 19 seguido del de 10 a 14. La privación y negligencia se ve más marcada en el grupo de menores de cinco años, seguida por el de 5 a 9 (ver gráfica 5).

Violencia de género

Gráfica 5. Comportamiento de los casos de violencia en niños, niña y adolescentes, según grupo de edad en Colombia, periodo XIII, 2015



Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Se presentaron 145 muertes de las cuales 106 fueron en niños, niñas y adolescentes. Los tipos de violencia que causaron mayor frecuencia de casos fueron la negligencia y abandono, seguido de violencia física (ver tabla 25)

Tabla 25. Mortalidad según el tipo de violencia en los casos notificados en Colombia, periodo XIII, 2015

| Grupo de Edad | Negligencia y abandono | Violencia física | Violencia sexual | Violencia psicológica | Total |
|----------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 0 a 4 | 72 | 6 | 4 | 0 | 82 |
| 5 a 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 10 a 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 15 a 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 20 a 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 25 a 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 30 a 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 35 a 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 40 a 44 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 45 a 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 a 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 a 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 60 a 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| > 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total general | 84 | 50 | 10 | 1 | 145 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Violencia de género

Frente al reporte de casos del evento violencia en niños, niñas y adolescentes por departamento de procedencia se encuentra que el 48,5% de los casos lo aportan cinco entidades territoriales correspondientes a Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Huila (ver tabla 26).

Tabla 26. Distribución de los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes según departamento del hecho y modalidad de la violencia en Colombia, periodo XIII 2015

| Departamento Procedencia | Violencia sexual | Negligencia y abandono | Violencia física | Violencia Psicológica | Total | % |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| SANTANDER | 679 | 3885 | 640 | 83 | 5287 | 14,0 |
| ANTIOQUIA | 2690 | 343 | 1084 | 137 | 4254 | 11,3 |
| VALLE DEL CAUCA | 1770 | 563 | 1250 | 149 | 3732 | 9,9 |
| BOGOTA | 738 | 1284 | 578 | 457 | 3057 | 8,1 |
| HUILA | 759 | 756 | 344 | 71 | 1930 | 5,1 |
| NORTE SANTANDER | 407 | 837 | 285 | 21 | 1550 | 4,1 |
| NARIÑO | 663 | 250 | 426 | 59 | 1398 | 3,7 |
| CASANARE | 314 | 931 | 117 | 19 | 1381 | 3,7 |
| CUNDINAMARCA | 437 | 246 | 598 | 87 | 1368 | 3,6 |
| RISARALDA | 372 | 477 | 319 | 31 | 1199 | 3,2 |
| CESAR | 578 | 233 | 193 | 12 | 1016 | 2,7 |
| BOYACA | 323 | 220 | 421 | 45 | 1009 | 2,7 |
| CALDAS | 360 | 191 | 413 | 14 | 978 | 2,6 |
| CAUCA | 560 | 174 | 223 | 15 | 972 | 2,6 |
| CORDOBA | 495 | 151 | 217 | 17 | 880 | 2,3 |
| BOLIVAR | 398 | 214 | 213 | 10 | 835 | 2,2 |
| META | 367 | 269 | 176 | 12 | 824 | 2,2 |
| SUCRE | 340 | 104 | 241 | 6 | 691 | 1,8 |
| ATLANTICO | 345 | 45 | 244 | 25 | 659 | 1,8 |
| TOLIMA | 307 | 115 | 163 | 13 | 598 | 1,6 |
| CARTAGENA | 426 | 36 | 80 | 8 | 550 | 1,5 |
| QUINDIO | 192 | 51 | 198 | 23 | 464 | 1,2 |
| ARAUCA | 171 | 190 | 64 | 0 | 425 | 1,1 |
| BARRANQUILLA | 243 | 18 | 98 | 22 | 381 | 1,0 |
| PUTUMAYO | 220 | 71 | 87 | 2 | 380 | 1,0 |
| CAQUETA | 168 | 26 | 181 | 2 | 377 | 1,0 |
| MAGDALENA | 163 | 55 | 142 | 4 | 364 | 1,0 |
| GUAJIRA | 90 | 10 | 175 | 3 | 278 | 0,7 |
| STA MARTA D.E. | 107 | 14 | 58 | 6 | 185 | 0,5 |
| AMAZONAS | 110 | 33 | 19 | 0 | 162 | 0,4 |
| CHOCO | 92 | 35 | 11 | 1 | 139 | 0,4 |
| GUAVIARE | 63 | 18 | 20 | 0 | 101 | 0,3 |
| VICHADA | 36 | 24 | 30 | 0 | 90 | 0,2 |
| EXTERIOR | 26 | 24 | 5 | 2 | 57 | 0,2 |
| GUAINIA | 18 | 18 | 19 | 0 | 55 | 0,1 |
| SAN ANDRES | 14 | 5 | 3 | 1 | 23 | 0,1 |
| VAUPES | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0,0 |
| Total general | 15043 | 11917 | 9340 | 1357 | 37657 | 100,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Violencia de género

En cuanto a la proporción de incidencia de la notificación de casos de violencia en niños, niñas y adolescentes por 100.000 habitantes en menores de 20 años, se encontró que el departamento con la mayor proporción de incidencia fue Casanare, el 42% (15/36) de las entidades territoriales supero la incidencia nacional (ver tabla 27).

Tabla 27. Proporción de incidencia de violencia en niños, niñas y adolescentes por 100.000 habitantes menores de 20 años según departamento del hecho en Colombia, periodo XIII, 2015

| Departamento Procedencia | Violencia sexual | Negligencia y abandono | Violencia física | Violencia Psicológica | Incidencia X 100.000 hab. |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| CASANARE | 216,20 | 641,02 | 80,56 | 13,08 | 950,86 |
| SANTANDER | 99,31 | 568,24 | 93,61 | 12,14 | 773,31 |
| AMAZONAS | 291,17 | 87,35 | 50,29 | 0,00 | 428,81 |
| HUILA | 168,27 | 167,61 | 76,26 | 15,74 | 427,88 |
| RISARALDA | 120,55 | 154,58 | 103,38 | 10,05 | 388,56 |
| ARAUCA | 137,55 | 152,83 | 51,48 | 0,00 | 341,86 |
| CALDAS | 111,73 | 59,28 | 128,18 | 4,35 | 303,53 |
| NORTE SANTANDER | 78,51 | 161,45 | 54,98 | 4,05 | 298,99 |
| GUAINIA | 89,18 | 89,18 | 94,13 | 0,00 | 272,49 |
| VALLE DEL CAUCA | 119,87 | 38,13 | 84,65 | 10,09 | 252,74 |
| QUINDIO | 104,29 | 27,70 | 107,54 | 12,49 | 252,02 |
| PUTUMAYO | 143,03 | 46,16 | 56,56 | 1,30 | 247,05 |
| VICHADA | 98,81 | 65,87 | 82,34 | 0,00 | 247,02 |
| CESAR | 133,31 | 53,74 | 44,51 | 2,77 | 234,33 |
| META | 101,00 | 74,03 | 48,44 | 3,30 | 226,78 |
| COLOMBIA | 87,42 | 69,25 | 54,23 | 7,89 | 218,83 |
| BOYACA | 69,99 | 47,67 | 91,23 | 9,75 | 218,64 |
| NARIÑO | 100,66 | 37,95 | 64,67 | 8,96 | 212,24 |
| SUCRE | 101,58 | 31,07 | 72,00 | 1,79 | 206,44 |
| ANTIOQUIA | 126,38 | 16,12 | 50,93 | 6,44 | 199,87 |
| GUAVIARE | 118,69 | 33,91 | 37,68 | 0,00 | 190,28 |
| CAUCA | 106,23 | 33,01 | 42,30 | 2,85 | 184,39 |
| CAQUETA | 80,86 | 12,51 | 87,11 | 0,96 | 181,45 |
| BOLIVAR | 85,27 | 45,85 | 45,64 | 2,14 | 178,91 |
| CARTAGENA | 121,49 | 10,27 | 22,82 | 2,28 | 156,86 |
| CUNDINAMARCA | 45,39 | 25,55 | 62,11 | 9,04 | 142,09 |
| ATLANTICO | 74,34 | 9,70 | 52,58 | 5,39 | 142,01 |
| CORDOBA | 71,68 | 21,87 | 31,42 | 2,46 | 127,43 |
| BOGOTA | 30,14 | 52,43 | 23,60 | 18,66 | 124,83 |
| TOLIMA | 59,65 | 22,34 | 31,67 | 2,53 | 116,19 |
| MAGDALENA | 46,41 | 15,66 | 40,43 | 1,14 | 103,63 |
| BARRANQUILLA | 60,61 | 4,49 | 24,44 | 5,49 | 95,03 |
| STA MARTA D.E. | 54,84 | 7,18 | 29,73 | 3,08 | 94,82 |
| SAN ANDRES | 54,55 | 19,48 | 11,69 | 3,90 | 89,62 |
| GUAJIRA | 20,42 | 2,27 | 39,70 | 0,68 | 63,07 |
| CHOCO | 37,72 | 14,35 | 4,51 | 0,41 | 56,99 |
| VAUPES | 9,30 | 4,65 | 23,25 | 0,00 | 37,20 |

Violencia de género

La mayoría de los agresores son los cuidadores primarios, lo que significa que la forma de violencia más prevalente es la intrafamiliar. El 47,14% de los casos de violencia reportan convivir con el agresor (17751/37657).

El hallarse bajo el efecto de alcohol y sustancias psicoactivas es un factor predisponente en la víctima para ser objeto de algún tipo de violencia. Lo cual se presentó en el 2,19% (823/37657) de los casos.

En relación al agresor se visualiza en primer lugar a la madre con el 31,1% seguido de otros, el padre, novio (a) y compañero permanente (ver tabla 28).

Tabla 28. Distribución de los casos de violencia niños, niñas y adolescentes según agresor o responsable familiar, Colombia, periodo XIII, 2015

| Parentesco | Violencia sexual | Negligencia y abandono | Violencia física | Violencia psicológica | Total | % |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Madre | 110 | 9500 | 1647 | 452 | 11709 | 31,1 |
| Otros | 7122 | 592 | 2225 | 242 | 10181 | 27,0 |
| Padre | 739 | 1179 | 1516 | 341 | 3775 | 10,0 |
| Novio(a) | 2450 | 27 | 350 | 28 | 2855 | 7,6 |
| Compañero (a) permanente | 794 | 28 | 1002 | 55 | 1879 | 5,0 |
| Padraastro | 955 | 19 | 393 | 45 | 1412 | 3,7 |
| Tío (a) | 686 | 101 | 297 | 17 | 1101 | 2,9 |
| Primo (a) | 820 | 9 | 108 | 11 | 948 | 2,5 |
| Hermano | 270 | 55 | 484 | 33 | 842 | 2,2 |
| Abuelo (a) | 271 | 266 | 130 | 25 | 692 | 1,8 |
| Esposo (a) | 219 | 28 | 322 | 38 | 607 | 1,6 |
| Ex novio (a) | 272 | 5 | 231 | 16 | 524 | 1,4 |
| Ex compañero (a) permanente | 76 | 5 | 293 | 31 | 405 | 1,1 |
| Cuñado (a) | 109 | 4 | 80 | 1 | 194 | 0,5 |
| Hijo | 12 | 41 | 42 | 8 | 103 | 0,3 |
| Ex esposo (a) | 8 | 0 | 82 | 4 | 94 | 0,2 |
| Encargado (a) NNA/adulto mayor | 41 | 35 | 14 | 2 | 92 | 0,2 |
| Madrastra | 11 | 14 | 60 | 2 | 87 | 0,2 |
| Ex amante | 42 | 1 | 19 | 4 | 66 | 0,2 |
| Amante | 22 | 2 | 22 | 2 | 48 | 0,1 |
| Suegro (a) | 8 | 5 | 23 | 0 | 36 | 0,1 |
| Sin dato | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
| Total | 15043 | 11917 | 9340 | 1357 | 37657 | 100,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Con relación al agresor no familiar el 4,4% es ocasionado por un desconocido (a) (ver tabla 29).

Violencia de género


Tabla 29. Distribución de los casos de violencia niños, niñas y adolescentes según agresor no familiar, Colombia, periodo XIII, 2015

| Agresor no familiar | Violencia sexual | Negligencia y abandono | Violencia física | Violencia psicológica | Total | % |
|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Desconocido (a) | 1290 | 27 | 317 | 11 | 1645 | 4,4 |
| Amigo | 1223 | 55 | 292 | 19 | 1589 | 4,2 |
| Vecino (a) | 1087 | 11 | 272 | 10 | 1380 | 3,7 |
| Otro | 983 | 112 | 278 | 29 | 1402 | 3,7 |
| Conocido (a) sin ningún trato | 845 | 15 | 304 | 15 | 1179 | 3,1 |
| Compañero (a) de estudio | 171 | 13 | 258 | 29 | 471 | 1,3 |
| Profesor | 197 | 32 | 63 | 18 | 310 | 0,8 |
| Jefe | 167 | 23 | 49 | 2 | 241 | 0,6 |
| Compañero (a) de trabajo | 43 | 3 | 37 | 5 | 88 | 0,2 |
| Servidor Público | 15 | 1 | 46 | 1 | 63 | 0,2 |
| Sin información | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0,0 |
| Sacerdote/Pastor | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0,0 |
| Custodio (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Total | 6035 | 294 | 1921 | 139 | 8389 | 22,3 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Con relación a la hora de ocurrencia del hecho violento se pone en evidencia un patrón similar en los tres tipos de violencia estudiados, observado esta variable en el 93,35% (35153/37657) de los casos que cuentan con este registro. Se puede así visualizar mayor incidencia de casos al inicio de la madrugada y en las horas próximas al medio día (ver gráfica 6)

Gráfica 6. Distribución horaria de los casos notificados de violencia de género en niños, niñas y adolescentes en Colombia, periodo XIII, 2015



Fuente: Sivigila, Instituto, Nacional de Salud, 2015.

Violencia de género

En el 21% (7739/37657) de casos se documentó al agresor en la categoría de grupos (ver tabla 30).

Tabla 30. Distribución de los casos de violencia de género según agresor de grupo, en niños, niñas y adolescentes en Colombia, periodo XIII, 2015

| Grupo | Casos | Porcentaje |
|----------------------------|-------------|------------|
| No sabe | 7281 | 19,3 |
| Pandilla | 103 | 0,3 |
| Policía | 103 | 0,3 |
| Guerrillero (a) | 91 | 0,2 |
| Bandas criminales | 64 | 0,2 |
| Ejército | 46 | 0,1 |
| Paramilitar o autodefensas | 33 | 0,1 |
| Narcotráfico | 9 | 0,0 |
| Armada | 9 | 0,0 |
| Total | 7739 | 21 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

El hombre se visualiza como mayor ocasionador de la violencia en general de niños niñas y adolescentes con 60,36% (22731/37657) de los casos.

Con relación al elemento causal la mayor frecuencia se encuentra en las armas de tipo contundente como las patadas, puños, y golpes con objetos romos (ver tabla 31).

Tabla 31. Distribución de los casos de violencia de género según elemento causal, en niños, niñas y adolescentes en Colombia, periodo XIII, 2015

| Mecanismo utilizado para la agresión en la violencia Física (n=9340) | | |
|---|-------------|--------------|
| Elemento | Casos | Porcentaje |
| Contundente y corto contundente | 5257 | 56,3 |
| Otros | 1573 | 16,8 |
| Sin dato | 592 | 6,3 |
| Cortante, corto punzante y punzante | 572 | 6,1 |
| Caídas | 543 | 5,8 |
| Ahorcamiento/ estrangulamiento/ sofocación | 474 | 5,1 |
| Quemadura por líquido hirviente | 153 | 1,6 |
| Proyectil de arma de fuego | 73 | 0,8 |
| Quemadura por fuego | 71 | 0,8 |
| Quemadura por Sustancias corrosivas | 28 | 0,3 |
| Mordedura | 3 | 0,0 |
| Intoxicación | 1 | 0,0 |
| Total | 9340 | 100,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

Violencia de género

El 22,17% (8348/37657) de los casos requirió hospitalización, siendo el 65,45% (5464/8348) del sexo femenino, afectando al 20,76% (5464/26324) de esta población.

Al evaluar el escenario de ocurrencia de los tipos de violencia podemos observar que la mayor frecuencia de ocurrencia de estas fue en la vivienda y en vía pública (ver tabla 32).

Tabla 32. Distribución de los casos de violencia de género según escenario de ocurrencia, en niños, niñas y adolescentes en Colombia, periodo XIII, 2015

| Escenario | Violencia sexual | Negligencia y abandono | Violencia física | Violencia psicológica | Total |
|--|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Vivienda | 10968 | 10055 | 6405 | 1140 | 28568 |
| Vía Pública | 1642 | 1158 | 2136 | 112 | 5048 |
| Centros educativos | 533 | 172 | 426 | 73 | 1204 |
| Espacios terrestres al aire libre (Bosque, potreros) | 726 | 150 | 84 | 4 | 964 |
| Otro | 672 | 247 | 84 | 21 | 1024 |
| Establecimiento comercial(tienda, centro comercial) | 298 | 85 | 127 | 7 | 517 |
| Lugares de esparcimiento con expendio de alcohol | 166 | 30 | 54 | 0 | 250 |
| Oficina | 18 | 9 | 15 | 0 | 42 |
| Sitio de diversión | 13 | 10 | 6 | 0 | 29 |
| (en blanco) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Deportivo | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Total | 15043 | 11917 | 9340 | 1357 | 37657 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

4.4 Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento

En cuanto al comportamiento de los indicadores de la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescente en el periodo XIII de 2015 encontramos la mayor incidencia en mujeres y mayor tasa de letalidad y mortalidad en niños, niñas y adolescentes. (ver tabla 33).

Violencia de género

Tabla 33. Indicadores de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes en Colombia, periodo XIII, 2015

| Indicadores | General | Indicadores | Mujeres | Indicadores | Niños, niñas y adolescentes |
|--|---------|---|---------|---|-----------------------------|
| Incidencia Nacional (73914/ 48203405 *100000) | 153,3 | Incidencia Nacional (57815 / 24403726 *100000) | 236,9 | Incidencia Nacional (37657 / 17208135 *100000) | 218,3 |
| Tasa de Letalidad (145 / 73914 *100) | 0,19% | Tasa de Letalidad (84 / 57815 *100) | 0,14% | Tasa de Letalidad (106/ 37657 *100) | 0,28% |
| Tasa de Mortalidad (145 / 48203405 *100.000) | 0,3 | Tasa de Mortalidad (84 / 24403726 *100.000) | 0,34 | Tasa de Mortalidad (106 / 17208135 *100.000) | 0,61 |


Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE.

Hasta la semana epidemiológica 52 se notificaron 1345 casos de violencia ocurridos dentro de Centros educativos en donde el 40,6% fueron por violencia sexual, el 38,1% por violencia física, 14,1% por negligencia y abandono y el 7,2 por violencia psicológica. El 89,5% de las personas agredidas fueron niños, niñas y adolescentes (ver tabla 34).

Tabla 34. Distribución de los casos de Violencia con lugar de ocurrencia centros educativos por grupos de edad en Colombia, periodo XIII, 2015

| VIOLENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Grupo de edad | Violencia sexual | Violencia física | Negligencia y abandono | Violencia psicológica | Total | % |
| 0 a 4 | 158 | 34 | 55 | 1 | 248 | 18,44 |
| 5 a 9 | 178 | 80 | 63 | 21 | 342 | 25,43 |
| 10 a 14 | 154 | 218 | 47 | 34 | 453 | 33,68 |
| 15 a 19 | 43 | 94 | 7 | 17 | 161 | 11,97 |
| 20 a 24 | 6 | 19 | 8 | 2 | 35 | 2,60 |
| 25 a 29 | 4 | 17 | 4 | 6 | 31 | 2,30 |
| 30 a 34 | 0 | 12 | 2 | 1 | 15 | 1,12 |
| 35 a 39 | 1 | 15 | 2 | 3 | 21 | 1,56 |
| 40 a 44 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0,89 |
| 45 a 49 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0,59 |
| 50 a 54 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0,67 |
| 55 a 59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,30 |
| 60 a 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,07 |
| > 65 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0,37 |
| Total general | 546 | 512 | 190 | 97 | 1345 | 100,0 |

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, 2015.

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | |


Violencia de género

5. DISCUSIÓN

La violencia contra la mujer es una práctica arraigada que tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de las mujeres; en Colombia a periodo epidemiológico XIII de 2015 se presenta una letalidad 0,20%, que afecta de manera predominante a las mujeres, quienes representan el 78,2% de los casos con una razón 3:1, es decir, por 3 mujeres víctimas de violencia, es afectado 1 hombre.

Por su complejidad, el acto violento, no es posible encontrarlo en formas “puras”, es decir que la violencia física o sexual no se acompañe de afectaciones psicológicas; teniendo en cuenta esto, los eventos de violencia reportados por el sector salud corresponde en orden de incidencia: agresiones de tipo físico las cuales representan el 50,0% de los registros, la violencia sexual con el 23,6%, violencia por negligencia y abandono con el 19,5% y violencia psicológica 6,6%. Se encuentran diferencias en los datos con el estudio realizado por OMS en 10 países (Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y la República Unida de Tanzania) donde se refleja el rango del porcentaje de las mujeres que han sufrido violencia física el cual oscila entre el 15 y el 30%; Violencia sexual entre el 10 y 50% y pese a la dificultad que supone cuantificar coherentemente el maltrato psicológico en las distintas culturas, se estima que entre el 20% y el 75% ha sufrido este tipo de violencia [6].

En los datos reportados se puede observar que en la violencia sexual los hombres son identificados como mayores perpetradores. Esto concuerda con el estudio realizado por la OMS (6), en el que se reporta que la violencia es perpetrada en su mayoría por hombres hacia mujeres y niñas. Adicional a esto, este informe refleja que la mayoría de los agresores son los compañeros permanentes, lo que significa que la forma de violencia más prevalente es la intrafamiliar. En el mismo estudio por OMS se afirma que a nivel mundial, cerca de un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja [6].

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | Página 41 de 44 |


Violencia de género

Los datos presentados revelan que existen diferencias significativas en cuanto al agresor para la violencia sexual y para la privación y negligencia. Mientras que para el primero, son los hombres como se mencionó anteriormente, para la privación y negligencia los resultados afirman que la mujer es en mayor proporción quien la ejecuta, aunque está relacionado al rol que desempeña la mujer; lo que se confirma con la teoría del “Círculo interactivo de la violencia familiar”, que la mujer víctima, como consecuencia del maltrato por parte de su pareja, padece una alta tasa de estrés, lo que puede generar un vínculo con su hijo en el que predomine este factor. Igualmente puede padecer síntomas psicológicos y físicos tales como angustia, trastornos depresivos y descompensaciones de procesos crónicos como diabetes o hipertensión arterial, que puede alterar con los hijos. Éstos, a su vez, también pueden estar expuestos a elevadas tasas de estrés, apareciendo o incrementándose en ellos síntomas y comportamientos consistentes en irritabilidad, trastornos afectivos, trastornos somatoformos, descargas agresivas, oposicionismo. Estas alteraciones, tanto en la madre como en los hijos, serán fuente de tensión y afectarán negativamente el vínculo materno-filial [7].

Las mujeres más jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 14 años presentan más riesgo de ser objeto de violencia sexual, mientras que para uno de los países objeto de estudio por la OMS, Bangladesh, el 48% de las mujeres entre 15 y 19 años son predominantemente vulnerables para esta modalidad de violencia. En Colombia, según los datos reportados al Sivigila el porcentaje de vulnerabilidad para este grupo de edad es del 42,5%.

6. CONCLUSIONES

Los esfuerzos de abordaje deben dirigirse no solo a la violencia física, la cual se caracteriza por su más fácil detección, sino también a las otras formas de violencia y en especial a la sexual, que si bien aparece en el segundo lugar en orden de frecuencia, no se debe desestimar su gravedad no solo por la profunda repercusión en la salud mental, que inclusive puede derivar en conductas suicidas; además de sus consecuencias físicas directas, representadas en las gestaciones no deseadas y las enfermedades de transmisión sexual.

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | |

Violencia de género

La forma de violencia con mayor incidencia es la intrafamiliar (pareja) a juzgar por los agresores, hallazgo que puede estar sesgado por la mayor posibilidad de denuncia para las personas adultas, en contraposición con los niños, las niñas o los ancianos. En más de la mitad de los casos se registra convivencia entre víctima y agresor, esta situación es menor en la violencia sexual.


7. RECOMENDACIONES

La gestión de conocimiento frente al fenómeno de la violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual es el punto de partida básico de su afrontamiento, por ello la información oportuna, confiable, verificada y veraz es indispensable para el diseño de intervenciones. En este sentido las Entidades Territoriales deben fortalecer los procesos de recaudo de datos y notificación del evento 875, y establecer estrategias locales de análisis donde no solo se involucre al sector salud, sino a las otras instituciones articuladas desde la ruta de atención y a la misma comunidad o sociedad civil.

Dado que los principios orientadores de la vigilancia de este evento, superan la visibilización del problema para centrarse en el seguimiento al restablecimiento de los derechos de las víctimas, se deben diseñar desde los niveles territoriales los mecanismos para ese seguimiento y reconocer para cada víctima el acceso efectivo a la atención interinstitucional que en el país se encuentra lo suficientemente normada.

La vigilancia de la violencia permite identificar grupos especialmente vulnerables o en alto riesgo sobre los que es posible el desarrollo de intervenciones específicas orientadas a contrarrestar consecuencias letales de la violencia.

Dado que el periodo de latencia en la violencia tarda en desarrollarse, es decir, una mujer puede tardar años antes de comenzar a hacer frente a la violencia en su vida, se recomienda continuar trabajando en políticas públicas que empoderen cada vez más a las mujeres con el fin de reducir este periodo de latencia. Numerosos estudios revelan que las redes informales como


| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | Versión: 02 |
| | | | 2014 – Jun – 25 |
| | | FOR-R02.4000-001 | Página 43 de 44 |

Violencia de género

la familia, los amigos y los vecinos son el primer punto de contacto de las mujeres víctimas de violencia, en lugar de los servicios oficiales como los servicios de salud, policía, organizaciones no gubernamentales de mujeres, entre otros [8].

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dahlberg LL, Krug EG. Violence a global public health problem. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2006; 11(2):277–292.
2. Frenk, J. Bobadilla, JL. Stern C. Lozano, R. Elements for a Theory of the Health Transition. *Health Transition Review*. 1991; 1:21-38
3. Organización Mundial de la Salud. Comunicado de prensa. Informe de la OMS “violencia contra las mujeres como un problema de salud mundial de proporciones epidémica. Ginebra, junio 20/2013.
4. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence.
5. <http://www.laprensa.com.ni/2013/05/21/internacionales/147548-la-violencia-en-america-latina-mal-endemico-o-expresion-de-la-desigualdad>
6. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Bogotá C. *Forensis: Datos para la vida 1999 - 2011*. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; 1999.
7. Organización Mundial de la Salud. Estudio multipaís sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer: primeros resultados sobre prevalencia, eventos relativos a la salud y respuestas de las mujeres a dicha violencia. 2010.

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|
|  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | PROCESO VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA | INFORME EVENTO | | Versión: 02 |
| | | FOR-R02.4000-001 | | 2014 – Jun – 25 |
| | | | | Página 44 de 44 |

Violencia de género

8. Pedreira, JL. La infancia en la familia con violencia: factores de riesgo y contenidos psicopatológicos. *Psiquiatría.com*. 2003; 7(4).

9. Ordoñez, MP. González, P. Las Víctimas invisibles de la violencia de género. *Rev Clin Med Fam* 2012; 5 (1): 30-36.