



Salud Sexual y Reproductiva

ENCUESTA LONGITUDINAL DE SALUD DE LAS MUJERES PROCEDENTES DESDE VENEZUELA EN COLOMBIA (ELSA-VENCOL)

Programa de Estabilización Comunitaria

Con el apoyo de:



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA





Objetivo

Describir la situación de salud, las necesidades en salud y el acceso efectivo a los servicios de atención en salud de mujeres nacionales venezolanas con estatus migratorio irregular,

entre 18 y 45 años



Con intención de permanencia en Colombia de al menos 1 año



Ingreso a Colombia por Cúcuta (a) o su área metropolitana: Villa del Rosario (b), Los Patios (c) o Puerto Santander (d)



Sin nacionalidad colombiana



No pendulares



Embarazadas

● Inicial (2298) ● Seguimiento (1297)





Puerperio*

● Inicial (2298) ● Seguimiento (1297)



Control prenatal **Sí**

● Inicial (2298) ● Seguimiento (1297)



* Puerperio: período de tiempo correspondiente a las 4-6 semanas posteriores al parto



Hospitalización durante el embarazo



En el embarazo actual

10 (6.2%) **9 (10.5%)**

● Inicial (162) ● Seguimiento (86)



En el embarazo que acaba de finalizar

7 (5.3%) **10 (10.8%)**

● Inicial (131) ● Seguimiento (92)

Educación sexual



Alguna vez en la vida

1342 (58.4%)

819 (63.1%)



En Colombia ^a


486 (36.2%)

448 (54.7%)

^a Pregunta evaluada sólo en quienes indicaron haber recibido educación sexual alguna vez en la vida



Temas más frecuentes en educación sexual ^a

● Inicial (1342) ● Seguimiento (819)



Fuente de la educación sexual en Colombia ^{b, c}

● Inicial (486) ● Seguimiento (448)



^a Se muestran las categorías que tienen los porcentajes más altos

^b Estas preguntas sólo se le hicieron a las mujeres que recibieron educación sexual en Colombia en al menos un tema

^c La sumatoria de las estimaciones no necesariamente da 100%, pues era una pregunta con respuesta múltiple

Conoce algún método anticonceptivo



Sí

2280 (99.2%)

Métodos más conocidos ^a

● Inicial (2298)



Anticonceptivos
orales

2246 (97.7%)



Esterilización
femenina

2230 (97.0%)



Inyección

2219 (96.6%)



DIU de cobre
u hormonal


2195 (95.5%)



Preservativo

2172 (94.5%)

^a Se muestran las categorías que tienen los porcentajes más altos





1766 (77.0%)

Uso de métodos anticonceptivos
Alguna vez en la vida

Métodos utilizados ^a

Anticonceptivos orales
761 (43.1%)

Esterilización Femenina
305 (17.3%)

Preservativo
298 (16.9%)

Uso actual de métodos anticonceptivos



Sí

1460 (63.5%)

934 (72.0%)

● Inicial (2298)

● Seguimiento (1297)

Métodos utilizados actualmente ^a


● Inicial (1460) ● Seguimiento (934)


Esterilización femenina
625 (42.8%)
412 (44.1%)

Implantes
295 (20.2%)
234 (25.1%)

Anticonceptivos orales
149 (10.2%)
73 (7.8%)

^a Se muestran las categorías que tienen los porcentajes más altos





Razón de no uso de método anticonceptivo

● Inicial (838) ● Seguimiento (363)




● Inicial (2298) ● Seguimiento (1297)

Conoce dónde conseguir un anticonceptivo



Lugar donde conseguir un anticonceptivo^{a,c}



Charlas de anticoncepción con un profesional de la salud en Colombia



^a Se muestran las categorías que tienen los porcentajes más altos

^c La sumatoria de las estimaciones no necesariamente da 100%, pues era una pregunta con respuesta múltiple



2222 (96.7%)

Ha oído hablar sobre el VIH o SIDA

Sí

Realización de prueba VIH



Alguna vez

2079 (90.5%)

1181 (91.1%)

● Inicial (2298)

● Seguimiento (1297)

Tiempo de la última prueba de VIH

En el último mes ^a

84 (6.5%)

Entre 12-23 meses

311 (15.0%)

Menos de 12 meses

626 (30.1%)

2 años o más

1142 (54.9%)

^a Esta estimación es hecha sólo en el seguimiento, de forma que el denominador es 1297



Inicial (2079)



Seguimiento (1181)



Conocimiento del resultado de la prueba

2057 (98.9%)

1166 (98.7%)

Sí



Inicial (2298)



Seguimiento (1297)



Conocimiento de lugar para prueba de VIH

836 (36.4%)

716 (55.2%)

Sí





¿Ha oído hablar de infecciones de transmisión sexual?

2211 (96.2%)

Sí



ITS

42 (1.8%)

65 (5.0%)

En el último mes



Tratamiento para ITS

27 (64.3%)

47 (72.3%)

Sí



Le comunicó a su pareja que tenía una ITS

20 (47.6%)

25 (38.5%)

Sí



Intentó evitar contagiar a la pareja

19 (45.2%)

16 (24.6%)

Sí

● Inicial (2298)

● Seguimiento (1297)



ENCUESTA LONGITUDINAL DE SALUD DE LAS MUJERES PROCEDENTES DESDE VENEZUELA EN COLOMBIA (ELSA-VENCOL)

Con el apoyo de:



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



OIM
ONU MIGRACIÓN



**UNIVERSIDAD
DEL NORTE**

Vigilada Mineducación