

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD CON CARGO A LA UPC

FASE 1 DE NOMINACIÓN

Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.

Bogotá.

Julio de 2018.

A continuación, se presentan los resultados de la fase de nominación de tecnologías en salud en el marco de la Actualización Integral del plan de beneficios en salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (PBSUPC).

TECNOLOGÍAS EN SALUD ACEPTADAS

Esta es la lista de tecnologías en salud que cumplieron con los requisitos establecidos para la nominación de tecnologías en salud para posible inclusión al PBSUPC.

NOMBRE DEL NOMINADOR	NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA	INDICACIÓN DE USO DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA
ACHO (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA)	ESTUDIOS MOLECULAR, CITOGENÉTICA Y ONCOGENES EN BIOPSIA	ESTUDIOS PARA DEFINIR LA SUBLASIFICACIÓN Y EL PRONÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD NEOPLÁSICA
AMGEN BIOTECNOLOGICA SAS	PANITUMUMAB	PANITUMUMAB ES UN MEDICAMENTO PARA SER USADO EN TERAPIA COMBINADA DE QUIMIOTERAPIA, EN PACIENTES CON CARCINOMA COLORRECTAL METASTASICO QUE EXPRESA EGFR CON RAS NO MUTADO (TIPO SILVESTRE), DE PRIMERA LÍNEA O DESPUÉS DE FALLA DE REGÍMENES DE QUIMIOTERAPIA QUE CONTIENEN FLUOROPIRIDINA, OXALIPLATINO E IRINOTECAN.
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COLOPROCTOLOGIA		CANCER COLORECTAL METASTASICO RAS WT
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INFECTOLOGÍA (ACIN) CAPÍTULO SUROCCIDENTE	ANIDULAFUNGINA	TRATAMIENTO DE LA CANDIDEMIA Y OTRAS FORMAS DE INFECCIONES SEVERAS POR CANDIDA, INCLUYENDO ABSCESOS INTRA ABDOMINALES Y PERITONITIS
	VORICONAZOL	TRATAMIENTO DE INFECCIONES SISTÉMICAS CAUSADAS POR CÁNDIDA, FUSARIUM SPP, SCEDOSPORIUM SSP, ASPERGILOSIS.

NOMBRE DEL NOMINADOR	NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA	INDICACIÓN DE USO DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA
ASOCIACION COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA	ADALIMUMAB	ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL: ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL POLIARTICULAR EN PACIENTES DE DOS AÑOS DE EDAD O MAYORES (M080 ARTRITIS REUMATOIDEA JUVENIL). ARTRITIS RELACIONADA CON ENTESITIS EN PACIENTES DE SEIS AÑOS DE EDAD MAYORES (M088 OTRAS ARTRITIS JUVENILES, M081 ESPONDILITIS ANQUILOSANTE JUVENIL)
	ADALIMUMAB	PACIENTES ADULTOS CON ESPONDILOARTRITIS: ESPONDILITIS ANQUILOSANTE, ESPONDILOARTRITIS AXIAL NO RADIOGRÁFICA Y ARTRITIS PSORIÁSICA, CON RESPUESTA INADECUADA A TERAPIA CONVENCIONAL O QUE PRESENTEN INTOLERANCIA A ELLA.
	CITRATO DE TOFACITINIB 8,078MG EQUIVALENTE A TOFACITINIB	ARTRITIS REUMATOIDE ACTIVA DE MODERADA A SEVERA
	ETANERCEPT	PACIENTES ADULTOS CON ESPONDILOARTRITIS: ESPONDILITIS ANQUILOSANTE, ESPONDILOARTRITIS AXIAL NO RADIOGRÁFICA Y ARTRITIS PSORIÁSICA CON RESPUESTA INADECUADA A TERAPIA CONVENCIONAL O QUE PRESENTEN INTOLERANCIA A ELLA. NOTA ACLARATORIA: ESTAS TRES DIAGNÓSTICOS SON SUPTIPOS DE LA ESPONDILOARTRITIS
	SECUKINUMAB	PACIENTES ADULTOS CON ESPONDILOARTRITIS: ESPONDILOARTRITIS: ESPONDILITIS ANQUILOSANTE Y ARTRITIS PSORIÁSICA CON RESPUESTA INADECUADA A TERAPIA CONVENCIONAL O QUE PRESENTEN INTOLERANCIA A ELLA.
ASTELLAS FARMA COLOMBIA	MIRABEGRON	TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE LA URGENCIA, AUMENTO DE LA FRECUENCIA MICCIONAL Y/O INCONTINENCIA DE URGENCIA QUE SE PUEDE PRESENTAR EN PACIENTES ADULTOS CON SÍNDROME DE VEJIGA HIPERACTIVA.
BAYER ANDINA S.A.	RIVAROXABÁN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 MG	RIVAROXABAN ES UN INHIBIDOR DIRECTO DEL FACTOR X ACTIVADO. XARELTO ESTÁ INDICADO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y EMBOLISMO SISTÉMICO EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR.
	AFLIBERCEPT, SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN INTRAVÍTREA, 2 MG (40MG/ML)	DEGENERACIÓN MACULAR RELACIONADA CON LA EDAD, DMRE, MODALIDAD HÚMEDA EDEMA MACULAR DIABÉTICO
	ILOPROST	HIPERTENSIÓN PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA, HPTC
	NEXAVAR® PRINCIPIO ACTIVO: SORAFENIB COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 200 MG	CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIROIDES (PAPILAR/FOLICULAR/ DE CÉLULAS DE HURTHLE) EN PROGRESIÓN, LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO, RESISTENTE AL TRATAMIENTO CON YODO RADIATIVO
	RIOCIGUAT	RIOCIGUAT ES EL PRIMER ESTIMULADOR ORAL DE LA GUANILATO CICLASA SOLUBLE (GCS) QUE A SU VEZ INCREMENTA LOS NIVELES DE GUANOSINA-MONOFOSFATO CÍCLICA, GMPC, ENZIMA RESPONSABLE DE MÚLTIPLES FUNCIONES EN EL SISTEMA CARDIOPULMONAR Y SOBRE EL RECEPTOR DE ÓXIDO NÍTRICO, ON. TANTO LA GMPC COMO EL ON TIENEN EFECTOS PROMINENTES EN EL BALANCE DE VASOCONSTRICTORES Y VASODILADORES ENDÓGENOS, MECANISMO QUE SE ALTERA EN EL CURSO DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR SECUNDARIA A TROMBOEMBOLISMO PULMONAR CRÓNICO, (CTEPH) COMO A LA HIPERTENSIÓN PULMONAR, (HTP).

NOMBRE DEL NOMINADOR	NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA	INDICACIÓN DE USO DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA
	RIVAROXABÁN	INHIBIDOR DIRECTO DEL FACTOR XA DE LA COAGULACIÓN, XARELTO ESTÁ INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP) Y EMBOLISMO PULMONAR (EP), Y PARA LA PREVENCIÓN DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP) Y EL EMBOLISMO PULMONAR (EP) RECURRENTES.
	SISTEMA INTRAUTERINO DE LIBERACIÓN DE LEVONORGESTREL (DIU HORMONAL) DE 52 MG CON UNA DURACIÓN DE CINCO (5) AÑOS.	PREVENCIÓN DE EMBARAZO
CARLOS JOSÉ CASTRO ESPINOZA	VACUNA CONTRA CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS CIMAVAX EGF	INDICADO EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS, EN ESTADIOS AVANZADOS (IIIB/IV), CON UNA DOSIS PREVIA DE CICLOFOSFAMIDA.
COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA CNB - COLOMBIA	ELUCIÓN (DISOCIACIÓN) AUTÓLOGA O ALOGÉNICA POR MEDIOS FÍSICOS	LAS TÉCNICAS DE ELUCION SE USAN PARA EL ESTUDIO DE ERITROCITOS QUE HAN SIDO PREVIAMENTE SENSIBILIZADOS CON PROTEINAS (ANTICUERPOS, FRACCIONES DE COMPLEMENTO) IN VIVO O IN VITRO EN DIFERENTES PATOLOGIAS COMO ANEMIA HEMOLITICA AUTOINMUNE(AHAI), ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL FETO Y RECIEN NACIDO (EHFRN), FENOMENOS HEMOLITICOS POR MEDICAMENTOS. Y EN PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO COMO ESTUDIO DE SUBGRUPOS SANGUINEOS DÉBILES, MEZCLA DE ALOANTICUERPOS.
	ELUCIÓN (DISOCIACIÓN) AUTÓLOGA O ALOGÉNICA POR MEDIOS QUÍMICOS	LAS TÉCNICAS DE ELUCION SE USAN PARA EL ESTUDIO DE ERITROCITOS QUE HAN SIDO PREVIAMENTE SENSIBILIZADOS CON PROTEINAS (ANTICUERPOS, FRACCIONES DE COMPLEMENTO) IN VIVO O IN VITRO EN DIFERENTES PATOLOGIAS COMO ANEMIA HEMOLITICA AUTOINMUNE(AHAI), ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL FETO Y RECIEN NACIDO (EHFRN), FENOMENOS HEMOLITICOS POR MEDICAMENTOS. Y EN PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO COMO ESTUDIO DE SUBGRUPOS SANGUINEOS DÉBILES, MEZCLA DE ALOANTICUERPOS.
DILIA MARIELA ACERO DE ROMERO	PANITUMUMAB	CÁNCER COLORECTAL METASTÁSICO
ELENA CASAS OCAMPO	CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM	ESTÁ INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES DE 18 AÑOS DE EDAD O MAYORES EN INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO COMPLICADAS, (CUTI POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), INCLUYENDO PIELONEFRITIS, CON O SIN BACTEREMIA CONCURRENTES, CAUSADAS POR LOS SIGUIENTES MICROORGANISMOS GRAM-NEGATIVOS: ESCHERICHIA COLI, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PROTEUS MIRABILIS Y PSEUDOMONAS AERUGINOSA.
	FOSFATO DE SITAGLIPTINA	MONOTERAPIA: JANUVIA® ESTÁ INDICADO COMO COMPLEMENTO DE LA DIETA Y EL EJERCICIO PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA GLICEMIA EN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. TERAPIA COMBINADA CON METFORMINA: JANUVIA® ESTÁ INDICADO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA GLICEMIA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA COMO TERAPIA INICIAL O

NOMBRE DEL NOMINADOR	NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA	INDICACIÓN DE USO DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA
		<p>CUANDO LA DIETA Y EL EJERCICIO MÁS UN ÚNICO AGENTE NO PROPORCIONAN UN CONTROL GLICÉMICO ADECUADO. TERAPIA COMBINADA CON SULFONILUREA: JANUVIA® ESTÁ INDICADO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA GLICEMIA EN COMBINACIÓN CON UNA SULFONILUREA CUANDO LA DIETA Y EL EJERCICIO MÁS UN ÚNICO AGENTE NO PROPORCIONAN UN CONTROL GLICÉMICO ADECUADO. TERAPIA COMBINADA CON UN AGONISTA DE PPARG: JANUVIA® ESTÁ INDICADO EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA GLICEMIA EN COMBINACIÓN CON UN AGONISTA DE PPARG (POR EJEMPLO, LA TIAZOLIDINEDIONA) COMO TERAPIA INICIAL O CUANDO LA DIETA Y EL EJERCICIO MÁS UN ÚNICO AGENTE NO PROPORCIONAN UN CONTROL GLICÉMICO ADECUADO. TERAPIA COMBINADA CON METFORMINA Y UNA SULFONILUREA: JANUVIA® ESTÁ INDICADO EN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA GLICEMIA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA Y UNA SULFONILUREA CUANDO LA TERAPIA DUAL CON ESOS AGENTES MÁS DIETA Y EJERCICIO NO PROPORCIONAN UN CONTROL GLICÉMICO ADECUADO. TERAPIA COMBINADA CON METFORMINA Y UN AGONISTA DE PPARG: JANUVIA® ESTÁ INDICADO EN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA GLICEMIA EN COMBINACIÓN CON METFORMINA Y UN AGONISTA PPARG (POR EJEMPLO, LA TIAZOLIDINEDIONA) CUANDO LA TERAPIA DUAL CON ESOS AGENTES MÁS DIETA Y EJERCICIO NO PROPORCIONAN UN CONTROL GLICÉMICO ADECUADO. TERAPIA COMBINADA CON INSULINA: JANUVIA® ESTÁ INDICADO EN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 COMO COMPLEMENTO DE LA DIETA Y EL EJERCICIO PARA MEJORAR EL CONTROL GLICÉMICO EN COMBINACIÓN CON INSULINA (CON O SIN METFORMINA).</p>
ELI LILLY INTERAMÉRICA, INC	IXEKIZUMAB	TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE LA PSORIASIS EN PLACAS MODERADA A SEVERA EN PACIENTES ADULTOS CANDIDATOS A TERAPIA SISTÉMICA QUE SON NO RESPONDEDORES O INTOLERANTES A AGENTES SISTÉMICOS NO BIOLÓGICOS
GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.	FUROATO DE FLUTICASONA / VILANTEROL	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)
	FUROATO DE FLUTICASONA / VILANTEROL	ASMA
MARTHA LUCIA GUALTERO REYES	PANITUMUMAB	CÁNCER COLORECTAL METASTÁSICO SIN MUTACIÓN RAS
MERCK S.A	CETUXIMAB	ESTÁ INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CÁNCER DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE CABEZA Y CUELLO, EN COMBINACIÓN CON RADIOTERAPIA PARA LA ENFERMEDAD LOCALMENTE AVANZADA

NOMBRE DEL NOMINADOR	NOMBRE DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA	INDICACIÓN DE USO DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA
NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.	INDACATEROL/GLICOPIRRONIO	ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA - EPOC,
	SECUKINUMAB	PSORIASIS EN PLACAS
NOVO NORDISK COLOMBIA SAS	FACTOR VIIA RECOMBINANTE DE COAGULACION (RFVIIA) EPTACOG ALFA ACTIVADO	HEMOFILIA CONGÉNITA O CON INHIBIDORES DE LOS FACTORES DE COAGULACIÓN VIII Y IX
	LIRAGLUTIDA	'VICTOZA® ESTÁ INDICADO COMO COMPLEMENTO DE LA DIETA Y EL EJERCICIO PARA LOGRAR UN CONTROL GLUCÉMICO EN ADULTOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. VICTOZA® ESTÁ INDICADO PARA UNA ADMINISTRACIÓN UNA VEZ AL DÍA: MONOTERAPIA, TRATAMIENTO COMBINADO CON UNO O MÁS ANTIDIABÉTICOS ORALES (METFORMINA, SULFONILUREAS O TIAZOLIDINEDIONA) CUANDO EL TRATAMIENTO ANTERIOR NO CONSIGUE UN CONTROL GLUCÉMICO ADECUADO. TRATAMIENTO COMBINADO CON INSULINA EN PACIENTES QUE NO LOGRAN UN ADECUADO CONTROL GLUCÉMICO, CON VICTOZA® Y METFORMINA.
PFIZER S.A.S.	ANIDULAFUNGINA	TRATAMIENTO DE LA CANDIDEMIA Y OTRAS FORMAS DE INFECCIONES SEVERAS POR CANDIDA, INCLUYENDO ABSCESOS INTRA ABDOMINALES Y PERITONITIS
	APIXABAN	REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, EMBOLIA SISTÉMICA Y MUERTE EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR
	VORICONAZOL	TRATAMIENTO DE INFECCIONES SISTÉMICAS CAUSADAS POR CÁNDIDA, FUSARIUM SPP, SCEDOSPORIUM SSP, ASPERGILOSIS.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR	RIVAROXABÁN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 MG	RIVAROXABAN ES UN INHIBIDOR DIRECTO DEL FACTOR X ACTIVADO. XARELTO ESTÁ INDICADO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y EMBOLISMO SISTÉMICO EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR.
	TRIMETAZIDINA	ANTIANGINOSO
	BISOPROLOL	HIPERTENSIÓN Y FALLA (INSUFICIENCIA) CARDIACA
	CANDESARTAN	MEDICAMENTO ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II PARA EL MANEJO Y DISMINUCION DE LA MORTALIDAD EN FALLA CARDIACA Y PARA PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA
	CLORTALIDONA	HIPERTENSIÓN ARTERIAL ESENCIAL Ó NEFROGÉNICA Ó SISTOLÍTICA AISLADA, COMO TERAPIA PRIMARIA EN COMBINACIÓN CON OTROS AGENTES ANTIHIPERTENSIVOS
	DABIGATRAN	FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR
	NT PRO BNP	INSUFICIENCIA CARDIACA
	SACUBITRIL/ VALSARTAN	INSUFICIENCIA CARDIACA
	TICAGRELOR	SINDROME CORONARIO AGUDO

Elaboración propia a partir de la información de Mi Vox-Pópuli