


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002-2007

CORRECCIONES A GRÁFICAS Y TABLAS TOMO III

MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA


31. Página 45:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Colombia 2007.

Gráfico 1.1. Autopercepción del estado de salud en los últimos 30 días en la población entre 6 y 69 años. Colombia ENS-2007. N=36.639.893


32. Página 46:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Colombia 2007.

Gráfico 1.2. Percepción de salud de la población entre 6 y 69 años según la ENS-2007. Distribución porcentual por grupo quinquenal de edad, Colombia 2007.


33. Página 48:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Colombia 2007.

Gráfico 1.3. Percepción de problemas relacionados con la salud en los últimos 30 días en población de 6 a 69 años en la ENS 2007, por grupo quinquenal de edad. Distribución porcentual. Colombia 2007.

34. Página 52:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Colombia 2007.

Gráfico 1.4. Prevalencia de condiciones crónicas diagnosticadas por médico en el último año para la población entre 6 y 69 años por grupo de edad, según información suministrada por los encuestados. Colombia, ENS-2007.

35. Página 59:

Cuadro 1.10. Prevalencia (%) de condiciones crónicas de interés en salud pública (incluidas en el estudio) diagnosticadas por médico alguna vez en la vida con base en la información suministrada por los encuestados, según sexo y región. Colombia, ENS-2007

Sexo	Condiciones crónicas diagnosticadas por médico	Atlántica	Oriental	Central	Pacífica	Bogotá	Orinoquia y Amazonia
Ambos sexos	Enfermedad del corazón	1,9	2,9	2,9	2,8	3,8	2,3
	Hipertensión	7,5	7,3	9,1	8,9	8,4	6,7
	Asma	4,2	3,6	5,2	4,6	3,5	3,6
	Tuberculosis	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1	0,3
	Enfisema	0,4	0,9	0,7	1,0	1,5	1,4
	Diabetes	2,1	3,5	2,4	2,8	3,0	2,0
	Úlcera digestiva	2,7	7,9	5,8	5,2	9,7	8,4
	Colon irritable	5,9	4,7	6,1	5,0	7,2	4,0
	VIH	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	Epilepsia	0,7	0,6	1,0	1,2	0,7	0,8
	Cáncer	0,4	0,6	0,7	0,6	1,0	0,5
	Otra enfermedad crónica que no se cura	2,4	2,7	3,8	5,3	3,9	4,2
Hombres	Enfermedad del corazón	1,4	3,3	2,9	2,1	3,7	2,1
	Hipertensión	5,9	5,5	6,8	6,6	5,8	5,4
	Asma	4,2	3,1	4,8	4,7	3,2	3,7
	Tuberculosis	0,1	0,1	0,4	0,3	0,2	0,3
	Enfisema	0,4	0,9	0,8	0,9	1,4	1,5
	Diabetes	1,9	2,7	1,9	2,5	2,2	1,7
	Úlcera digestiva	2,4	5,6	3,7	3,8	6,8	6,5
	Colon irritable	2,8	2,1	2,6	2,9	4,1	3,0
	VIH	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
	Epilepsia	0,8	0,6	1,1	0,9	0,7	0,7
	Cáncer	0,2	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2
	Otra enfermedad crónica que no se cura	2,0	2,2	2,3	4,0	2,6	3,4
Mujeres	Enfermedad del corazón	2,2	2,5	2,9	3,4	3,9	2,5
	Hipertensión	9,1	8,9	11,1	11,1	10,7	7,9
	Asma	4,2	4,1	5,6	4,5	3,7	3,6
	Tuberculosis	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,4
	Enfisema	0,4	0,8	0,5	1,1	1,7	1,3
	Diabetes	2,3	4,1	2,9	3,1	3,7	2,4
	Úlcera digestiva	2,9	10,0	7,7	6,4	12,3	10,2
	Colon irritable	9,0	7,1	9,3	7,1	9,9	4,8
	VIH	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
	Epilepsia	0,7	0,5	1,0	1,4	0,6	0,8
	Cáncer	0,5	0,9	1,1	0,9	1,7	0,7
	Otra enfermedad crónica que no se cura	2,8	3,2	5,1	6,5	5,0	4,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2007


36. Página 71:

Cuadro 2.1. Valoración del grado de limitación experimentado en los 30 días anteriores a la encuesta, según el tipo de dificultad declarado por el entrevistado. Distribución porcentual. Colombia ENS-2007

Dificultad para	%Total Algún grado de dificultad	Leve %	Moderada %	Severa %	Extrema %
Mantenerse concentrado haciendo algo por diez minutos	13,8	9,5	2,8	0,9	0,6
Aprender algo nuevo, como por ejemplo, aprender cómo llegar a un nuevo lugar	9,9	6,3	2,2	0,7	0,6
Estar de pie durante largos períodos de tiempo, como por ejemplo 30 minutos	16,0	8,9	4,6	1,8	0,7
Caminar largas distancias, como un kilómetro o algo equivalente	15,5	8,0	4,8	1,9	0,8
Bañarse (lavarse todo el cuerpo)	2,4	1,2	0,6	0,3	0,3
Vestirse	2,6	1,3	0,6	0,3	0,3
Relacionarse con personas que no conoce	6,4	4,1	1,4	0,5	0,4
Mantener una amistad	3,9	2,3	0,8	0,4	0,4
Realizar bien las actividades de la casa	6,2	3,3	1,9	0,6	0,4
Para realizar su trabajo, estudio o actividad diaria	10,1	5,0	3,2	1,0	0,9
Participar, al mismo nivel que el resto de las personas, en actividades de la comunidad (fiestas, reuniones o actividades religiosas)	4,6	2,6	1,2	0,3	0,4

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Colombia 2007. Estimadores expandidos.


37. Página 88:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2007

Gráfico 3.1. Distribución de las causas percibidas de dolor de espalda y cuello en quienes manifestaron sentirlo en la última semana. Colombia, 2007.


38. Página 89:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2007

Gráfico 3.2. Proporción de personas que reportaron dolor de espalda o cuello en los últimos siete días según situación laboral y sexo. Colombia, 2007


39. Página 90:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2007

Gráfico 3.3. Distribución de la frecuencia de dolor de espalda o cuello en la última semana según clasificación del SISBEN (1 a 4) y el sexo. Colombia, 2007.


40. Página 129:



Fuente: DANE, registros de mortalidad, Colombia, 1985-2006.

Gráfico 5.4. Tasas de mortalidad por año (ajustadas con base en la población estándar de la OMS). Colombia, 1985-2006


41. Página 148:



Fuente: DANE. Colombia, 1980-2004.

Gráfico 6.1. Tendencia de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. DANE-Colombia 1980-2004.


42. Página 153:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.

Gráfico 6.2. Hipertensión arterial según grupos de edad. Colombia, 2007.


43. Página 154:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007

Gráfico 6.3. Hipertensión arterial según estrato socioeconómico. Colombia, 2007.


44. Página 154:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.

Gráfico 6.4. Proporción de personas físicamente activas según estrato socioeconómico. Colombia, 2007.


45. Página 155:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.

Gráfico 6.5. Proporción de personas con hiperlipidemia según estrato socioeconómico. Colombia, 2007.


46. Página 155:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.

Gráfico 6.6. Tabaquismo activo según estrato socioeconómico. Colombia, 2007.


47. Página 157:



Fuente: DANE. Colombia, 2005.

Gráfico 6.7. Tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular según departamento. Por cien mil habitantes. DANE Colombia, 2005.

48. Página 174:




F

uente: Cálculo de los investigadores a partir de las estadísticas vitales. DANE, 1980 – 2006.

Gráfico 7.1. Tendencia de la mortalidad por diabetes. DANE Colombia 1980-2006.


49. Página 175:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de las estadísticas vitales. DANE, 1980 – 2006.

Gráfico 7.2. Mortalidad por diabetes según sexo. DANE Colombia 1980 -2006.


50. Página 175:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.

Gráfico 7.4. Proporción de personas con diabetes según nivel educativo alcanzado. Colombia, 2007.

51. Página 195:

Índice de Masa Corporal (IMC) (kg/m²)

IMC	
No.	13.145
Mínimo	12,6
Máximo	51,7
Media	25,2
Mediana	24,6
Moda	26,2
D.E	4,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.**Gráfico 8.1.** Distribución de frecuencias y estadísticas descriptivas para el Índice de Masa Corporal. Colombia, 2007

Página 196:


Cuadro 8.1. Prevalencia de sobrepeso graso según distintos indicadores. Antioquia, 2009.

Variables	General	Hombres	Mujeres
Exceso de grasa*	78,1	56,0	88,4
Peso relativo	31,6	21,4	36,3
IMC	38,4	37,7	38,7
Cintura/cadera	39,6	8,2	54,1
Cintura	38,4	23,3	45,3
PGA	72,2	54,7	80,2

* Exceso de grasa > 0 kg, peso relativo >120%, IMC>25, PGA(>20 mm), cin/cad (>8 mujeres y >1 hombres), cintura (>80 mujeres y >94 hombres)

Fuente: Martínez. Obesidad: Una tendencia creciente a través de la vida adulta. Memorias VI Congreso Internacional de Salud Publica, 2009.


52. Página 243:



Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia y DANE.

Gráfico 10.4. Mortalidad por eventos de tránsito. Colombia. 1989-2008. Tasa x 100.000 habitantes.


53. Página 246:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.

Gráfico 10.7. Razones para no consultar luego de sufrir una lesión de tránsito. Colombia, 2007


Página 247:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.

Gráfico 10.8. Tipo de transitoriedad de las personas lesionadas en eventos de tránsito. Colombia, 2007.


Página 248:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.

Gráfico 10.9. Vehículos involucrados según zona urbana y resto (Incluye zona rural y pequeños poblados). Colombia, 2007.

Página 249:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.

Gráfico 10.10. Percepción de factores asociados al evento en cabeceras y resto (otros lugares). Colombia, 2007.

54. Página 269:

Cuadro 11.5. Razones de disparidad (IC95%) de factores asociados a diferentes formas de violencia interpersonal. Valle de Aburra, 2004.

FACTOR O VARIABLE	Robo sin arma en la vida	Engaño estafa en el último año	Agresión física sin arma en el último año	Amenazas en el último año	Amenaza severa en la vida	Amenaza con arma en la vida	Agresión física con arma en la vida
FACTORES PROTECTORES							
Actitud de colaboración con la autoridad	-	-	-	0,76 (0,59 - 0,98)	-	-	0,54 (0,31 - 0,92)
Edad	0,63 (0,52 - 0,76)	0,66 (0,55 - 0,78)	0,81 (0,72 - 0,92)	0,79 (0,71 - 0,88)	-	-	1,42 (1,12 - 1,79)
Confianza y vigilancia de la madre	0,51 (0,26 - 1,01)	0,30 (0,16 - 0,55)	0,33 (0,22 - 0,49)	0,53 (0,37 - 0,76)	0,10 (0,03 - 0,28)	0,07 (0,03 - 0,16)	0,17 (0,07 - 0,37)
Percepción de participación del control social en el barrio	0,34 (0,14 - 0,83)	0,46 (0,23-0,89)	0,50 (0,33 - 0,76)	0,36 (0,25 - 0,54)	-	-	-
FACTORES DE RIESGO: INDIVIDUALES							
Actitudes machistas	7,43 (3,91 - 14,1)	6,00 (3,15 - 11,4)	2,49 (1,61 - 3,85)	1,63 (1,07 - 2,49)	5,81 (2,61-12,9)	2,73 (1,38 - 5,40)	-
Aprobación de conseguir dinero por las vías no legales	14,00 (7,20 - 27,5)	8,13 (4,20 - 15,7)	-	2,83 (1,77 - 4,52)	7,75 (3,26 - 18,4)	7,17 (3,46 - 14,8)	7,52 (3,19 - 17,7)
Estrato socioeconómico	-	1,3 (1,02 - 1,64)	0,80 (0,69 - 0,94)	-	-	-	-
Aprobación de uso de la violencia, asesinato para defensa de la comunidad	-	-	1,47 (1,10 - 1,97)	-	-	-	-
Índice de desempleo en el último año	-	-	1,41 (1,14 - 1,74)	1,39 (1,10 - 1,74)	-	2,02 (1,41 - 2,87)	-
Percepción de que no se podrán satisfacer las expectativas de solidaridad social consideradas prioritarias	4,72 (2,21 - 10,0)	-	-	-	-	-	-
Desconfianza en los demás	-	-	2,08 (1,42 - 3,05)	1,64 (1,17 - ,28)	-	-	-
Percepción de que no se podrán satisfacer los bienes materiales y hedonismo considerados prioritarios	-	-	8,72 (1,85 - 40,9)	-	-	-	-
Percepción de que no se podrán satisfacer las expectativas de educación superior consideradas prioritarias	-	-	1,89 (1,37 - 2,60)	1,96 (1,46 - 2,63)	-	-	-
Legitimación de la violencia como mecanismo de protección o reacción al conflicto	-	2,92 (1,49 - 5,68)	-	2,01 (1,26 - 3,20)	-	3,02 (1,45 - 6,28)	-
Legitimación del uso de la violencia como método de educación	-	-	3,23 (2,03 - 5,15)	2,71 (1,75 - 4,18)	-	-	-
Hombre	1,46 (1,08 - 1,96)	2,09 (1,58 - 2,77)	0,53 (0,44 - 0,64)	-	3,80 (2,41-5,98)	3,07 (2,20 - 4,28)	5,22 (3,34 - 8,14)
Índice de desempleo en la vida	-	-	-	1,66 (1,09 - 2,52)	-	-	2,98 (1,29 - 6,86)
Legitimación del uso de la violencia para defensa de la familia y la sociedad	-	-	-	-	2,59 (1,22 - 5,48)	1,85 (1,00 - 3,42)	3,24 (1,59 - 6,59)
FACTORES DE RIESGO: FAMILIA							
Maltrato físico por la madre	2,05 (1,04 - 4,01)	-	3,06 (2,09 - 4,48)	3,35 (2,34 - 4,81)	-	2,77 (1,43 - 5,33)	2,23 (1,01 - 4,93)
Padre aplicaba castigo físico	-	-	-	2,56 (1,04 - 6,28)	-	--	4,37 (0,92 - 20,7)
FACTORES DE RIESGO: BARRIO							
Percepción de violencia en el barrio	4,69 (2,39 - 9,19)	6,40 (3,46 - 11,8)	4,57 (3,03 - 6,88)	4,26 (2,93 - 6,20)	13,20 (5,97 - 29,3)	7,07 (3,68 - 13,5)	6,84 (3,08 - 15,1)
Percepción, cuidado y vigilancia social del barrio	-	-	-	-	-	2,91 (1,00 - 8,43)	-

Fuente: Encuesta de violencia y comportamientos de riesgo. PREVIVA. Universidad de Antioquia. 2003-2004.

55. Página 284:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS 2007.

Grafico 11.6. Porcentaje de consumo de licor y drogas por el agresor y la víctima durante la agresión según sexo de la víctima. Colombia, 2007.