


ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA, 2002-2007

CORRECCIONES A GRÁFICAS Y TABLAS TOMO VI

ANÁLISIS DE DESIGUALDADES E INEQUIDADES EN SALUD EN COLOMBIA


74. Página 42:



Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina-2008

Gráfico 1.1. Comparación del Índice de Gini entre el 2002 y el 2007 en países de Latinoamérica.


Página 42:



Fuente: PNUD, Informes de Desarrollo Humano 2003-2009

Gráfico 1.2. Primeros tres lugares de inequidad por ingresos en Latinoamérica medida por el Índice de Gini, 2003-2009


Página 45:



Fuente: Reducing Health Disparities –Roles of the Health Sector: Discussion Paper - 2005

Gráfico 1.3. Relación entre estado de salud y estatus socioeconómico


75. Página 63:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Gráfico 2.1. Distribución porcentual de la población por nivel de su estado de salud percibido, según grupos de edad. Colombia, 2007


76. Página 74:



Fuente: OMS, 2001

Gráfico 3.1. Interacciones entre los componentes de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF)


77. Página 77:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Gráfico 3.2. Prevalencia de la discapacidad percibida relativa a las actividades y participación, por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007


78. Página 78:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Gráfico 3.3. Prevalencia de la discapacidad percibida relativa a las actividades y participación, por intensidad de la misma, zona y sexo. Colombia, 2007


79. Página 79:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Gráfico 3.4. Prevalencia de la discapacidad percibida relativa a las actividades y participación en la zona urbana por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007


80. Página 79:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Gráfico 3.5. Prevalencia de la discapacidad percibida relativa a las actividades y participación en la zona rural por intensidad de la misma y grupo de edad. Colombia, 2007


81. Página 80:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Gráfico 3.6. Prevalencia de la discapacidad percibida relativa al funcionamiento por intensidad y tipo de la misma. Colombia, 2007


82. Página 81:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Grafico 3.7. Prevalencia de discapacidad física para personas de 45 a 69 años, con y sin diagnóstico de diabetes. Colombia, 2007


83. Página 82:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Grafico 3.8. Prevalencia de discapacidad física de la población de 12 a 69 años, con y sin accidentes de tránsito. Colombia, 2007


84. Página 84:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Grafico 3.9. Prevalencia de discapacidad percibida relativa a las actividades y participación, por grupo de edad y estrato socioeconómico. Colombia, 2007


85. Página 85:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Grafico 3.10. Prevalencia de discapacidad por grupos de edad y años de educación. Colombia, 2007


86. Página 86:



Fuente: Cálculo de los investigadores a partir de la Encuesta Nacional de Salud, 2007

Gráfico 3.11. Prevalencia de discapacidad severa o extrema por grupos de edad y años de educación. Colombia, 2007


87. Página 98:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.3. Riesgo para EDA por falta de acueducto por área. Colombia, 2007.


Página 98:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.4. Riesgo para EDA por falta de acueducto por región. Colombia, 2007.


Página 99:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.5. Riesgo para EDA por falta de acueducto según número de habitantes. Colombia, 2007.


88. Página 100:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.6. Riesgo de EDA por no recolección de basuras, según área de residencia. Colombia, 2007.


Página 100:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.7. Riesgo de EDA por no recolección de basuras, según región. Colombia, 2007.

89. Página 101:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.8. Riesgo de EDA por número de habitantes que no poseen servicios de recolección de basuras. Colombia, 2007.

90. Página 101:

Cuadro 4.3 Análisis integrado del riesgo de EDA por los diferentes factores determinantes por subregiones. Colombia, 2007.

Región	Con piso de tierra	Sin acueducto	Sin recolección de basuras	Riesgo integrado
Atlántica	19,0	16,2	35,6	70,8
Oriental	5,3	10,0	24,5	39,8
Pacífica	3,3	14,4	21,2	38,9
Central	4,5	7,3	17,1	28,9
Orinoquía-Amazonía	6,7	10,5	2,2	19,4
Bogotá	0,3	0,2	0,1	0,6

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Página 106:

Cuadro 4.4. Riesgo integrado de los factores determinantes para IRA por subregiones. Colombia, 2007.

Región	Utilizan leña, madera, carbón de madera como combustible para cocinar	Cuidadores de niños sin educación	Riesgo integrado
Oriental	17,9	82,2	100,1
Atlántica	22,3	51,0	73,3
Orinoquía-Amazonía	4,2	66,3	70,5
Central	13,7	49,2	62,9
Bogotá	0,1	61,1	61,2
Pacífica	19,4	40,5	59,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.


Página 102:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.9. Análisis integrado del riesgo de EDA por los diferentes factores determinantes por subregiones. Colombia, 2007.


Página 104:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 4.10. Riesgo de IRA según combustible para cocinar (leña, madera, carbón de leña) por área. Colombia, 2007.


91. Página 104:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.11. Riesgo para IRA según combustible para cocinar (leña, madera, carbón de leña) por número de habitantes. Colombia, 2007.


92. Página 109:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.12. Riesgo para enfermedades inmunoprevenibles por no coberturas útiles de vacunación por regiones. Colombia, 2007

Página 113:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Gráfico 4.13. Riesgo de ITS por no uso del condón en la primera relación sexual según región. Colombia, 2007.

Página 109:

Cuadro 4.5 Porcentaje por subregiones sin coberturas útiles de vacunación y riesgo para enfermedades inmunoprevenibles. Colombia, 2007.

SUB-REGIÓN	%
Litoral Pacífico	41,0
Santanderes	33,9
AM Barranquilla	29,3
Bogotá	28,9
Bolívar Sur, Sucre, Córdoba	24,8
Atlántico (sin B/quilla), San Andrés, Bolívar Norte	24,5
Guajira, Cesar, Magdalena	23,4
Valle (sin Cali, ni Litoral Pacífico)	22,3
Tolima, Huila, Caquetá	21,8
AM Cali	20,1
Cauca y Nariño (sin Litoral Pacífico)	20,0
Boyacá, Cundinamarca, Meta	19,1
AM Medellín	17,4
Caldas, Risaralda, Quindío	17,3
Antioquia (sin Medellín)	11,1
Orinoquía-Amazonía	10,9

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Página 114:

Cuadro 4.6 Porcentaje de primeras relaciones sexuales en las que no se usó condón por número de habitantes y riesgo para ITS. Colombia, 2007.

Total de habitantes	%	Riesgo
Menos de 10.000	81,9	1,0
10.000 a 19.999	84,3	1,1
20.000 a 49.999	85,9	1,1
50.000 a 99.999	84,5	1,1
100.000 a 199.999	82,1	1,0
200.000 a 899.999	80,9	1,0
900.000 a 3'000.000	81,8	1,0
Bogotá	79,0	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007.

Página 119:

Cuadro 4.7 Porcentaje de viviendas con paredes inadecuadas por regiones y riesgo para ETV. Colombia, 2007.

Región	%	Riesgo
Pacífica	17,6	6,5
Atlántica	13,9	5,1
Orinoquía-Amazonía	9,5	3,5
Central	8,4	3,1
Oriental	2,7	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


Página 119:

Cuadro 4.8 Porcentaje de población NBI y riesgo para ETV. Colombia, 2007.

Población por NBI	%	Riesgo
Miseria	68,6	45,7
Pobreza y NO Miseria	24,4	16,3
NI pobreza NI Miseria	1,5	1,0

Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007


93. Página 125



Fuente: INML y CF. Forensis 2006 a 2008.

Gráfico 5.2. Tasa de muertes violentas. Colombia, 2006 - 2008.


Página 126:



Fuente: INML y CF. FORENSIS 2007 y 2008

Gráfico 5.2. Tasa de lesiones no fatales x 100.000, según etiología, Colombia 2006-2008.


94. Página 127:



Fuente: INML y CF. FORENSIS 2007 y 2008

Gráfico 5.3. Tasa de lesiones y muertes en accidentes de tránsito. Colombia, 2000-2008.


95. Página 129:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 5.4. Reporte de accidente de tránsito, según condición, por personas de 6 a 65 años, en los años 2005, 2006 y 2007 (parcial). Colombia, 2007


96. Página 141:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 6.1. Proporción de percepción de la salud de las personas por nivel de pobreza. Colombia, 2007


Página 142:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 6.2. Proporción de personas que perciben su salud como buena o mala por nivel del SISBEN. Colombia, 2007

Página 143:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 6.3. Proporción de personas que perciben su salud como buena o mala según la región de residencia. Colombia, 2007


Página 143:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 6.4. Proporción de personas que perciben su salud como buena o mala según la actividad desempeñada. Colombia, 2007


Página 144:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 6.5. Proporción de personas que perciben su salud como buena o mala según la etnia a la que pertenece. Colombia, 2007

Página 145:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 6.6. Proporción de personas que percibieron una lesión causada por accidente o violencia, según el régimen de seguridad social en salud. Colombia, 2007


Página 146:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 6.7. Proporción de personas que percibieron una lesión causada por accidente o violencia, según la actividad económica. Colombia, 2007


97. Página 147:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS-2007

Gráfico 6.8. Proporción de personas que percibieron un problema de salud mental, según nivel de SISBEN. Colombia, 2007


Página 148:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS-2007

Gráfico 6.9. Proporción de personas que percibieron un problema de salud mental, según actividad desempeñada. Colombia, 2007


Página 148:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 6.10. Proporción de personas que percibieron un problema de salud mental, según etnia. Colombia, 2007


Página 149:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud ENS-2007

Gráfico 6.11. Proporción de personas que expresaron haber tenido incapacidad, según nivel educativo. Colombia, 2007


Página 150:



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, ENS-2007

Gráfico 6.12. Proporción de personas que expresaron haber tenido uno o más días de incapacidad, según actividad desempeñada. Colombia, 2007


Página 202:



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción 2006

Gráfico 8.1. Relación entre tasas de mortalidad de la población afiliada a los regímenes del SGSSS y al régimen especial por grupos de edad. Colombia, 2006


99. Página 203:



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción 2006

Gráfico 8.2. Tasas de mortalidad específicas para los grupos quinquenales de 10 a 39 años por régimen de aseguramiento al Sistema de Seguridad Social en Salud. Colombia, 2006

100. Página 208:



Fuente: DANE. Estadísticas Vitales. Registros de defunción 2006

Gráfico 8.5. Tasas de mortalidad estandarizadas por edad (x 1.000) por régimen de seguridad social y subregión de residencia. Colombia, 2006