



Boletín de noticias de interés sanitario Centro Nacional de Enlace

Boletín No 213, sábado 1 de agosto de 2026, 05:00 p.m.

El objetivo principal de este boletín es contribuir a las funciones de alerta temprana que hacen parte del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública en el marco de lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (2005). Es importante señalar que las noticias de índole nacional publicadas en este boletín no expresan la opinión ni la posición del Ministerio de Salud y Protección Social.

Noticias nacionales

ATLÁNTICO | Dimar advierte por aumento del oleaje y fuertes vientos en el Caribe colombiano **El Heraldo**

La Dirección General Marítima advirtió sobre condiciones de viento y oleaje que pueden incrementar el riesgo de accidentes, ahogamientos y emergencias durante actividades marítimas, recreativas y pesqueras. En Barranquilla se pronosticaron vientos de hasta 43 kilómetros por hora y olas cercanas a dos metros. Para Cartagena y Santa Marta se estimaron vientos entre 16 y 32 kilómetros por hora, con olas de entre 1,2 y 1,8 metros. En áreas de altamar del Caribe central y oriental podrían presentarse olas de hasta 4,8 metros y vientos superiores a 50 kilómetros por hora. La autoridad recomendó extremar las precauciones entre pescadores, operadores de embarcaciones menores, bañistas y prestadores de servicios turísticos. También pidió atender las restricciones de las autoridades locales y consultar los reportes meteorológicos antes de ingresar al mar o realizar actividades náuticas.

CAUCA | Volcán Puracé entra en alerta naranja tras aumento de actividad sísmica y emisiones **El Informador**

El Servicio Geológico Colombiano elevó de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán Puracé, en el departamento del Cauca, tras detectar un incremento sostenido de la actividad sísmica y de las emisiones de ceniza y gases. Desde el 20 de julio se han observado columnas que alcanzaron hasta 3.400 metros sobre la cima, acompañadas por aumentos en la temperatura de las emisiones y en la liberación de dióxido de azufre y dióxido de carbono. Según las autoridades, estos corresponden a los valores más elevados registrados desde el inicio del monitoreo permanente en 1993. El cambio de nivel significa que existe una mayor probabilidad de una erupción de magnitud superior a las registradas durante las semanas recientes, aunque no permite establecer que esta vaya a ocurrir. Las autoridades pidieron evitar el ingreso a las zonas altas de los volcanes Puracé, Piccollo y Curiquinga por la posibilidad de emisiones repentinas de gases y ceniza. El evento requiere vigilancia por sus posibles efectos respiratorios, ambientales y sobre las comunidades rurales cercanas.

RISARALDA | Comfamiliar Risaralda responde a sobreocupación en urgencias y reduce el nivel de 255 % a 180 %

Caracol Radio

La Clínica Comfamiliar Risaralda activó un plan de contingencia luego de que su servicio de urgencias alcanzara una sobreocupación del 255 %, indicador que evidencia una demanda considerablemente superior a la capacidad instalada. Como respuesta, la institución habilitó espacios internos con 40 camillas adicionales, lo que permitió reducir la ocupación al 180 %, aunque el servicio continúa por encima de su capacidad operativa. La ampliación busca mejorar la observación clínica, disminuir los tiempos de espera y evitar que la congestión comprometa la calidad y seguridad de la atención. También se incorporaron funcionarios para orientar a pacientes y familiares, así como gestores encargados del acompañamiento durante la permanencia en urgencias. La clínica designó un nuevo director científico para reforzar la gestión asistencial y la capacidad resolutoria. La situación requiere seguimiento por el riesgo de retrasos diagnósticos, agotamiento del personal y dificultades para remitir pacientes.



Boletín de noticias de interés sanitario Centro Nacional de Enlace

Noticias internacionales

BANGLADESH | Measles death toll reaches 840 as 3 more children die in 24hrs

The Business Standard

Three children died with symptoms consistent with measles over the past 24 hours, bringing the cumulative number of confirmed and suspected deaths related to the outbreak that began in March to 840. Of the total, 744 deaths are from suspected cases and 96 from laboratory-confirmed infections. During the same period, 751 new suspected cases and 121 confirmed cases were reported. Bangladesh has recorded a cumulative total of 129,061 suspected infections and 16,180 confirmed infections, indicating widespread and sustained community transmission. Since the outbreak began, 111,674 suspected patients have required hospitalization, and 107,397 have been discharged.

INDIA | Dengue cases rise in dist; DMO calls for intensified mosquito control measures

The Times of India

Health authorities in the Thiruvananthapuram district of the state of Kerala reported an increase in dengue cases and ordered an intensification of Aedes mosquito control efforts. Intermittent rains have led to water accumulation and the formation of breeding sites in homes, institutions, and commercial establishments. The district medical authority has called for intensive cleanup campaigns and the removal of containers capable of holding water. Educational institutions are to carry out control activities on Fridays, commercial establishments and construction sites on Saturdays, and homes and public spaces on Sundays. Recommendations include checking refrigerator trays, plant pot saucers, decorative containers, and unused toilets.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | Ebola disease caused by Bundibugyo virus — Democratic Republic of the Congo

Organización Mundial de la Salud

The World Health Organization reported that the Bundibugyo virus outbreak continues to intensify and is now the largest Ebola outbreak ever recorded in the Democratic Republic of the Congo. As of July 30, 3,605 cases and 1,587 deaths had been confirmed in the country, for an approximate case fatality rate of 44%. Since the July 17 update, 1,481 additional cases and 759 deaths have been reported; this increase is partly due to expanded surveillance and diagnostic testing, but primarily to the actual spread of the outbreak. Transmission is occurring in 49 health zones spread across Ituri, North Kivu, South Kivu, Haut-Uélé, and Tshopo. The WHO maintains the national risk level as very high and considers the risk to Uganda and other neighboring countries to be high due to population and commercial mobility. Measures implemented include epidemiological surveillance, laboratory diagnosis, infection prevention and control, clinical care, community engagement, and cross-border coordination.