

ASPECTOS CLAVES EN LA ADMINISTRACION MASIVA DE NICLOSAMIDA

Elaboro. Ministerio de Salud y Protección Social. Marcela Pilar Rojas Díaz. Profesional Especializado. Referente de Teniasis Cisticercosis

Dosificación y administración de niclosamida (NICL) según el peso corporal (tabletas masticables de 0,5 g)

Peso	Dosis de Niclosamida	Número de tabletas
Niños menores de 10 Kg Por edad corresponde a menores 2 años (no aplica)	Dosis única 500 mg	1 tableta
Niños de 10 a 35 kg Por edad corresponde entre 2 a 10 años	Dosis única 1 g	2 tabletas
Personas de más de 35 kg Por edad corresponde mayores de 11 años	Dosis única 2 g	4 tabletas

Población elegible	Población exenta
• Población mayor de 2 años • Personas que acepten la medicación. • Personas que estén en buen estado de salud	• Mujeres en embarazo • Quienes hayan manifestado reacción alérgica grave al medicamento en una ronda anterior. • Personas con infecciones agudas, soplos cardíacos, arritmia, enfermedades renales, o hepáticas crónicas o graves. • Personas que estén tomando muchos medicamentos. • Personas que rechacen la toma del medicamento



La administración de medicamentos de forma masiva como la niclosamida **siempre debe ir acompañada de acciones de educación y saneamiento ambiental.**

Siempre se deberá hacer seguimiento a posibles **problemas relacionados con medicamentos (PRM)** y se notificarán al sistema de farmacovigilancia.

Indicar la eliminación segura de las heces en letrina o enterrándola, **hasta 72 horas después** de la administración del medicamento.

Diligenciamiento formato AMM en terreno manual

Teniendo en cuenta que existe información común a toda la comunidad que puede ser diligenciada de forma masiva como departamento, fecha, entre otras, a continuación, se describen las variables clave a diligenciar por persona en terreno en formato físico.

Variables masivas

Variable	Descripción
2.Fecha de la AMM	Formato:DD/MM/AAAA
3.Departamento/Distrito	4. Zona/Río, comunidad
5.Municipio o Corregimiento	6.Comunidad Vereda/barrio donde realiza AMM
7, 8, 9 10, 11 Variables de ubicación	20,21,22,23 Variables de comunidad
30. Evento	Opción 3. Teniasis
45. Medicamento concentración	Opción 7. Niclosamida 500 mg
46.Forma farmacéutica	Opción 1. Tabletas.
48, 54, 56, 57. Variables comunes al evento	

Variable	Descripción	
19. Nombre comunidad/Vereda donde vive persona la mayor parte del tiempo	Escriba el nombre de la comunidad, finca o vereda donde vive la persona la mayor parte del tiempo.	
20. Grupo poblacional	1. Niños, niñas adolescentes 2. Gestantes 3. Adulto mayor 4. Discapacitado 5. Persona con orientación sexual diversa 6. Víctimas de la violencia	7. Ninguna 8. Migrante 9. Carcelario 10. Indigentes 11. Población infantil a cargo ICBF. 12. Madres comunitarias. 13. Otro
25. Edad Reportada	Escriba en números enteros	
26. Unidad de medida de la edad	Escriba la unidad de medida de la edad: días, meses, años	
40. Signos y síntomas Teniasis/Cisticercosis	1. Antecedente convulsiones. 2. Antecedentes dolores de cabeza.	3. Diagnóstico previo epilepsia. 4. Ninguno
47. Cant. Administrada de tabletas	Registre el número de tabletas administradas. Mínimo 1, máximo 4 tabletas	
49. Motivo no tratamiento	0. Ausente 1. Rechaza 2. No Elegible	3. No hay medicamento para tratar a lapersona 4. Embarazo
50. ¿Presenta Problema Relacionado con Medicamentos (PRM)?	0. No presentó en las 24 horas siguientes (Pasar a 55) 1. Sí presentó	2. No Evaluado (Pasar a 55) 3. No aplica porque no tomó medicamentos (Pasar a 56)
51. Severidad del PRM	0. No Grave (Pasar a 52)	1. Grave (Pasar a 53)
52.Síntomas PRM no graves	SÍNTOMAS LEVES: seleccione los síntomas leves y pasajeros que se presentaron en el paciente; por ejemplo: 1. Dolor de estómago, 2. Dolor muscular 3. Dolor de cabeza, 4. Dolor de articulaciones 5. Diarrea 6. Fiebre. 7. Prurito	
53.Síntomas PRM graves	REACCIONES SEVERAS que necesitan ser tratadas en urgencias por un médico 1. Dolor de cabeza severo que no cede 2. Pérdida de la conciencia 3. Convulsiones 4. Vómito abundante que no cede	
55. Acciones Posadministración	1. Expulsión del parásito 2. No expulsó parásito	3. Dosis de refuerzo NICL 4. No reporta
58. Observaciones		