

Sin miedo, sin estigmas, con prevención: **la vacuna contra Mpox**

es protección



El PAI incluyó la vacunación contra la Mpox en el caso de brotes, esta vacuna previene la viruela símica, esta enfermedad se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies y genitales. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en población adulta.

¿Quiénes se deben vacunar?

Personas mayores de 18 años que hayan tenido contacto con un caso confirmado y que pertenezcan a los siguientes grupos:

Personas viven en entornos cerrados.

Personas con múltiples parejas sexuales.

Talento humano en salud con exposición directa.

Personas que viven con VIH.

Consideraciones para la vacunación contra mpox

Vía de administración:

Subcutánea

Jeringa:

25G * 5/8

Cantidad:

0,5 mL

Intervalo:

4 semanas
*No se reinicia esquema

Almacenamiento:

2 a 8 grados centígrados
Hasta por 4 semanas

PAIWEB:

Esquema PAI adicional - Sin rango de edad

Ante un caso de Mpox, se determina el número de dosis requeridas según el censo entregado por el equipo de Vigilancia epidemiológica.

La solicitud se realiza al nivel superior territorial del PAI, vía correo electrónico, indicando el número de dosis totales requeridas: Sumatoria de primeras y segundas, anexando la ficha epidemiológica y el listado de contactos.



Además, debes tener en cuenta:

- 1 Antes de la administración, el vial deberá agitarse suavemente para obtener una suspensión turbia y blanquecina.
- 2 Se puede administrar la vacuna Mpox de manera simultánea con otras vacunas.
- 3 La vacuna no está dirigida a la población general sin factores de riesgo, a menores de 18 años, personas con antecedentes de reacción alérgica grave a los componentes de la vacuna, ni personas que ya hayan recibido dos dosis de Mpox.
- 4 El registro en PAIWEB y el reporte en los formatos definidos es indispensable para el seguimiento y monitoreo de la estrategia. **Contamos con tu compromiso.**
- 5 Cualquier Evento Adverso Posterior a la Vacunación debe ser notificado en Vigiflow a través del equipo de farmacovigilancia.

Nota:

Esta infografía no reemplaza la lectura del lineamiento QR

