



ABECÉ

Rabia

Orientado a comunidad en general

I. Generalidades

¿Qué es la rabia?

La rabia es una enfermedad infecciosa mortal que afecta el sistema nervioso y puede presentarse en animales domésticos no vacunados como perros y gatos, ganado de producción, caballos, entre otros; animales salvajes como murciélagos, zorros, entre otros; y el hombre.

¿Cómo se transmite la rabia?


Por la saliva de un animal infectado a través de mordeduras, arañazos o contacto con secreciones o tejidos de un animal infectado. En nuestro medio hay un ciclo urbano transmitido principalmente por el perro y uno silvestre por murciélago, zorrillo y zorro. Otros mamíferos salvajes incluidos primates no humanos y el gato pueden ser transmisores, siendo en mucho menor grado el ganado. No hay transmisión a través de pequeños roedores. La ingestión de carne cruda o de otros derivados no es fuente confirmada de infección humana.

¿Dónde viven los murciélagos y que beneficios aportan?

En las proximidades de los ríos, en grandes árboles hueco o en piedemonte en cuevas naturales. Igualmente en agujeros, troncos viejos, huecos de las rocas, bajo puentes, tuberías, cielorrasos, casas abandonadas. Puede desplazarse en busca de su alimento hasta 15 km en una noche. Hacen control de población de insectos, facilitan la polinización de las plantas y esparcen semillas en el suelo.

¿Qué murciélagos pueden transmitir la rabia?

Los conocidos como hematófagos o vampiros. Son de color pardo grisáceo oscuro en el lomo y pálido en el vientre. Su nariz es como una masa rugosa, achatada y sin aletillas. La cabeza es pequeña, ojos medianos y vivos, orejas relativamente pequeñas y puntiagudas. Los dientes incisivos superiores y caninos superiores e inferiores son largos, los demás dientes muy pequeños. El labio inferior tiene una hendidura en forma de V que le facilita recoger la sangre. Carecen de cola.



Fuente: Conozca y prevenga la Rabia de Origen Silvestre. Instituto Colombiano Agropecuario 2012

Hay otros murciélagos que también se pueden infectar de rabia, como los que se alimentan de insectos, de frutas y de néctar de las flores, los cuales pueden transmitir la rabia por mordedura accidental o provocada.

¿Dónde es frecuente la mordedura por murciélago?

Los murciélagos pueden morder a las personas en cualquier parte del cuerpo; sin embargo, son frecuentes en dedos de manos, dedos de pies, talón y orejas.

¿Cómo se puede saber si una mordedura es por murciélago?

Los murciélagos tienen dientes pequeños que pueden dejar marcas que no se ven o pueden desaparecer fácilmente. Por esta razón, muchas personas pueden saber si un murciélago las ha mordido y otras pueden no estar conscientes o no ser capaz de saberlo. Esto se presenta principalmente cuando se observa un murciélago en una habitación donde se encuentran niños o personas en condición de discapacidad, siendo necesario revisarlos detenidamente para detectar este tipo de mordeduras lo cual requiere consultar la institución de salud.




Photo of a bat bite on finger. *Photo courtesy of CDC.*

Fuente: <https://bit.ly/3jpHO0b>

¿Cuánto tiempo puede transcurrir entre la mordedura y el inicio de la enfermedad?

De 5 días a varios años, generalmente de 2 a 3 meses, raramente más de 1 año. Es más corto en agresiones en cabeza, cara, cuello y manos

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad?

Fiebre y sensación de hormigueo, picor o quemazón inusual en el lugar de la herida, dolor de cabeza, náuseas, vómito, agitación e irritabilidad. Posteriormente se produce hiperactividad, excitación, hidrofobia (miedo al agua), fotofobia (miedo a la luz) y a veces aerofobia (miedo a las corrientes de aire o al aire libre), se puede presentar parálisis progresiva de los músculos y finalmente la muerte

¿Qué manifestaciones tiene un perro o gato con rabia?

Pérdida de apetito o voracidad, nerviosismo, inquietud, intranquilidad, irritabilidad, pelo erizado, huidizo; enronquecimiento del ladrido; desatención inclusive al dueño, episodios alternos de excitación y aparente calma, agresividad y manifestaciones cariñosas; temor a las corrientes de aire, salivación, fotofobia, hiperactividad, agresividad extrema, ataca sin provocación, desorientación, con parálisis de los músculos de la cabeza y del cuello, dificultad para la tragar o atoramiento, mandíbula caída, incoordinación de movimientos, trastorno de la marcha, parálisis de las patas traseras, convulsiones, dificultad respiratoria y muerte.

¿Qué manifestaciones tienen los animales de producción (ganado)?

Caída, incoordinación de las patas traseras, salivación abundante, ceguera, temblores musculares, parálisis. Posteriormente enflaquecimiento progresivo y deshidratación debido a su imposibilidad de alimentarse y beber agua. Finalmente permanecen caídos y mueren en 1 - 10 días.

¿Cómo se sospecha que los animales de producción (ganado) son mordidos por murciélagos?

Los murciélagos buscan su alimento en la noche, especialmente cuando la oscuridad es completa y se alimentan del mismo animal y de la misma herida cada 72 horas. Pueden morder cualquier parte del cuerpo, prefieren las orejas, la tabla del cuello, el rodete coronario, la cruz, el lomo, la cola y las ubres. Puede ser indicio la presencia de heridas frescas con hilillos de sangre o con sangre seca.

¿Los animales de producción (ganado) puede transmitir la rabia?

Si pueden transmitir la rabia a través de mordeduras o el contacto con la saliva o tejidos infectados, no se recomienda el consumo de la carne o sus derivados.

¿Cómo sospechar que un murciélago tiene rabia?

El murciélago es un animal nocturno, si este presenta actividad durante el día o se observa comportamientos diferentes a los habituales como hallarse dentro de una casa o en un césped, o que sea incapaz de volar y se le puede acercar fácilmente, o si se halla muerto, enfermo o es fácilmente capturado; es sospechoso y debería ser analizado para detectar la rabia. Por lo tanto, es necesario reportar la situación a la secretaría de salud de su municipio.

II. Deberes y derechos

¿Qué responsabilidad tengo con mi perro o gato?

Mantener al día la vacunación contra la rabia, la cual es gratuita y está disponible en todo el territorio nacional a través de las Secretarías de Salud Departamentales, Distritales y Municipales.

¿Qué define el código de policía en relación a mascotas en espacio público, vías públicas, lugares abiertos al público, y en transporte público?

Todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su correspondiente trailla y con bozal debidamente ajustados para los ejemplares caninos potencialmente peligrosos. Los felinos deben ser transportados en maletines o con collares especiales.



¿Ante el riesgo de adquirir rabia, a qué derecho tengo en salud?

Una vez se ha sufrido una agresión o exposición por un animal potencialmente trasmisor de rabia se tiene derecho a la atención inmediata en salud en cualquier parte del territorio nacional (se esté o no afiliado al sistema de salud) y a la aplicación de suero y vacuna de ser necesario de acuerdo al concepto médico. Todo hospital del país con prestación de servicios de urgencias está en condiciones de aplicar el tratamiento.

¿Qué costo tiene el suero o vacuna?

El suero antirrábico y la vacuna no tienen costo ya que son cubiertos por Sistema de Seguridad Social en Salud, y cubre todas las dosis necesarias para prevenir la enfermedad cuando está indicado ante una agresión o contacto de riesgo para el virus de la rabia.

III. Atención de casos

¿Dónde me atienden?

Las instituciones de salud con servicio de urgencias están en capacidad de prestar la atención en salud, que es una urgencia médica que no se puede negar ni diferir

¿Qué es importante decir en la consulta?

Fecha y hora del incidente, el tipo de agresión, esto es mordedura, arañazo o rasguño, contacto de mucosas o heridas con saliva o estancia en cuevas infestadas de murciélagos. En relación a la lesión su cantidad, ubicación y profundidad. Si la agresión fue provocada. Tipo de animal agresor, si es conocido e identificable, el estado vacunal si se conoce, si se detectó algún cambio inusual del comportamiento del animal.

¿Cómo se trata la herida causada por una agresión por animal que pueda transmitir la rabia?

Las heridas deben lavarse con abundante agua y jabón durante unos 15 minutos después del contacto, lo cual salva vidas. Puede hacerse incluso en el domicilio si no es posible acceder a consulta médica de inmediato la cual es recomendada dado que es una urgencia médica incluso en lesiones leves.

¿Qué medicamentos se aplican cuando hay agresión animal?

Se dispone de vacuna antirrábica, suero antirrábico y se hace necesario vacuna con tétanos si no se ha aplicado recientemente, así como antibióticos, todos estos a criterio médico dado que no toda agresión animal lo requiere.

¿Cómo se aplica la vacuna y cuantas veces se coloca?

Se inyecta antes de cualquier exposición en personas en alto riesgo en dos días; si hay exposición en cuatro días. Puede ser aplicada superficialmente en la piel (intradérmica) o profunda (intramuscular). No tiene contraindicaciones, se puede colocar en toda edad, durante el embarazo y la lactancia.

¿Cómo se aplica el suero antirrábico?

Se inyecta dentro de la herida, si no es posible en su totalidad el excedente se aplica intramuscular.

IV. Acciones de prevención

¿Cómo se previene la rabia?

La vacunación de personas en riesgo, de personas agredidas por animales, así como de perros y gatos. Cuidados adecuados de las mordeduras y consultar inmediatamente si se tiene agresión por cualquier animal. Es necesario sacar al perro con collar y bozal y no permitir que deambule libremente por el espacio público.



¿Qué personas está en riesgo de sufrir rabia?

Personal de laboratorio y personas que viven o viajan a zonas donde se transmite rabia, que además tienen actividades que facilitan contacto con murciélagos, animales silvestres y pasan mucho tiempo al aire libre. Los niños suelen jugar con los animales, pueden sufrir mordeduras más graves e incluso no decirlo.

¿Cada cuánto se aplica la vacuna en perros y gatos?

Se inicia a partir de los tres meses de edad y se aplica anualmente, a los perros y gatos a través de jornadas de vacunación gratuitas a nivel nacional, realizadas por las Secretarías de Salud o en establecimientos veterinarios. También se puede vacunar el ganado bovino.

¿Qué se hace con el animal agresor?

Si el agresor es un perro o gato, se evalúa por un funcionario de la Secretaría de Salud Municipal y si está sano se deja en observación por 10 días a partir del día de la agresión. Si el perro o gato es agredido por un animal con diagnóstico de rabia y tiene vacuna vigente comprobada se da refuerzo inmediato y se observa por 45 días.

¿Qué puede ocurrir con el animal en observación?

Puede presentar signos de rabia por lo que se sacrifica, se envía el cerebro para examen al laboratorio y se atiende a las personas agredidas. Si no presenta signo alguno compatible con rabia indica que en el momento de la mordedura, el animal no estaba eliminando virus de rabia por su saliva.

Contacto:

Mauricio Vera Soto

Email: mvera@minsalud.gov.co

Flavio Garzón R.

Email: fgarzonr@minsalud.gov.co

