

USO DEL KIT POST-EXPOSICIÓN EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

REALICE ASESORÍA PREVIA A LAS PRUEBAS:

1

- ✓ Explique el objetivo de realizar pruebas rápidas para VIH, Hepatitis B y Embarazo y realice ASESORÍA PRE Y POST PRUEBA PARA VIH.
- ✓ Diligencie el CONSENTIMIENTO INFORMADO, en original para la víctima y copia para la historia clínica.

2

EFFECTÚE PRUEBAS RÁPIDAS

PARA VIH, HEPATITIS B, Y EMBARAZO:

- ✓ Si todas resultan NO REACTIVAS, inicie PROFILAXIS COMPLETA (para VIH, HB y anticoncepción de emergencia)

REALICE OTROS ANÁLISIS

- ✓ Cuadro hemático, Hemoglobina
- ✓ Perfil Lipídico, Perfil Hepático y Glicemia

3

INICIE PROFILAXIS PARA VIH E ITS. Diligencie el FORMATO de uso

PROFILAXIS PARA VIH E ITS EN MENORES DE 30 KG																	
PROFILAXIS PARA VIH X 28 DÍAS										PROFILAXIS DE ITS. DOSIS ÚNICA							
PRESENTACIÓN	ZIDOVUDINA (AZT) Suspensión 10 mg / mL. Fco. de 240 ml			LAMIVUDINA (3TC) Suspensión 10 mg / mL. Fco. de 240 ml			LOPINAVIR / RITONAVIR Suspensión 80/20 mg/c. c. Fco. de 160 mL. NECESITA REFRIGERACIÓN			CEFUROXIMA. Suspensión 250mg x 5 c. c., Fco. x 70mL.	AZITROMICINA. Suspensión 200mg x 5 c.c., Fco. x 15 ml	METRONIDAZOL. Suspensión 250mg x 5 c.c., Fco. x 120 mL.					
DOSIS	<p><u>Dosis proyectada para los niños mayores de 6 semanas:</u> Oral: 180-240 mg/m²/dosis, 2 veces al día (dosis diaria total de 360-480 mg/m²) Dosis máxima: 300 mg/dosis, 2 veces al día</p> <p><u>Fórmula para el cálculo de la superficie corporal</u> S.C. (m²)= (Peso x 4)+7 /Peso+90</p> <p><u>Dosis de adultos:</u> 250-300 mg/dosis, 2 veces al día.</p>						<p>DOSIS : 4mg / Kg. Dos veces al día.</p>			<p><u>Dosis proyectadas de LPV:</u> -Peso entre 5 y 7,9 kg: 16 mg/kg/dosis, 2 veces al día -Peso entre 8 y 9,9 kg: 14 mg/kg/dosis, 2 veces al día -Peso entre 10 y 13,9 kg: 12 mg/kg/dosis, 2 veces al día -Peso entre 14 y 39,9 kg: 10 mg/kg/dosis, 2 veces al día</p> <p><u>Dosis proyectadas de RTV:</u> -Peso entre 7 y 15 kg: 3 mg/kg/dosis, 2 veces al día -Peso entre 15 y 40 kg: 2,5 mg/kg/dosis, 2 veces al día</p> <p>Dosis máxima: 400 mg de LPV + 100 mg de RTV, 2 veces al día</p>			10 mg/Kg.	10 mg/Kg.	20 mg / Kg		
RANGO DE PESO	ml AM	ml PM	#FRASCOS	ml AM	ml PM	#FRASCOS	ml AM	ml PM	#FRASCOS	ml Dosis única	#FRASCOS	ml Dosis única	#FRASCOS	ml Dosis única	#FRASCOS		
5 - 5,9 Kg	6ml	6ml	2	3ml	3ml	1	1ml	1ml	1	1ml	1	1,5ml	1	2ml	1		
6 - 6,9 Kg	7ml	7ml	2	3ml	3ml	1	1,5ml	1,5ml	1	1,5ml	1	2ml	1	3ml	1		
7 - 7,9 Kg	8ml	8ml	2	4ml	4ml	1	1,5ml	1,5ml	1	1,5ml	1	2ml	1	3ml	1		
8 - 8,9 Kg	9ml	9ml	3	4ml	4ml	1	1,5ml	1,5ml	1	2ml	1	2,5ml	1	4ml	1		
9 - 9,9 Kg	10ml	10ml	3	5ml	5ml	2	1,5ml	1,5ml	1	2ml	1	2,5ml	1	4ml	1		
10 - 10,9 Kg	10ml	10ml	3	5ml	5ml	2	2ml	2ml	1	2,5ml	1	3ml	1	5ml	1		
11 - 11,9 Kg	10ml	10ml	3	6ml	6ml	2	2ml	2ml	1	2,5ml	1	3ml	1	5ml	1		
12 - 13,9 Kg	11ml	11ml	3	6ml	6ml	2	2ml	2ml	1	3ml	1	3,5ml	1	6ml	1		
14 - 16,9 Kg	13ml	13ml	3	7ml	7ml	2	2,5ml	2,5ml	1	3,5ml	1	4ml	1	7ml	1		
17 - 19,9 Kg	14ml	14ml	4	8ml	8ml	2	2,5ml	2,5ml	1	4ml	1	5ml	1	8ml	1		
20 - 24,9 Kg	17ml	17ml	4	10ml	10ml	3	3ml	3ml	2	5ml	1	6,5ml	1	10ml	1		
25 - 29,9 Kg	19ml	19ml	5	12ml	12ml	3	3,5ml	3,5ml	2	6ml	1	7,5ml	1	12ml	1		

PROFILAXIS PARA VIH E ITS EN MAYORES DE 30 KG													
PROFILAXIS PARA VIH X 28 DÍAS							PROFILAXIS DE ITS. DOSIS ÚNICA						
PRESENTACIÓN	ZIDOVUDINA (AZT) 300 mg + LAMIVUDINA 150 mg . Tabletas			LOPINAVIR / RITONAVIR 200Mg LPV / 50 mg RTV . Tabletas			CEFTRIAZONA. Amp x 1 gr	AZITROMICINA. Tabletas por 500 mg	METRONIDAZOL. Tabletas por 500 mg				
DOSIS	# Tabletas AM	# Tabletas PM	TOTAL TAB.	TAB. AM	TAB. PM	TOTAL TAB.	Dosis única	TOTAL	Dosis única	TOTAL	Dosis única	TOTAL	
	1	1	56	2	2	112	1gr	1	1gr	2	2 gr	4	

ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA Dosis única

Levonorgestrel Tabletas por 0,75 mg

1,5 mg Dosis única

2 tabletas

INICIE PROFILAXIS PARA HEPATITIS B: Vacuna de Hepatitis B y Gamaglobulina para Hepatitis B

4

SEGUIMIENTO

- ✓ Prueba de ELISA a los 3 y 6 meses. Después de 6 meses se descarta la infección. Recomiende protección con preservativos.
- ✓ Control clínico y de laboratorio para seguimiento a efectos tóxicos.
- ✓ Complete PROFILAXIS PARA VIH por 28 días y complete Vacunación para HEPATITIS B.
- ✓ Instruya a la víctima y a sus acudientes sobre signos de toxicidad

Más información en www.minsalud.gov.co bajo el vínculo OBSERVATORIO VIH/SIDA.

